
Physiological marker effects on PHQ-9 — age 18-24
Estimate (95% CI)
Fasting glucose (mg/dL) -0.011 (-0.094, 0.072)
Serum glucose (mg/dL) -0.044 (-0.120, 0.033)
Insulin (uU/mL) 0.075 (-0.143, 0.294)
Glycohemoglobin / HbA1c (percent) -1.144 (-2.960, 0.672)
Triglyceride (mg/dL) -0.006 (-0.021, 0.009)
LDL cholesterol (mg/dL) 0.043 (-0.010, 0.096)
Total cholesterol (mg/dL) -0.001 (-0.030, 0.029)
HDL cholesterol (mg/dL) -0.083 (-0.188, 0.022)
Systolic BP (mm Hg) -0.004 (-0.123, 0.114)
Diastolic BP (mm Hg) -0.026 (-0.143, 0.090)
Alanine Aminotransferase / ALT (U/L) 0.014 (-0.039, 0.067)
Gamma Glutamyl Transferase / GGT (IU/L) 0.005 (-0.026, 0.037)
hs-CRP (mg/L) -0.305 (-0.639, 0.028)
Serum creatinine (mg/dL) 5.126 (-2.747, 12.998)
Blood urea nitrogen (mg/dL) -0.096 (-0.460, 0.267)
Uric acid (mg/dL) 1.385 (0.236, 2.533)
Ferritin (ng/mL) -0.006 (-0.021, 0.009)
Serum iron (ug/dL) -0.013 (-0.043, 0.018)
Transferrin saturation (percent) -0.034 (-0.131, 0.063)
Transferrin receptor (mg/L) -0.260 (-1.158, 0.638)
0
5
10
Effect size (Δ PHQ-9 per 1-unit predictor)