
Physiological marker effects on PHQ-9 — age 25-34
Estimate (95% CI)
Fasting glucose (mg/dL) -0.002 (-0.045, 0.041)
Serum glucose (mg/dL) -0.006 (-0.033, 0.022)
Insulin (uU/mL) 0.044 (-0.045, 0.132)
Glycohemoglobin / HbA1c (percent) 0.237 (-0.523, 0.996)
Triglyceride (mg/dL) -0.003 (-0.014, 0.009)
LDL cholesterol (mg/dL) 0.006 (-0.023, 0.035)
Total cholesterol (mg/dL) -0.002 (-0.018, 0.014)
HDL cholesterol (mg/dL) -0.024 (-0.071, 0.023)
Systolic BP (mm Hg) -0.028 (-0.078, 0.022)
Diastolic BP (mm Hg) -0.012 (-0.063, 0.039)
Alanine Aminotransferase / ALT (U/L) -0.005 (-0.031, 0.022)
Gamma Glutamyl Transferase / GGT (IU/L) 0.000 (-0.006, 0.007)
hs-CRP (mg/L) 0.083 (-0.059, 0.225)
Serum creatinine (mg/dL) 3.287 (-0.554, 7.129)
Blood urea nitrogen (mg/dL) 0.085 (-0.080, 0.249)
Uric acid (mg/dL) 0.416 (-0.064, 0.896)
Ferritin (ng/mL) -0.002 (-0.007, 0.003)
Serum iron (ug/dL) -0.012 (-0.026, 0.003)
Transferrin saturation (percent) -0.038 (-0.086, 0.010)
Transferrin receptor (mg/L) 0.002 (-0.398, 0.403)
0
2
4
6
Effect size (Δ PHQ-9 per 1-unit predictor)