
Physiological marker effects on PHQ-9 — age 35-44
Estimate (95% CI)
Fasting glucose (mg/dL) 0.015 (-0.012, 0.042)
Serum glucose (mg/dL) 0.007 (-0.014, 0.029)
Insulin (uU/mL) 0.046 (-0.033, 0.125)
Glycohemoglobin / HbA1c (percent) 0.205 (-0.522, 0.932)
Triglyceride (mg/dL) 0.003 (-0.003, 0.009)
LDL cholesterol (mg/dL) -0.003 (-0.038, 0.031)
Total cholesterol (mg/dL) -0.002 (-0.018, 0.014)
HDL cholesterol (mg/dL) -0.023 (-0.059, 0.012)
Systolic BP (mm Hg) -0.020 (-0.066, 0.026)
Diastolic BP (mm Hg) -0.028 (-0.089, 0.033)
Alanine Aminotransferase / ALT (U/L) 0.030 (-0.015, 0.075)
Gamma Glutamyl Transferase / GGT (IU/L) 0.009 (-0.008, 0.025)
hs-CRP (mg/L) -0.062 (-0.219, 0.096)
Serum creatinine (mg/dL) -0.701 (-4.331, 2.929)
Blood urea nitrogen (mg/dL) -0.052 (-0.220, 0.115)
Uric acid (mg/dL) 0.137 (-0.379, 0.652)
Ferritin (ng/mL) -0.000 (-0.004, 0.003)
Serum iron (ug/dL) 0.014 (-0.002, 0.030)
Transferrin saturation (percent) 0.050 (-0.003, 0.102)
Transferrin receptor (mg/L) -0.168 (-0.604, 0.268)
−4
−2
0
2
Effect size (Δ PHQ-9 per 1-unit predictor)