
Physiological marker effects on PHQ-9 — age 45-54
Estimate (95% CI)
Fasting glucose (mg/dL) -0.011 (-0.028, 0.007)
Serum glucose (mg/dL) 0.000 (-0.013, 0.013)
Insulin (uU/mL) -0.002 (-0.039, 0.035)
Glycohemoglobin / HbA1c (percent) -0.145 (-0.604, 0.314)
Triglyceride (mg/dL) -0.008 (-0.018, 0.002)
LDL cholesterol (mg/dL) -0.008 (-0.035, 0.018)
Total cholesterol (mg/dL) -0.005 (-0.019, 0.009)
HDL cholesterol (mg/dL) 0.049 (0.011, 0.088)
Systolic BP (mm Hg) -0.028 (-0.069, 0.013)
Diastolic BP (mm Hg) -0.033 (-0.088, 0.021)
Alanine Aminotransferase / ALT (U/L) 0.029 (-0.010, 0.068)
Gamma Glutamyl Transferase / GGT (IU/L) 0.008 (-0.001, 0.016)
hs-CRP (mg/L) 0.085 (-0.025, 0.194)
Serum creatinine (mg/dL) 0.027 (-0.997, 1.051)
Blood urea nitrogen (mg/dL) -0.022 (-0.135, 0.090)
Uric acid (mg/dL) -0.287 (-0.705, 0.131)
Ferritin (ng/mL) 0.002 (0.000, 0.004)
Serum iron (ug/dL) 0.010 (-0.007, 0.028)
Transferrin saturation (percent) 0.019 (-0.037, 0.074)
Transferrin receptor (mg/L) 0.071 (-0.388, 0.530)
−1
−0.5
0
0.5
1
Effect size (Δ PHQ-9 per 1-unit predictor)