
Physiological marker effects on PHQ-9 — age 55-64
Estimate (95% CI)
Fasting glucose (mg/dL) -0.004 (-0.021, 0.013)
Serum glucose (mg/dL) 0.006 (-0.006, 0.017)
Insulin (uU/mL) 0.063 (0.008, 0.117)
Glycohemoglobin / HbA1c (percent) 0.078 (-0.357, 0.514)
Triglyceride (mg/dL) 0.004 (-0.006, 0.014)
LDL cholesterol (mg/dL) 0.006 (-0.010, 0.023)
Total cholesterol (mg/dL) 0.003 (-0.008, 0.013)
HDL cholesterol (mg/dL) -0.028 (-0.058, 0.002)
Systolic BP (mm Hg) -0.001 (-0.025, 0.023)
Diastolic BP (mm Hg) -0.017 (-0.055, 0.021)
Alanine Aminotransferase / ALT (U/L) -0.003 (-0.030, 0.025)
Gamma Glutamyl Transferase / GGT (IU/L) -0.003 (-0.010, 0.003)
hs-CRP (mg/L) 0.027 (-0.012, 0.066)
Serum creatinine (mg/dL) -0.544 (-2.131, 1.042)
Blood urea nitrogen (mg/dL) 0.049 (-0.039, 0.136)
Uric acid (mg/dL) -0.155 (-0.513, 0.203)
Ferritin (ng/mL) -0.002 (-0.004, 0.001)
Serum iron (ug/dL) 0.002 (-0.009, 0.014)
Transferrin saturation (percent) 0.010 (-0.032, 0.052)
Transferrin receptor (mg/L) 0.090 (-0.278, 0.459)
-2
-1
0
1
Effect size (Δ PHQ-9 per 1-unit predictor)