
Physiological marker effects on PHQ-9 — age 65-74
Estimate (95% CI)
Fasting glucose (mg/dL) 0.008 (-0.007, 0.024)
Serum glucose (mg/dL) 0.006 (-0.006, 0.017)
Insulin (uU/mL) 0.009 (-0.010, 0.028)
Glycohemoglobin / HbA1c (percent) 0.196 (-0.203, 0.595)
Triglyceride (mg/dL) 0.000 (-0.009, 0.009)
LDL cholesterol (mg/dL) -0.007 (-0.021, 0.007)
Total cholesterol (mg/dL) -0.002 (-0.012, 0.009)
HDL cholesterol (mg/dL) -0.012 (-0.047, 0.023)
Systolic BP (mm Hg) -0.018 (-0.040, 0.004)
Diastolic BP (mm Hg) 0.015 (-0.021, 0.051)
Alanine Aminotransferase / ALT (U/L) 0.023 (-0.019, 0.064)
Gamma Glutamyl Transferase / GGT (IU/L) 0.001 (-0.008, 0.011)
hs-CRP (mg/L) 0.079 (0.022, 0.135)
Serum creatinine (mg/dL) 0.645 (-0.415, 1.704)
Blood urea nitrogen (mg/dL) 0.062 (-0.002, 0.126)
Uric acid (mg/dL) -0.040 (-0.356, 0.276)
Ferritin (ng/mL) 0.000 (-0.002, 0.003)
Serum iron (ug/dL) -0.013 (-0.027, 0.001)
Transferrin saturation (percent) -0.025 (-0.065, 0.014)
Transferrin receptor (mg/L) -0.010 (-0.221, 0.201)
-0.5
0
0.5
1
1.5
Effect size (Δ PHQ-9 per 1-unit predictor)