
Physiological marker effects on PHQ-9 — age 75+
Estimate (95% CI)
Fasting glucose (mg/dL) 0.007 (-0.017, 0.031)
Serum glucose (mg/dL) 0.014 (-0.001, 0.028)
Insulin (uU/mL) -0.003 (-0.017, 0.010)
Glycohemoglobin / HbA1c (percent) 0.258 (-0.349, 0.866)
Triglyceride (mg/dL) -0.000 (-0.005, 0.004)
LDL cholesterol (mg/dL) -0.016 (-0.038, 0.007)
Total cholesterol (mg/dL) -0.010 (-0.023, 0.004)
HDL cholesterol (mg/dL) -0.014 (-0.053, 0.024)
Systolic BP (mm Hg) -0.016 (-0.042, 0.010)
Diastolic BP (mm Hg) -0.003 (-0.040, 0.034)
Alanine Aminotransferase / ALT (U/L) 0.020 (-0.040, 0.080)
Gamma Glutamyl Transferase / GGT (IU/L) 0.005 (-0.021, 0.031)
hs-CRP (mg/L) 0.034 (-0.021, 0.090)
Serum creatinine (mg/dL) 0.130 (-0.804, 1.064)
Blood urea nitrogen (mg/dL) -0.006 (-0.077, 0.064)
Uric acid (mg/dL) 0.203 (-0.165, 0.571)
Ferritin (ng/mL) 0.000 (-0.003, 0.004)
Serum iron (ug/dL) -0.010 (-0.029, 0.009)
Transferrin saturation (percent) -0.011 (-0.062, 0.041)
Transferrin receptor (mg/L) 0.148 (-0.246, 0.542)
−0.5
0
0.5
1
Effect size (Δ PHQ-9 per 1-unit predictor)