Klinik Eczacılık – II Dersi Uygulama 01

ÖĞRENCİ NO: 03180000003

**ADINIZ SOYADINIZ: HAKKI YALÇIN** 

Bayan T.T. 31 yaşında evli bir kadındır. Lise mezunudur. 3 yıldır evlidir. Daha önce eczanenize geldiğinde 2 yıldır çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını bununla ilgili yardımcı olabilecek televizyonda bazı bitkisel ürünler duyduğunu söylemiş sizden danışmanlık istemiştir. Öncelikli olarak uzman hekime gitmesi yönünde tavsiyeniz neticesinde hasta kadın doğum uzmanına gitmiştir. Kadın doğum uzmanının yönlendirdiği endokrinoloji hekiminden aldığı reçete ile eczanenize gelmiştir.

Hasta Adı Soyadı: T.T.

Cinsiyet: Kadın

Doğum Tarihi: 01.02.1988

## Vital Değerleri

Kan basıncı 110 / 70 mmHg

Nabız: 68

Vücut Sıcaklığı: 36.8

Boy: 168 cm

Kilo: 61 kg

## Laboratuvar Değerleri

Na	138 mEq/L	Ca 9.6 mg/dL	Albumin 4 g/dL	Anti-TPO antikor + TSH 9.8 mIU/L ↑ sT <sub>4</sub> 0.72 ng/mL	
K	4.2 mEq/L	Mg 2.0 mEq/dL	WBC 6.8x10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>		
Cl	98 mEq/L	AST 22 U/L	Hgb 13.1 g/dL		
	8 mg/dL	ALT 19 U/L	Hct 39.2%	Total Kolesterol 212	
	. 92 mg/dL	Alkalen fos. 54 U/L	MCV 89 mm <sup>3</sup>	mg/dL 个	
		T. Bilirubin 0.4 mg/dL		<b>LDL 142 g/dL ↑</b> HDL 46 mg/dL	

TG

125 mg/dL

## Güncel Reçetesi:

Euthyrox Tablet 50 mcg P: 1x1

Tamol Tablet P.R.N.

Oroferon Depo Kaplı Tablet 1x1

Klinik Eczacılık – II Dersi Uygulama 01

Eczacı Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?

Hasta Merhaba, hatırlarsınız size daha önce gelmiştim, uzman hekime gitmem yönünde

tavsiyede bulunmuştunuz. Ayrıntılı muayene sonunda beni endokrinoloji hekimine yönlendirdi. Hekim reçete yazdı ilaç kullanımı için eczacının bilgi

vereceğini belirtti.

Eczacı Merhaba, evet hatırlıyorum. İnfertilite ile ilgili hekiminiz herhangi bir teşhis koydu

mu?

Hayır, endometriyozis var mı diye muayene etti herhangi bir sorun bulunmadı.

Hormon değerlerim de normaldi. Her ikimizi CYB hastalıklar yönünden de

incelediler, sonuçlarımız negatif geldi. Bunun üzerine eşimi ürolojiye yönlendirdi.

Spermiyogram sonuçları normal geldi.

**Eczaci** Kayıtlarıma göre ayrıca yorgunluk şikayetleriniz olduğundan bahsetmiştiniz.

Hekiminize bu şikayetlerinizi ilettiniz mi?

Hayır gerek görmedim. Çocuk sahibi olmayı planlıyoruz ve iş yoğunluğum çok

fazla, yorgunluğumun buna bağlı olduğunu düşünüyorum.

**Eczaci** Bahsetmek istediğiniz başka bir şikayetiniz var mı?

Hasta Sadece son 3-4 aydır işte konsantre olmakta güçlük çekiyorum. Bu sanırım

uyumakta güçlük çekmemden ve geç yatmamdan kaynaklanıyor.

**Eczaci** Ailenizde önemli bir rahatsızlığı olan var mı?

Hasta Annemde tip-2 diyabet ve hipertansiyon var. Benden 4 yaş büyük ablamda da

Haşimato hastalığı var, 5 yıldır ilaç kullanıyor.

**Eczaci** Alkol veya sigara kullanıyor musunuz?

Hasta Sigara kullanmıyorum. Alkol nadiren kullanıyordum ama çocuk sahibi olmak

istediğimizden son iki senedir hiç kullanmadım.

**Eczaci** Reçetenizde yer alan ilaçları ne için kullandığınızı biliyor musunuz?

Hasta Evet, doktor Euthyrox'u tiroid için yazdı. Haftada 1-2 kere başım ağrıdığında

Tamol kullanıyorum onu da yazmasını rica etmiştim. Bir demir hapım var, o da

evde kalmamıştı yazdırdım.

**Eczaci** Demir hapınızı ne kadar süredir kullanıyorsunuz?

Hasta Lise çağlarımda demir değerlerim düşüktü o zaman yazmışlardı kullanmaya

devam ediyorum. Yalnız son bir senedir çok kabızlık yapıyor bende.

**Eczaci** Reçetenizde yer alan bu ilaçlarınız haricinde başka kullandığınız reçeteli/reçetesiz

ilaçlar var mı?

Hasta Evet aslında var. Çocuk sahibi olmaya hazırlanmak için kalsiyum takviyesi de olsun

diye Solgar'ın Calcium Magnesium Plus Boron Tablet'ini kullanmaya başladım. Az önce dediğim gibi kabızlık şikayetim için youtube reklamlarında Dulcosoft Oral solüsyon görmüştüm. Onu kullanmaya başladım. Ayrıca cilt kuruluğum çok arttı,

bunun için de bana bir krem önerebilir misiniz?

**Eczaci** Cildinizde kuruluk haricinde kızarıklık veya kaşıntı var mı?

*Hasta* Hayır, yok.

**Eczaci** Reçetenizi hazırlamadan önce sizi kısa bir süre bekletebilir miyim?

*Hasta* Tabi bekliyorum.

## **BAKIM PLANINIZI YAZINIZ:**

TANIM	Tedavi hedefi	Detaylı	Girişim	Takip ve İzlem
		değerlendirme		
1.Yeni tanısı koyulmuş hipotiroidi – güncel problem	TSH değerini 0,5-2,5 mlU/L değerlerinin arasında tutmak	Anti-TPO antikor değeri +,TSH değeri yüksek, serbest T4 değeri düşük normal, belirli semptomlar (yorgunluk vb.) ve ailede hipotiroidi öyküsü vardır.	Hastaya ilacın Euthyrox Tablet (Levotroksin) kullanımı detaylıca anlatılmalı, 2 ay sonra kontrole gitmesi sağlanmalıdır.	Hasta eczaneye geldiğinde 2 ay sonra kontrole gidip gitmediği ve semptomlar sorgulanmalıdır. İleriye yönelik gebelik durumunda ayda 1 TSH değeri ölçülmeli, ilaç alım zamanları ve yan etkileri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.
2. İlaç- ilaç etkileşimi – potansiyel problem	Hastanın kullandığı ilaçların birbirine olan etkisini önlemek	Hastanın kullandığı Solgar Calcium Magnesium Plus Boron tableti, kalsiyum tuzları içerdiğinden demir preparatlarının emilimini engelleyebilir.	Hasta bu etkileşim açısından bilgilendirilmeli, en az 4 saat arayla alınması gerektiği belirtilmelidir.	Hasta geldiğinde sorgulanmalı ve teyit edilmelidir
3. Konstipasyon – güncel problem	Hastayı rahatsız eden bu duruma çözüm bulmak	Demir preparatları veya hipotiroidi etkisiyle konstipasyon oluşmuş olabilir.	Demir preparatının gerekliliği kan değerlerine bakılarak değerlendirilmeli, ilaç kullanımından sonra konstipasyon devam edip etmemesine bakılmalıdır.	Hasta eczaneye geldiğinde bu konuda geri dönüt alınmalıdır.
4. İlaç-besin etkileşimi –	Hastanın kullandığı ilaçlarla	Levotiroksin içeren preparatlar aç	Hastaya kullandığı ilaçların nasıl alınması gerektiği	Hastaya yapılan bilgilendirilmeler bir sonraki

potansiyel	besinlerin	şekilde	detaylı bir şekilde	gelişinde
problem	etkileşmesini	alınmalıdır,	anlatılmalı, demir	sorgulanmalı ve
	önlemek	demir	preparatlarının	uyuncu kontrol
		preparatlarının	emilimini	edilmelidir.
		emilimini	etkileyen besinler	
		etkileyen	(süt, peynir, çay	
		yiyecekler vardır	vb.)yazılı olarak	
		ve hasta bunlar	verilmelidir, oral	
		için	demir	
		uyarılmalıdır.	preparatlarını	
			gece yemeğinden	
			en az 2 saat sonra	
			almak GI yan	
			etkiler açısından	
			fayda sağlayabilir.	
			Levotiroksin için	
			ise kahvaltıdan en	
			az yarım saat önce	
			alınması gerektiği	
			konusunda hasta	
			bilgilendirilmelidir.	