Klinik Eczacılık – II Dersi Uygulama 01

ÖĞRENCİ NO: 03170000081

ADINIZ SOYADINIZ: Kerem Çuhadar

Bayan T.T. 31 yaşında evli bir kadındır. Lise mezunudur. 3 yıldır evlidir. Daha önce eczanenize geldiğinde 2 yıldır çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını bununla ilgili yardımcı olabilecek televizyonda bazı bitkisel ürünler duyduğunu söylemiş sizden danışmanlık istemiştir. Öncelikli olarak uzman hekime gitmesi yönünde tavsiyeniz neticesinde hasta kadın doğum uzmanına gitmiştir. Kadın doğum uzmanının yönlendirdiği endokrinoloji hekiminden aldığı reçete ile eczanenize gelmiştir.

Hasta Adı Soyadı: T.T.

Cinsiyet: Kadın

Doğum Tarihi: 01.02.1988

Vital Değerleri

Kan basıncı 110 / 70 mmHg

Nabız: 68

Vücut Sıcaklığı: 36.8

Boy: 168 cm

Kilo: 61 kg

Laboratuvar Değerleri

Na 138 mEq/L Ca 9.6 mg/dL Albumin 4 g/dL **Anti-TPO antikor +** K 4.2 mEq/L Mg 2.0 mEq/dL WBC $6.8x10^{\circ}$ /mm $^{\circ}$ **TSH 9.8 mIU/L** \uparrow Cl 98 mEq/L AST 22 U/L Hgb 13.1 g/dL sT₄0.72 ng/mL BUN 8 mg/dL ALT 19 U/L Hct 39.2%

A.K.Ş. 92 mg/dL Alkalen fos. 54 U/L MCV 89 mm³ Total Kolesterol 212 mg/dL ↑

T. Bilirubin 0.4 mg/dL **LDL 142 g/dL** ↑

HDL 46 mg/dL

TG 125 mg/dL

Güncel Reçetesi:

Euthyrox Tablet 50 mcg P: 1x1

Tamol Tablet P.R.N.

Oroferon Depo Kaplı Tablet 1x1 Klinik Eczacılık – II Dersi Uygulama 01 Eczaci Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?

Hasta Merhaba, hatırlarsınız size daha önce gelmiştim, uzman hekime gitmem yönünde tavsiyede bulunmuştunuz. Ayrıntılı muayene sonunda beni endokrinoloji hekimine yönlendirdi. Hekim reçete yazdı ilaç kullanımı için eczacının bilgi

vereceğini belirtti.

Eczaci Merhaba, evet hatırlıyorum. İnfertilite ile ilgili hekiminiz herhangi bir teşhis koydu mu?

Hasta Hayır, endometriyozis var mı diye muayene etti herhangi bir sorun bulunmadı. Hormon değerlerim de normaldi. Her ikimizi CYB hastalıklar yönünden de incelediler, sonuçlarımız negatif geldi. Bunun üzerine eşimi ürolojiye yönlendirdi. Spermiyogram sonuçları normal geldi.

Eczaci Kayıtlarıma göre ayrıca yorgunluk şikayetleriniz olduğundan bahsetmiştiniz. Hekiminize bu şikayetlerinizi ilettiniz mi?

Hasta Hayır gerek görmedim. Çocuk sahibi olmayı planlıyoruz ve iş yoğunluğum çok fazla, yorgunluğumun buna bağlı olduğunu düşünüyorum.

Eczacı Bahsetmek istediğiniz başka bir şikayetiniz var mı?

Hasta Sadece son 3-4 aydır işte konsantre olmakta güçlük çekiyorum. Bu sanırım uyumakta güçlük çekmemden ve geç yatmamdan kaynaklanıyor.

Eczacı Ailenizde önemli bir rahatsızlığı olan var mı?

Hasta Annemde tip-2 diyabet ve hipertansiyon var. Benden 4 yaş büyük ablamda da Haşimato hastalığı var, 5 yıldır ilaç kullanıyor.

Eczaci Alkol veya sigara kullanıyor musunuz?

Hasta Sigara kullanmıyorum. Alkol nadiren kullanıyordum ama çocuk sahibi olmak istediğimizden son iki senedir hiç kullanmadım.

Eczacı Reçetenizde yer alan ilaçları ne için kullandığınızı biliyor musunuz?

Hasta Evet, doktor Euthyrox'u tiroid için yazdı. Haftada 1-2 kere başım ağrıdığında Tamol kullanıyorum onu da yazmasını rica etmiştim. Bir demir hapım var, o da evde kalmamıştı yazdırdım.

Eczaci Demir hapınızı ne kadar süredir kullanıyorsunuz?

Hasta Lise çağlarımda demir değerlerim düşüktü o zaman yazmışlardı kullanmaya devam ediyorum. Yalnız son bir senedir çok kabızlık yapıyor bende.

Eczaci Reçetenizde yer alan bu ilaçlarınız haricinde başka kullandığınız reçeteli/reçetesiz ilaçlar var mı?

Hasta Evet aslında var. Çocuk sahibi olmaya hazırlanmak için kalsiyum takviyesi de olsun diye Solgar'ın Calcium Magnesium Plus Boron Tablet'ini kullanmaya başladım. Az önce dediğim gibi kabızlık şikayetim için youtube reklamlarında Dulcosoft Oral solüsyon görmüştüm. Onu kullanmaya başladım. Ayrıca cilt kuruluğum çok arttı, bunun için de bana bir krem önerebilir misiniz?

Eczaci Cildinizde kuruluk haricinde kızarıklık veya kaşıntı var mı?

Hasta Hayır, yok.

Eczacı Reçetenizi hazırlamadan önce sizi kısa bir süre bekletebilir miyim?

Hasta Tabi bekliyorum.

Klinik Eczacılık – II Dersi

Uygulama 01

BAKIM PLANINIZI YAZINIZ:h

TANIM	Tedavi hedefi	Detaylı	Girişim	Takip ve İzlem
		Değerlendirme		
1.Hipotiroidiz m- Güncel problem	Tiroid değerlerini belirtilen aralığa getirip normalleştirm ek (0,5-2,5 mIU/mL)	Hastada hipotiroidizm ile ilişkili olabilecek semptomlar görülmektedir. (Strese bağlı yorgunluk, bazı zamanlar uykusuzluk, kabızlık ve cilt kuruluğu).Hastanın laboratuar değerlerinde bakıldığında da hipotiroidizm belirtileri görülmektedir. (Yüksek TSH, düşük normal T4, otoimmun antikor yanıtı, hafif yüksek LDL)	Tiroid fonksiyonları normalize olana kadar hastaya alerjen olmayan cilt nemlendirici desteği önerilir, hastaya cilt kuruluğuna neden olabilecek ürünlerden kaçınması gerektiği anlatılmalıdır. Hastaya doz yüksek gelirse hipertiroidiyi taklit eden olası yan etkiler görülebileceği açıklanmalıdır. Hastaya Tiroid fonksiyonları normalize olduğu halde semptomların devam etmesi halinde bunların değerlendirilmesi gerekebileceği anlatılır. İlacı aç karna alması gerektiği hastaya anlatılmalıdır. Demir preparatı ile etkileşebileceği için alım zamanı arasında 4 saat bulunması gerektiği anlatılmalıdır. Hasta belirtilen ilacı uzun bir dönem boyunca çok yüksek dozlarda almasının	Hastanın menstrüel dönemi izlenmelidir; uykusuzluk, yorgunluk, cilt kuruluğu problemlerinin tedaviyle düzelip düzelmediği takip edilmelidir. Hasta ilaca başladıktan 4 ila 6 hafta sonra TSH değerleri kontrol edilmelidir. Değerler ideal hedefe ulaşmışsa 6 ayda bir veya yılda bir defa hastanın TSH değerlerine baktırması yeterlidir. Eğer gebelik meydana gelirse TSH değerleri ayda 1 kere izlenmelidir.

	1	Ι	Π	
			kardiyovasküler ve kemik sisteminde çeşitli problemlere yol açabileceği konusunda bilgilendirilmelidir . Aynı şekilde Solgar'ın ilacı ile de etkileşebileceğind en Solgar'ın ilacını gece kullanması gerektiği anlatılmalıdır. Hastaya marka değiştirmemesi gerektiği söylenmelidir. Oral biyoyararlanım düşük olduğu için marka değiştirilmemelidi r.) Takip, izlem için rutin izlemlerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda hasta bilgilendirilmelidir	
2. Yetersiz tedavi- Güncel Problem	Yetersiz tedaviyi önlemek			
3. Gereksiz ilaç kullanımı- Potansiyel Problem	Gereksiz ilaç kullanımını önlemek	Hasta uzun süredir demir ilacı kullanmaktadır,hasta nın demir değerlerinin normal olup olmadığı bilinmemektedir.	Hastanın demir preparatının kullanımının gerekliliği doktora yönlendirilerek araştırılmalıdır.	Hastanın doktor kontrolü, kandaki demir değerinin değerlendirilmesi,de mir ilacının kullanımı kontrol edilmelidir.
4. Olası ilaç etkileşimi (Euthyrox tablet- Oroferon Depo Kaplı	Olası ilaç etkileşmesini önlemek	Hastanın kullandığı demir preparatı ile Solgar'ın Calcium Magnesium Plus Boron Tablet etkileşmektedir.	Hastanın Euthyrox'u aç karna alması gerektiği hastaya anlatılmalıdır. Demir preparatı	Hasta ilaçlarını önerilen zamanlarda kullanmaya özen gösterip göstermediği kontrol edilir.

Tablet ve Oroferon Depo Kaplı Tablet - Calcium Magnesium Plus Boron Tablet) Potansiyel Problem	(İçeriğindeki magnezyum ve kalsiyum gibi divalan katyonlardan dolayı) Ayrıca Euthyrox tablet ve Oroferon Depo Kaplı Tablet birlikte alındığı zaman etkileşerek levotiroksinin emilimini	ile etkileşebileceği için alım zamanı arasında 4 saat bulunması gerektiği anlatılmalıdır. Aynı şekilde Solgar'ın ilacı ile de Oroferon etkileşebileceğind en Solgar'ın ilacını	
r robiem		, ,	
		anlatılmalıdır.	