

LC 05 Synthèse inorganique

Maxime

April 25, 2019

Contents

1	Prérequis	2
2	Les complexes inorganiques	2
2.1	Définition	2
2.2	Propriétés	2
2.3	Utilisation des complexes	2
3	Synthèse d'un complexe	2
3.1	Le trioxalatoferrate(III)	2
3.2	Synthèse "en direct" de ce complexe.	3
3.3	Rendement	3
3.4	Dosage du complexe sec	3
4	Conclusion	3

1 Prérequis

- Réactions acide-base et Red/Ox
- Structures électroniques des espèces
- Dosages

2 Les complexes inorganiques

2.1 Définition

Complexe = association d'un ion ou atome central (qui peut accepter un doublet électronique) avec un ligand (espèce qui peut céder un doublet d'électrons).

Ex de ligands : Cl^- , l'ammoniac NH_3 , O_2CCO_2 (à donner en représentation de Lewis).

2.2 Propriétés


Définition des termes : atome "monodentate" et "polydentate", et illustration avec les exemples précédents.

Indice de coordination : nombre de liaisons entre l'atome/ion central et le ligand.

$$M + nL = ML_n \quad K_s = \beta = \left(\frac{[ML_n]}{[M][L]^n} \right)_{eq} \quad (1)$$

2.3 Utilisation des complexes

Séparation des métaux : beauxite + soude



Couleurs des complexes très utilisées pour mettre en évidence la présence d'ions. Leurs couleurs sont aussi utilisées comme pigments, comme par exemple $KFe^{III}[Fe^{II}(CN)_6]$ qui est bleu. Leurs couleurs sont aussi utilisées pour l'analyse chimique.

Les complexes sont aussi notamment utilisés dans la photographie comme par exemple $AgCl$, $AgBr$ car ils réagissent de manière "utile" lorsqu'ils sont excités par des photons.

3 Synthèse d'un complexe

3.1 Le trioxalatoferrate(III)

Formule : $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$

Représentation de Lewis.





Ici le nombre de coordination est $n = 6$.

Ce complexe est notamment utilisé pour le développement des photographies, et dans les Actinomètres : appareils qui servent à mesurer une intensité lumineuse. Ce grâce au fait que ce complexe est photo sensible et réagit donc aux stimulations lumineuses.

3.2 Synthèse "en direct" de ce complexe.

Donne une couleur verte intense. Doit être protégé de la lumière (avec un morceau de papier alu par exemple) car photosensible. On le place ensuite dans la glace pour qu'il cristallise (soluble à température ambiante).

Explications de la manip :



Quantités introduites : on donne la masse de chacun des éléments mis en jeu. On en déduit

$$n_{C_2O_4^{2-}} \text{ et } n_{Fe^{3+}} \quad (7)$$

On en conclut quel est le réactif limitant.

Retour à la manip : on filtre la solution contenant le complexe avec un filtre Buchner afin de recueillir les cristaux de complexe.

3.3 Rendement

On peut maintenant calculer le rendement en pesant les cristaux obtenus, selon

$$\eta = \frac{m_{mesuree}}{n_{Fe^{3+}} M_{comp}} = 60,8\% \text{ ici} \quad (8)$$

3.4 Dosage du complexe sec

Mélange Ac sulfurique + complexe puis dosage des ions oxalates par le permanganate selon



On en déduit

$$n_{comp} = \frac{5}{2} C_0 V_{eq} = \frac{5}{2} \times 2,0 \cdot 10^{-2} \times 13,25 \cdot 10^{-3} = 6,625 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \quad (10)$$

4 Conclusion

Ces procédés de synthèse sont utilisés à plus grande échelle dans l'industrie. Il existe aussi des synthèses organiques qui mettent en jeu des procédés différents.

Questions

Concernant le schéma de Cl^- , pouvez vous le dessiner (en représentation de Lewis) ? Idem pour l'ion oxalate ?

Quels sont les bases/Acides associées ?

Dans le cadre d'un procédé industriel quel est l'intérêt de l'équation (2) ?

$AgCl$ et $AgBr$ sont ils des complexes ?

Pour la molécule de trioxalatoferrate(III) $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ les liaisons sont elles toutes dans le même plan ?

Ce complexe peut permettre de mesurer l'intensité lumineuse et est dégradé en même temps quand il est exposé à la lumière... pouvez vous l'expliquer ?

Lors de la synthèse du complexe : est ce un problème de rajouter de l'eau ?

Oui car le complexe va moins précipiter.

Un ion complexe peut il précipiter (seul) ?

Non.

Un complexe neutre peut il précipiter (seul) ?

Oui.

Pourquoi chauffe t'on lors du dosage du complexe ?

La réaction est plus rapide lorsqu'on apporte de la chaleur.

Quel est l'avantage dans le procédé bayer de former de la beauxite ?

Une fois que l'on a obtenu l'aluminium se dissout en milieu basique tandis que le fer reste solide. On peut ainsi les séparer.

Actinomètre : Que se passe t'il lorsque $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ est mis à la lumière ?

Le complexe se dégrade en se transformant en oxalate de fer II lorsqu'il est éclairé.

Remarques

la constante de complexation doit être notée β_n pour le complexe $[Fe(C_2O_4)_n]^{n-}$.

Toujours mettre les lunettes quand on manipule.

Traiter les déchets en direct.

Mieux préciser les opérations faites pendant la préparation.

Le plan est bon.

Cette leçon n'apparaît que dans les programmes de terminales STL.

Possibilité de parler de "chimie verte" dans cette leçon. On peut évoquer aussi le bio-mimétisme pour la synthèse de complexes inorganiques.

Utiliser un tableau d'avancement pour expliquer la notion de rendement.

On peut gagner du temps en projetant les masses molaires etc... pour le calcul du rendement.

Pour la cristallisation : essayer de faire la synthèse plus tôt pour avoir plus de cristaux.

Concernant les énumérations de propriétés ou utilisations possibles : prescrire et plutôt montrer des complexes colorés par exemple.

Pour les charges totales : ne pas les représenter SUR les molécules, les mentionner à côté.

Mentionner le fait qu'on détruit la majorité des complexes en protonant le ligand.