

# Natürlichen Wälder und Gehölzfluren Irāns.

Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität - Floristic, life form and chorological studies of the Abshar protected area, Shirgah, Mazandaran Province, north of Iran



Description: -

-

Scientists -- Employment -- United States -- Bibliography

Technology -- Vocational guidance -- United States -- Bibliography

Science -- Vocational guidance -- United States -- Bibliography

Trees

Shrubs

Forestry -- Irannatürlichen Wälder und Gehölzfluren Irāns.

-

Bonner geographische Abhandlungen, Heft 8natürlichen Wälder und Gehölzfluren Irāns.

Notes: Bibliography: p. 50-54.

This edition was published in 1951



Filesize: 57.38 MB

Tags: #Bobek, #Hans

## Hans Bobek

Elle est caractérisée par les espèces du genre et d'autres plantes endémiques. Mordak Orchidaceae GC ES-M Orchis mascula L. Raubtiere sind mit Pumas oder Puma concolor, Leopardus pardalis, Lynx rufus und Lynx canadensis vertreten.

## Vol. 43, No. 2, Apr., 1953 of Geographical Review on JSTOR

Die Bewegung des kann sogar Spitzengeschwindigkeiten von 3 Knoten erreichen. L' et les sont probablement parmi les exemples les plus frappants de l'influence de la topographie sur les habitats naturels de la flore et de la faune. The synonymy of *Homoneura septentrionalis* Loew 1847, and H.

## Flore d'Iran

Niederschlagsarmut kennzeichnet auch die sich im Lee der befindenden.

## Bobek, Hans

Les chaînes montagneuses de l', des et le nord-ouest de l'Iran sont caractérisées par des surplus de précipitations; ils sont donc humide pour une partie de l'année, voire toute l'année. *Cliropteronmyza wegelii* Frey 56 und 57: Kopf; 58: Endsegmente des männlichen Abdomens; 59: innerer Kopulationsapparat des Männchens. Im Osten sind alle Flüsse, während manche Wasserläufe im Westen nur oder Wasser führen.

## Vol. 43, No. 2, Apr., 1953 of Geographical Review on JSTOR

Schließlich und vor allem haben auch andere Autoren seit 1958 wesentliches zur Kenntnis der Schizophora beigetragen. Die genauere Stellung von *Protaulacigaster* im System der Aulacigastridae läßt sich schwer feststellen.

## **Ortler: Hier entdecken Kinder spielend die Natur**

Vor allem Braunerden und Schwarzerden bieten ein hohes und wurden meist in agrarisch genutzte Flächen umgewandelt. Climatically, the Caspian lowland may be regarded, on the whole, as a region of rainy summers and mild winters which are reminiscent of a typical oceanic climate, not unlike to that of the Atlantic coast of Europe Zohary, 1973.

## Related Books

- [German Gothic - designs and ornaments](#)
- [Fundamental mathematics](#)
- [Fairer than she](#)
- [Factors affecting the recognition of faults exposed in exploratory trenches. by M.G. Bonilla and J.](#)
- [Nkrumah and the Ghana Revolution](#)