


Toxicomanie, sciences du langage, une approche clinique

L'Harmattan - Maladie d'Alzheimer et troubles de la communication



Description: -

- Parents of drug addicts -- Language. Psycholinguistics. Drug addicts -- Family relationships. Drug addicts -- Language. Toxicomanie, sciences du langage, une approche clinique

- Acteurs de la science Toxicomanie, sciences du langage, une approche clinique

Notes: Includes bibliographical references (p. 337-343).

This edition was published in 2003



Filesize: 4.22 MB

Tags: #DU #CLINIQUES #DU #TRAVAIL #ET #PRATIQUES #D'INTERVENTION #(DUCTI)

L'approche clinique d'inspiration psychanalytique : enjeux théoriques et méthodologiques

Aussi, il n'y a aucun consensus dans le domaine de l'abus de substances psychoactives quant à la façon dont il faudrait classer les sous-groupes importants de personnes ayant des problèmes de consommation de substances psychoactives. L'alcoolisme et la toxicomanie sont nettement plus élevées chez les personnes boulimiques que chez les anorexiques qui limitent leur alimentation.

Site du laboratoire LIDILEM

Activation et façonnage du changement comportemental 6. Il faut approfondir la recherche sur l'impact des interventions au niveau des systèmes sur l'accès au traitement et au soutien, l'engagement et la continuité dans le système de soins et l'efficacité et la rentabilité des diverses interventions pour chacun des sous-groupes de l'ensemble des troubles concomitants. Bien que les entretiens de recherche en sciences humaines n'aient pas toujours un objectif d'intervention thérapeutique, le chercheur et le sujet y sont également inscrits dans un échange transféro-contre-transférentiel.

Site du laboratoire LIDILEM

De plus, la plupart des analystes conviennent que ces obstacles historiques sont au cœur d'un grand nombre des problèmes qu'éprouvent aujourd'hui les clients souffrant de troubles concomitants qui essaient d'obtenir de l'aide dans les deux systèmes. Dans cet examen, les travaux du docteur Kate Carey et de ses collègues, , ont été utilisés pour le dépistage.

Maîtriser la conversation clinique

Une troisième recommandation compatible pour l'évaluation des personnes présentant des troubles concomitants est d'évaluer leur motivation à l'égard du changement, notamment « le stade de changement » ou le stade de la personne dans le processus du traitement.

Related Books

- [Using rubrics to improve student writing, grade 1](#)
- [Grammatical analysis of the Greek New Testament](#)
- [Realismus und Naturalismus](#)
- [Crónica dos anos da peste](#)
- [American Revolution\]](#)