
Eaux souterraines du Sahel - étude des ressources : propositions détudes typologie des captages

Bureau de recherches géologiques et minières, Agence détudes de géologie appliquée à létranger - RAR 2011



Description: -

Household supplies -- Congresses.

Cosmetics -- Congresses.

Slavery -- Great Britain -- Societies, etc

Antislavery movements -- Great Britain

African Americans -- Civil rights

African Americans -- Social conditions -- 1964-1975

Hydrology -- Sahel -- Maps

Water resources development -- Sahel

Groundwater -- Saheleaux souterraines du Sahel - étude des ressources : propositions détudes typologie des captages

Sahel, documents and dissertations -- AS 089.eaux souterraines du Sahel - étude des ressources : propositions détudes typologie des captages

Notes: Microfiche. Ann Arbor, Mich.: University Microfilms International, 1980. -- 2 sheets; 11 x 15 cm -- (Sahel: documents and dissertations; AS 089).

This edition was published in 1980



Filesize: 53.28 MB

Tags: #Etude #d'Impact #sur #l'Environnement

Editions Maisonneuve et Librairie

Tang - Dynamique des structures, 2ème année R. CONNAISSANCES ET SENSIBILISATION SUR LES RESSOURCES EN EAU 77 2.

PDF (5.2 Mb

La moyenne de 312,5 mm est supérieure à la normale 1961-1990 312,5 mm L'analyse de la station de Saint-Louis débute de 1892 à 2008 avec cinq années lacunaires. La visite à la direction de l'hydraulique ne nous a pas permis d'avoir les prélèvements en eau par l'agriculture dans la zone des Niayes.

Hydro

Tableau 10: Statistique du cheptel des départements de la zone des Niayes Départements Bovins Ovins Caprins Porcins Equins Asins Camelins Volaille Familiale Pikine Guédiawaye 2200 50270 12000 140 1520 110 - - Rufisque 18370 58240 35630 1100 3640 870 - 1941000 Thiès 48150 66150 56400 9400 16860 13300 - 1481200 Tivavouane 39250 55440 47040 1770 21200 15300 - 1157400 Louga 128850 207160 184800 - 33270 6830 2860 763600 Kebemer 50500 308140 280850 - 17630 3830 150 604000 Saint-Louis 12070 11600 22880 - 300 3630 430 238760 TOTAL 297190 701560 639600 12410 94420 43870 3440 1606360 TOTAL PAYS 3210210 5251220 4476960 326780 523650 441660 4696 21888690 % 9,25 13,3 14,2 3,7 18 10 73,2 7,33 Source : Direction de L'élevage En 2008 la zone des Niayes héberge 9,25% du cheptel national bovin soit 297 190 têtes. The deficiencies in management are due to: - At the institutional level: we have the lack of skilled workers in water domain and the ignorance of text which describe their role in drinking water domain. En outre, l'impact continuera d'être principalement ressenti par les pauvres, car ils bénéficient de l'accès le plus limité aux ressources en eau.

Editions Maisonneuve et Librairie

Sustainable halophyte utilization in the Mediterranean and subtropical dry regions. Thesis, milie Neveu, « Application des méthodes multigrilles à

l'assimilation de données en géophysique », Joseph Fourier University, Grenoble, 31st March 2011.

Related Books

- Personal art of David Octavius Hill
- Factors affecting the detection of psychiatric morbidity by general practitioners
- <u>Fairy stories</u>
- Mental health project grants a program of the National Institute of Mental Health
 Qirā'āt ma'a al-Shābbī wa-al-Mutanabbī wa-al-Jāḥiz wa-Ibn Khaldūn