

Trichocephalus puffadás Trichocephalosis puffadás

Для надежности, я еще раз сдала анализы и никаких паразитов не обнаружили! Для развития лентеца широкого требуется смена нескольких промежуточных и затем окончательного хозяев.

Яйцо широкого лентеца под микроскопом

При выраженной анемии до начала дегельминтизации назначается витамин B12 цианокобаламин по 200-500 мкг внутримышечно 2-3 раза в неделю в течение месяца, а также препараты фолиевой кислоты железа. Как правило, в силу пищевых привычек, взрослые болеют чаще детей. Do you see an error? Boala este raspandita pe o mare parte a globului, fiind mult mai frecventa in zone tropicale, subtropicale si, uneori, in unele zone cu clima temperata.

Fróðskaparrit

This page has been proofread at least once. Лентец широкий *Diphyllobothrium latum*, прежнее название *Bothriocephalus latus* Яйцевидная форма; толстая, гладкая оболочка серого или темнобурого цвета; внутри яйца крупнозернистое содержимое, на верхнем полюсе — крышечка, на противоположном — бугорок утолщение скорлупы. Лучшие истории наших читателей Тема: Во всех бедах виноваты паразиты! Den blef det vanliga attributet för hafsguden Poseidon 1.

Related Books

- [Wave-Length Standards For Radial-Velocity Determinations From B-Type Spectra.](#)
- [Aviators guide to navigation](#)
- [Discovering science in the elementary school](#)
- [Thinking through the death of God - a critical companion to Thomas J.J. Altizer](#)
- [Inside out - psychological self-portraiture : Philip Akkerman ... \[et al.\] : the Aldrich Museum of C](#)