Cultivo del garbanzo en Sinaloa

Imp. de Estudios Geograficos y Climatologicos - Llega el garbanzo a los \$22 mil por tonelada en Sinaloa.



Description: -

Chickpea -- Mexico -- Sinaloa (State)Cultivo del garbanzo en Sinaloa

-Cultivo del garbanzo en Sinaloa

Notes: At head of title: Secretaria de Agricultura y Fomento.

Dirección de Agricultura y Ganaderia. This edition was published in 1926



Filesize: 31.74 MB

Tags: #La #producción #de #garbanzo #como #alternativa #de #consumo

La producción de garbanzo como alternativa de consumo

Gustavo Rojo Plasencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa Caades , indicó que en el estado se establecieron 10 mil hectáreas de este cultivo y esperan que en primavera-verano, más productores aprovechen la demanda internacional que tiene la leguminosa. Esta cepa indujo el mayor aumento del rendimiento, pero Bacillus sp. La delegación estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reportó que la superficie sembrada con garbanzo se distribuyó principalmente en las zonas productoras de Guamúchil, en donde se establecieron 9 mil 774 hectáreas en la zona de riego y 7 mil 900 en el temporal; Culiacán, 2 mil 914 de riego y 2 mil 354 de temporal; Guasave, con 13 mil 065 de riego y 4 mil 957 de temporal; Los Mochis, con mil 712 de riego y 40 de temporal; y, finalmente La Cruz, con 112 hectáreas de riego y 108 de temporal.

CONTROL DE LA FUSARIOSIS VASCULAR DEL GARBANZO (Cicer arietinum L.) POR MICROORGANISMOS NATIVOS DE SINALOA, MÉXICO

Hoy en día se le considera la enfermedad más importante en el cultivo del garbanzo aunque hasta hace poco tiempo lo fue la rabia.

El 2020 será el año del "garbanzo de a libra"

Teléfonos: 55 5363-0193, 55 7259-4708, WhatsApp: 55 1501-0996.

CONTROL DE LA FUSARIOSIS VASCULAR DEL GARBANZO (Cicer arietinum L.) POR MICROORGANISMOS NATIVOS DE SINALOA, MÉXICO

De un promedio de rendimiento de 2. Durante el ciclo agrícola 2017-2018, en Sinaloa se sembraron 101 mil 450 hectáreas de donde se obtuvo una producción de 185 mil 895 toneladas, para un rendimiento medio de 1. Normalmente tiene una longitud de 40-50 cm de profundidad.

El Garbanzo (Sinaloa) Sinaloa

Activación de los aislamientos Las bacterias se cultivaron por asadas en placas Petri con medio de cultivo a base de Agar FLO 20 g mezcla de peptonas, 14 g agar-agar, 15 g K 2HPO 4, 15 g MgSO 4 y 1.

Related Books

- 20 villes à pied.
- Television in politics its uses and influence, by Jay G. Blumler and Denis McQuail.
 Anarchie ist Gesetz und Freiheit ohne Gewalt Uwe Timm zum 60. Geburtstag.
- <u>Caïds du vélo.</u>
- Theatre des instrymens mathematiques & mechaniques de Iaques Besson dauphinois docte mathematicien.