

# Strumpfbandnattern - Biologie, Verbreitung, Haltung

## Westarp-Wissenschaften - Gewöhnliche Strumpfbandnatter



Description: -

-

Garter snakes.Strumpfbandnattern - Biologie, Verbreitung, Haltung

-

Bd. 620

Die neue Brehm-Bücherei ;Strumpfbandnattern - Biologie, Verbreitung, Haltung

Notes: Includes bibliographical references (p. 164-172).

This edition was published in 1995



Filesize: 8.37 MB

Tags: #Hessischer #Bildungsserver

### Die Strumpfbandnattern

Außerdem wird fast jeden Tag ein wenig gesprüht, aber nur mit angewärmtem Wasser. Je nach Alter und Futtermenge benötigen die Schlangen 1-3 Fütterungen pro Woche. The head has paired internasal, prefrontal and parietal shields and a single frontal scutum.

### Thamnophis :: Fantastic Reptiles

Wenn man eine Schlange kauft, erkennt man selten auf den ersten Blick, ob das Tier von Parasiten befallen ist, deshalb gilt hier: strikte Quarantäne für jedes neugekaufte Tier vor allem bei Wildfängen, die Schlange muss über einige Wochen beobachtet werden und der erste abgesetzte Kot sollte sofort auf Wurmbefall kontrolliert werden. Ein Wurf umfasst in der Regel fünf bis fünfundzwanzig Jungtiere.

### Thamnophis radix

Die Jungtiere sind bei der Eiablage bereits voll ausgebildet und nur noch von einer dünnen, durchsichtigen Eihülle umgeben. Eine wissenschaftliche fundierte Taxonomie lässt sich für Fische derzeit noch nicht aufstellen, da immer wieder neue Arten entdeckt und bestehende Kategorien bearbeitet werden. Selbst das leiseste Rascheln und das leichteste Quieken, von Nagetieren wird noch erfasst, was durch die Möglichkeit, die Ohren um bis zu 180 Grad zu drehen und die Trichterform der Ohrmuscheln unterstützt wird.

### Der Schabracken

Der Körper dieser barschartigen Knochenfische ist zylindrisch, lang und schlank mit einem langen Kopf und ebenso langer Schnauze.

### San Francisco Strumpfbandnatter

Wie die Bezeichnung bereits verrät, besteht das Skelett dieser Fische aus Knorpel, der jedoch mit zunehmendem Alter der Tiere durch Kalkablagerungen immer fester wird. In jedem Fall sollen die Tiere in dieser Zeit außer zur Gesundheitskontrolle möglichst wenig gestört werden. Die Exkremente, mit denen die Schlangen nicht gerade geizen, müssen bei dem gewählten Boden aber schnell erkannt und entfernt werden können! In Einzelfällen wurden allerdings auch schon Wurfgrößen von mehr als 80 Jungtieren beobachtet.

## **Strumpfbandnatter**

Rücken- und Seitenstreifen weisen häufig verschiedene Farben auf und können dunkel umrandet sein. Gewöhnliche Strumpfbandnatter

Gewöhnliche Strumpfbandnatter hier die : Serpentes : : Colubridae : Natricinae : Thamnophis : Gewöhnliche Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis  
, 1758 Die Gewöhnliche Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis ist die bekannteste Schlangenart innerhalb der Thamnophis.

---

## Related Books

- [Historia di casa Orsina - con quattro libri de gli huomini illustri della famiglia, nequali dopo le](#)
- [A sentimental journey The journal to Eliza](#)
- [Pflichten und Haftung des Versicherungsmaklers](#)
- [Notes of a tour through the provinces of Quebec, Ontario, Manitoba, and the north-west territory of](#)
- [Kyōkaisen no bungaku - sōzō to kyōki no kaiseki](#)