


Transport A Grande Distance des Polluants Atmosphériques - Les Pluies Acides et la Faune.

s.n - Livros: atmosphériques



Description: -

-Transport A Grande Distance des Polluants Atmosphériques - Les Pluies Acides et la Faune.

-Transport A Grande Distance des Polluants Atmosphériques - Les Pluies Acides et la Faune.

Notes: 1

This edition was published in 1985



Filesize: 54.29 MB

Tags: #Enjeux #environnementaux #associés #à #la #pollution #atmosphérique

Livros: atmosphériques

L'emprisonnement des acides dans ta masse neigeuse de l'hiver peut conduire à la libération de concentrations exceptionnellement élevées de sulfate dans les premiers stades de la fonte des neiges, d'où les risques à court terme d'acidification des eaux de surface. Dans le sud-ouest du Québec, la richesse en espèces de poissons a subi un décroissement de 23 % depuis le début de l'acidification. Les études ont révélé la baisse du pH au cours des 50 ou 100 dernières années, ayant pour cause principale les émissions provenant des fours avoisinants, et la hausse de pH observée récemment, résultant de la réduction de ces émissions.

L'action du Québec contre les pluies acides en Amérique du Nord

Cependant Scriven et Fisher 1975 ont démontré que cette hypothèse n'avait pas trop de conséquences sur les résultats.

Pluies acides : causes et effets

Lorsque le pH se situe au-dessous de 5,8, il se forme des nappes d'algues en bordure de nombreux lacs. Inciter les autorités fédérales des deux pays à s'engager à majorer d'ici l'an 2010 leurs objectifs de réduction des émissions annuelles de dioxyde de soufre de 50 % par rapport aux seuils actuels. En tant que centre de recherche indépendant, Clear Seas fonctionne sans lien de dépendance avec ses bailleurs de fonds.

L'action du Québec contre les pluies acides en Amérique du Nord

Pour parvenir à réduire les émissions jusqu'aux limites fixées pour 1994, elle emploiera plusieurs techniques dont le rejet de la pyrrhotine, l'accroissement du temps de grillage et une meilleure utilisation des fours électriques. Une nouvelle version de cet outil a récemment été lancée, version dans laquelle les données sur les activités et les facteurs d'émissions ont été mis à jour.

Livros: radioactifs

Une étude de la sensibilité du modèle permet d'identifier les paramètres qui sont les plus sensibles aux variations des retombées des diffé-rents

composés du soufre.

Modèle québécois de transport à grande distance des polluants atmosphériques.

Il est admis que les indicateurs de la qualité de l'eau sont très utiles pour détecter les Premiers signes d'altération de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes. Les résultats, sous forme de tableaux, permettent d'estimer les dépôts totaux à chaque récepteur et de comparer la contribution relative de chaque source aux dépôts totaux simulés. Par rapport au niveau I, le niveau III impose une réduction de 80 % des émissions de NO_x pour tous les navires construits après le 1^{er} janvier 2016.

Related Books

- [Handbook of Christian social ethics.](#)
- [Victoria University - presidents annual report for 1997-1998 submitted to the Board of Regents.](#)
- [The Social Security \(Claims and Payments\) \(Amendment No. 3\) Regulations \(Northern Ireland\) 1994 \(Sta](#)
- [P.M. - Aufsätze von Peter Meyer, 1921-1974](#)
- [Kulliyāt-i Sa‘dī Shīrāzī.](#)