


Estudio epidemiológico sobre los psicostornos en Querétaro

Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Psicología, Departamento de Investigaciones Psicológicas - Querétaro, pionero en intervención oportuna de Infarto Cerebral



Description: -

Psychiatric epidemiology -- Mexico.estudio epidemiológico sobre los psicostornos en Querétaro

-estudio epidemiológico sobre los psicostornos en Querétaro

Notes: Includes bibliographical references (p. 59-61).

This edition was published in 1992



Filesize: 37.34 MB

Tags: #Estudio #epidemiológico #de #los #trastornos #de #la #conducta #alimentaria #en #población #escolarizada #en #el #estado #de #Nayarit, #México

Querétaro, pionero en intervención oportuna de Infarto Cerebral

Diario Oficial de la Federación 2011 mayo 20. La incluye los factores de riesgo en 19 expedientes; entre ellos, la presencia de antecedentes familiares de diabetes en el 42% abuelos , LPH solo en un caso primo y epilepsia en un caso madre.

Epidemiología de los trastornos de ansiedad

De acuerdo con la revisión de la bibliografía especializada, dentro de los factores ambientales que contribuyen en la formación de LPH destacan las poblaciones con un nivel socioeconómico bajo.

Querétaro regresa a rojo en el semáforo epidemiológico federal

Journal of Adolescent Health, 28 4 , 338-45. Se deben desarrollar estudios más profundos, específicos e interdisciplinarios para entender mejor la epidemiología, tanto del vector como del virus de la RPB. En cuanto a afección de paladar duro, se presentó en el 82% de los casos, de los cuales el 11% no involucró el labio, y el sexo masculino fue el más afectado 39%.

Estudio epidemiológico de los trastornos de la conducta alimentaria en población escolarizada en el estado de Nayarit, México

La variante antigénica viral V11 fue la más frecuente 173 casos , presente en los tres estados estudiados. La rabia paralítica bovina RPB es una forma de presentación de la enfermedad en bovinos y otras especies domésticas, caracterizada por la parálisis del tren posterior. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 5 2 , 135-148.

Trastornos de la conducta alimentaria en España: Revisión de estudios epidemiológicos

Las tasas de incidencia reportadas a nivel nacional para 2011 y 2012 fueron de 0.

Estudio epidemiológico de los trastornos de la conducta alimentaria en población escolarizada en el estado de Nayarit, México

Rodríguez AA, Cisneros JAC, Gutiérrez MMCS, Reyes MMP. La tasa de prevalencia global de TCA fue del 3,43%.

Related Books

- [Immune-deficient animals](#)
- [Syon - a brief account](#)
- [Slučaj Jugoslavija](#)
- [Torat nazir - otsar perushim 'al Masekhet Nazir.](#)
- [Variations in mechanical and cross-sectional properties of steel.](#)