

Estudio epidemiológico sobre los psicotrastornos en Querétaro

Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Psicología, Departamento de Investigaciones Psicológicas - Estudio epidemiológico de los trastornos de la conducta alimentaria en población escolarizada en el estado de Nayarit, México

Tabla 3 Resultados del estudio desagregados por sexo y edad, empleando diferentes puntos de corte e incluyendo la positividad en ítems conductuales.									
	Total de la muestra	Punto de Corte			Sólo positividad en ítems conductuales (en punto de corte X)				Sólo 17 ítems CBA
		10	19	20	21 y positividad en ítems conductuales	Sin 17 ítems CBA	Sin 17 ítems CBA	Sin 17 ítems CBA	
11 años en riesgo de TCA									
MUJERES	8	4	1	1	1	1	1	1	
VARONES	13	5	3	3	3	3	3	3	
13 años en riesgo de TCA									
MUJERES	48	11	2	1	1	8	18	12	
VARONES	44	13	3	3	1	1	18	14	
15 años en riesgo de TCA									
MUJERES	138	46	15	8	7	7	27	24	
VARONES	123	34	7	7	5	3	36	30	
15 años en riesgo de TCA									
MUJERES	30	9	3	3	3	3	8	5	
VARONES	31	3	0	0	0	0	12	10	
TOTAL	65	112	32	26	21	18	89	113	

Description: -

Psychiatric epidemiology -- Mexico.estudio epidemiológico sobre los psicotrastornos en Querétaro

-estudio epidemiológico sobre los psicotrastornos en Querétaro

Notes: Includes bibliographical references (p. 59-61).

This edition was published in 1992



Filesize: 54.26 MB

Tags: #Querétaro #pasó #a #semáforo #verde #epidemiológico #de #riesgo #Covid

SciELO

In International Journal of Eating Disorders, 23: 371-382. Los cuadros clínicos más comunes en población general española son los trastornos de la conducta alimentaria no especificados TCANE. En Guanajuato se notificaron 44 casos 4,2% del total en ocho municipios; el municipio con mayor número de casos fue San Luis de la Paz con 13.

Trastornos de la conducta alimentaria en España: Revisión de estudios epidemiológicos

En este segundo caso, por ejemplo, se suele entrevistar a una muestra representativa de los pacientes que acuden a un centro. Journal of Adolescent Health, 24, 215-219. Lee DN, Papes M, Van Den Bussche RA.

Trastornos de la conducta alimentaria en España: Revisión de estudios epidemiológicos

· La EVC es considerada como urgencia médica La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro presentó, mediante conferencia de prensa, los resultados de la campaña QUIERE Querétaro Unido contra el Infarto Cerebral , la cual inició en marzo y concluye hoy con la celebración del Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral EVC , fecha conmemorada cada 29 de octubre. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, 2015 Drets: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Llengua: Castellà Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; Versió publicada Matèria: ; ; ; ; ; ; ISBN: 9788449053108 Adreça alternativa: ..

Querétaro, pionero en intervención oportuna de Infarto Cerebral

Aunque las enfermedades que pueda presentar la madre después del tercer mes de embarazo no influyan en la aparición del padecimiento, si condicionarán el desarrollo del niño.

Related Books

- [Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler - von der Antike bis zur Gegenwart : begründet von Ulrich](#)
- [The 2007 Import and Export Market for Sulfur Excluding Sublimed, Precipitated, and Colloidal Sulfur](#)
- [Cherez Karpaty](#)
- [Mirat ül-über](#)
- [Strafrecht, besonderer Teil](#)