

## 22 线性代数 B2 期末

*NULL*

一. 填空

1.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  的 Jordan 标准型为 \_\_\_\_\_, 最小多项式为 \_\_\_\_\_, 奇异值为 \_\_\_\_\_

解:  $\text{diag}(J_2(1), J_2(1)); (x-1)^2$ ; 略

特征值显然均为 1

且

$$\text{rank}(A - I) = 2 \quad \text{rank}(A - I)^2 = 0$$

那么

$$J = \text{diag}(J_2(1), J_2(1))$$

最小多项式显然为

$$d_A(x) = (x-1)^2$$

又

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_{A^T A}(\lambda) = \lambda^4 - 6\lambda^3 + 11\lambda^2 - 6\lambda + 1$$

给出近似解:

$$\lambda_1 = 0.382 \quad (\text{二重}) \quad \lambda_2 = 2.62 \quad \lambda_3 = \frac{2184}{987}$$

最后别忘记开根号

2.  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$  的正交相似标准型为 \_\_\_\_\_

解:  $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & \sqrt{5} \\ 0 & -\sqrt{5} & -2 \end{pmatrix}$

注意  $A$  不是反对称阵, 但是经检验他是规范阵

$$A^T A = A A^T = 9I$$

那么只要求其特征值即可

有  $\lambda = 3$  或  $-2 \pm \sqrt{5}i$

则正交相似标准型为

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & \sqrt{5} \\ 0 & -\sqrt{5} & -2 \end{pmatrix}$$

3. 酉空间  $\mathbb{C}^3$  中内积为标准内积, 即  $(x, y) = x^*y$ , 对向量组  $\begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  做正交化得

到的一组标准正交基为

$$\text{解: } \frac{\sqrt{3}}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} \quad \frac{\sqrt{6}}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2}i \\ \frac{1}{2}i \end{pmatrix}$$

在西空间中我们一定要注意内积定义, 西空间内积有两种定义方式

(1)  $(u, v) = u^*Gv$  时, 这里  $G$  为复正定阵, 对一组基  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  做 Schmidt 正交化

先有

$$\beta_i = \alpha_i - \frac{(\beta_1, \alpha_i)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \dots - \frac{(\beta_{i-1}, \alpha_i)}{(\beta_{i-1}, \beta_{i-1})}\beta_{i-1}$$

再对  $\beta_n$  做标准化即可

(2)  $(u, v) = uGv^*$  时, 这里  $G$  为复正定阵, 对一组基  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  做 Schmidt 正交化

先有

$$\beta_i = \alpha_i - \frac{(\alpha_i, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \dots - \frac{(\alpha_i, \beta_{i-1})}{(\beta_{i-1}, \beta_{i-1})}\beta_{i-1}$$

**RK:** 这是我们在欧氏空间常常写作的样子, 但是在欧氏空间内积是对称的

再对  $\beta_n$  做标准化即可

**RK:** 或者我们可以边做正交化边标准化, 这里我们拿欧氏空间举例 (酉空间形式是相似的, 不过要注意内积定义), 对一组基  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  做 Schmidt 正交化

$\{\gamma_1, \dots, \gamma_{n-1}\}$  是  $\{\beta_1, \dots, \beta_{n-1}\}$  标准化得到的

则

$$\beta_n = \alpha_n - \sum_{i=1}^{n-1} (\alpha_n, \gamma_i) \gamma_i$$

再对  $\beta_n$  标准化即可

二. 设  $\alpha$  是欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  中的一个单位向量, 记矩阵  $H = I_n - 2\alpha\alpha^T$  定义映射  $\mathcal{H}: x \in \mathbb{R}^n \rightarrow Hx \in \mathbb{R}^n$ , 求证:  $\mathcal{H}$  是 (关于某个  $n-1$  维超平面的) 反射变换

证: 首先求其特征值

由

$$|I_m - AB| = \lambda^{m-n} |I_n - BA|$$

$\mathcal{H}$  的特征多项式为

$$\det((\lambda - 1)I_n + 2\alpha\alpha^T) = (\lambda - 1)^{n-1}(\lambda - 1 + 2) = (\lambda - 1)^{n-1}(\lambda + 1)$$

则其特征值为 1 ( $n-1$  重) 和  $-1$  (一重)

下面再证明  $\mathcal{H}$  是正交变换

$$\begin{aligned} HH^T &= (I_n - 2\alpha\alpha^T)(I_n - 2\alpha\alpha^T) \\ &= I_n - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T \\ &= I_n \end{aligned}$$

又正交阵  $H$  有正交相似标准型, 且其特征值无虚数, 那么它可以相似对角化, 也就是说  $\mathbb{R}^n$  可以分解成  $H$  的特征子空间的直和

注意  $H$  为正交阵, 不同特征值对应的特征向量正交, 我们可以取特征值为 1 的特征子空间一组标准正交基 (不然可以标准正交化), 再取特征值为 -1 的特征子空间的一个单位向量, 把这两个向量组合并, 这样我们就取得了  $\mathbb{R}^n$  一组标准正交基, 也就是说映射  $\mathcal{H}$  把  $\mathbb{R}^n$  中一个方向上的向量变为反向, 其他方向的向量不变, 特征值为 -1 的特征向量就是题目中  $n-1$  维超平面的法向量

三. 给定矩阵  $A \in F^{m \times n}$ ,  $B \in F^{n \times p}$ 。定义线性映射  $\mathcal{A}: x \in F^n \rightarrow Ax \in F^m$  与  $\mathcal{B}: y \in F^p \rightarrow By \in F^n$ 。记  $U = \ker(\mathcal{AB})$ , 求证:  $\text{Im}(\mathcal{B}|_U) \subset \ker(\mathcal{A})$  并由此证明  $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$

证: 考虑限制

$$\mathcal{B}: \ker(\mathcal{AB}) \rightarrow F^n$$

设  $\alpha \in \ker(\mathcal{AB})$ 。则

$$\mathcal{AB}\alpha = 0$$

那么  $\alpha \in \ker(\mathcal{A})$

即

$$\text{Im}(\mathcal{B}|_U) \subset \ker(\mathcal{A})$$

有

$$\dim \ker(\mathcal{A}) \geq \dim \text{Im}(\mathcal{B}|_U)$$

分别考虑以下的维数公式:

对  $\mathcal{A}$  有

$$\dim \ker \mathcal{A} + \dim \text{Im} \mathcal{A} = n$$

对限制  $\mathcal{B}: \ker(\mathcal{AB}) \rightarrow F^n$  有

$$\dim \text{Im}(\mathcal{B})|_{\ker(\mathcal{AB})} = \dim \ker(\mathcal{AB}) - \dim \ker(\mathcal{B})|_{\ker(\mathcal{AB})}$$

对  $\mathcal{AB}$  有

$$\dim \ker(\mathcal{AB}) = p - r(AB)$$

又

$$\ker(\mathcal{B}) \subset \ker(\mathcal{AB}) \quad \ker(\mathcal{B})|_{\ker(\mathcal{AB})} = \ker(\mathcal{B})$$

对  $\mathcal{B}$  有

$$\dim \ker(\mathcal{B}) = p - r(B)$$

逐个代入就有结果

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$$

四. 设  $\mathcal{A}$  是欧氏空间  $V$  上的规范变换,  $W \subset V$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 求证  $W^\perp$  也是  $\mathcal{A}$  的不变子空间  
 证: 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  是  $W$  的一组标准正交基, 将其扩充为  $V$  的一组标准正交基  $M := \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 。  
 由于  $W$  为  $\mathcal{A}$  的不变子空间, 所以

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中  $A_{11} \in \mathbb{R}^{r \times r}, A_{22} \in \mathbb{R}^{(n-r) \times (n-r)}$ 。由于  $\mathcal{A}$  为规范变换, 故  $\mathcal{A}$  在  $M$  下的矩阵为规范矩阵, 从而  $A_{12} = 0$ 。于是

$$\mathcal{A}(\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n) = (\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n) A_{22}$$

因此,  $W^\perp = \langle \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n \rangle$  也是  $\mathcal{A}$  的不变子空间。

**RK:** 这里我们用到了一个引理:

设实分块方阵  $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$  或  $A = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ 。则  $A$  为规范方阵当且仅当  $A_{12} = 0$  (或  $A_{21} = 0$ ) , 且  $A_{11}, A_{22}$  为规范方阵

证: 比较  $A^T A$  与  $AA^T$  两边元素易得

五. 设  $A$  为  $n$  阶实对称半正定方阵, 且  $A$  的对角元全为 0, 求证:  $A = 0$

证: 半正定  $\Rightarrow$  各阶主子式非负

先考虑一个对角元  $a_{ii}$

取二阶主子式, 并考虑对称性

$$\begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} = 0 - a_{ij}^2 \geq 0$$

则

$$a_{ij} = a_{ji} = 0 \quad \forall j \quad \text{成立}$$

又每个对角元均为 0

则

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i, j \quad \text{成立}$$

就有  $A = 0$

六.  $A$  为  $n$  阶复方阵, 记  $Z(A) = \{B \mid AB = BA\}$ , 求证:  $Z(A)$  是复线性空间, 且下列条件等价

(1)  $\dim Z(A) = n$

(2)  $A$  的最小多项式  $d_A(x)$  等于其特征多项式  $\varphi_A(x)$

(3)  $Z(A)$  中任意矩阵  $B$  都可以写成  $A$  的多项式的形式

证: 先证明复线性空间

首先  $0, I \in Z(A)$

又对  $\forall X, Y \in Z(A) \quad \lambda, \mu \in \mathbb{C}$  有

$$A(\lambda X + \mu Y) = \lambda AX + \mu AY = \lambda XA + \mu YA = (\lambda X + \mu Y)A$$

即  $Z(A)$  是复线性空间

这三条等价关系的核心是第二条

先给出要使用的书上有理标准型的定理，证明过程略

定理 4. 4. 4: 设线性变换  $\mathcal{A}: V \rightarrow V$  在基  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  下的矩阵是  $A$ ，并设

$$P(x)(xI_n - A)Q(x) = D(x) := \text{diag}(1, \dots, 1, f_{t+1}, \dots, f_n)$$

其中  $P(x), Q(x)$  是可逆多项式矩阵， $f_i(x)$  是首一多项式。令

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P(x)^{-1}$$

则下列结果成立:

- (1)  $\beta_1 = \dots = \beta_t = \mathbf{0}$ ;
- (2) 对于  $i > t, \beta_i$  的最小多项式是  $f_i(x)$ ;
- (3)  $V$  是循环子空间  $F[x]\beta_i (t+1 \leq i \leq n)$  的直和。

定理 4. 4. 5 (有理标准形): 设  $A$  是域  $F$  上的  $n$  阶方阵，设多项式方阵  $xI_n - A$  的 Smith 标准形为:

$$S(x) = \text{diag}(1, \dots, 1, d_{t+1}(x), \dots, d_n(x))$$

则:

- (1)  $A$  的特征多项式  $\varphi_A(x) = d_{t+1}(x) \cdots d_n(x)$ ，最小多项式  $d_A(x) = d_n(x)$
  - (2) 设  $B_i (i = t+1, \dots, n)$  是不变因子  $d_i(x)$  的友阵，则  $A$  相似于准对角阵  $\text{diag}(B_{t+1}, \dots, B_n)$
- 推论 4. 4. 6: 设  $d_i(x) (i = t+1, \dots, n)$  的初等因子组是  $\{p_{ij}^{e_{ij}}(x) \mid 1 \leq j \leq j_i\}$ ，并设  $B_{ij}$  是  $p_{ij}^{e_{ij}}(x)$  的友阵，则  $A$  相似于以  $B_{ij} (t+1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq j_i)$  为准对角阵块的准对角阵。
- 此条推论同时说明了特征方阵的初等因子与 Jordan 标准型的 Jordan 块是一一对应的
- 先证明 (2)  $\Rightarrow$  (3)

由定理 4. 4. 4 我们得到 (2) 的一个等价条件: 存在一个向量  $\beta$  s.t.

$$V = \mathbb{C}^{n \times 1} = \mathbb{C}[\mathcal{A}]\beta$$

证: 设  $V = \mathbb{C}^{n \times 1}$  和  $\mathcal{A}: X \rightarrow AX, V \rightarrow V$

$A$  的特征方阵  $\lambda I - A$  相抵于 Smith 标准型

$$S(\lambda) = (I(s), d_{s+1}(\lambda), \dots, d_n(\lambda))$$

又  $\varphi_A(x) = d_A(x)$  等价于  $d_{s+1}(\lambda) = \dots = d_n(\lambda) = 1$  即得 (定理 4. 4. 4)

设  $A$  与  $B$  可交换，那么  $V$  上线性变换  $\mathcal{B}: y \rightarrow By$  与  $\mathcal{A}: X \rightarrow AX$  可交换

$$\mathcal{B}\beta \in V = \mathbb{C}[\mathcal{A}]\beta$$

即存在  $g(x)$  s.t.

$$\mathcal{B}\beta = g(\mathcal{A})\beta$$

又  $\forall v \in V$  可以写成  $v = h(\mathcal{A})\beta$ ，其中  $h$  为多项式  
就有

$$\mathcal{B}v = \mathcal{B}h(\mathcal{A})\beta = h(\mathcal{A})\mathcal{B}\beta = h(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\beta = g(\mathcal{A})h(\mathcal{A})\beta = g(\mathcal{A})v$$

也就是

$$\mathcal{B} = g(\mathcal{A})$$

即  $B = g(A)$

(1) 与 (2) 等价的证明

我们不妨直接考虑 Jordan 标准型

引理 1: 与单个 Jordan 块可交换的矩阵  $B$  构成的线性空间维数等于此 Jordan 块的阶数

证:  $N_n = J_n(\lambda) - \lambda I_n$  也与  $B$  可交换, 比较两边元素即可,  $B$  形如

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & b_{12} \\ & & & b_{11} \end{pmatrix}$$

引理 2: 与两个及以上相同特征值 Jordan 块构成的 Jordan 标准型  $J$  可交换的矩阵构成的线性空间维数比  $J$  的阶数大

证: 考虑两个相同特征值 Jordan 块构成的 Jordan 标准型  $J$  即可,  $J - \lambda I_n$  也与  $B$  可交换, 比较两边元素立得

再给出一个 (2) 的等价条件:  $A$  的 Jordan 标准型的每个特征值对应的 Jordan 块都只有一个 (这是推论 4.4.6 的直接结果)

结合上面的引理和等价条件就说明 (1) 与 (2) 等价

**RK:** 事实上, 利用此方法配合中国剩余定理可以得到 (2)  $\Rightarrow$  (3) 的另外一种证法

(3)  $\Rightarrow$  (1)

先由引理二我们知道

$$\dim Z(A) \geq n$$

又特征多项式零化  $A$ , 那么

$$\dim Z(A) \leq n$$

则

$$\dim Z(A) = n$$

至此我们证明了这三个命题是等价的

**RK:** 给出扩充版的等价条件:

$A$  为  $n$  阶复方阵, 记  $Z(A) = \{B \mid AB = BA\}$ , 则  $Z(A)$  是复线性空间, 且下列条件等价

(1)  $\dim Z(A) = n$

(2)  $A$  的最小多项式  $d_A(x)$  等于其特征多项式  $\varphi_A(x)$

(3)  $Z(A)$  中任意矩阵  $B$  都可以写成  $A$  的多项式的形式

(4) 存在一个向量  $\beta$  s.t.  $V = \mathbb{C}^{n \times 1} = \mathbb{C}[A]\beta$

- (5)  $\mathcal{A}$  是循环变换
- (6)  $A$  的特征方阵的行列式因子为  $1, \dots, 1, f(x)$
- (7)  $A$  的特征方阵的不变因子为  $1, \dots, 1, f(x)$
- (8)  $A$  任意一个特征值的特征子空间维数为 1 ( $r(A - \lambda_i I) = n - 1$ )
- (9)  $A$  的特征方阵的初等因子组为  $p_1(x)^{r_1}, \dots, p_k(x)^{r_k}$ , 其中  $p_1(x), \dots, p_k(x)$  为数域  $F$  上互异的首一多项式
- (10)  $A$  的 Jordan 标准型的每个特征值对应的 Jordan 块都只有一个
- (11)  $\mathcal{A}$  在一组基下的矩阵为友阵

其余等价条件均是书上定理的简单推论, 在这里不再证明了