

은둔청소년 판별을 위한 스크리닝 척도 개발*

차주환 이자영[†] 백정원 편여울강 어혜원

한국청소년상담복지개발원 한양사이버대학교 한국청소년상담복지개발원

본 연구는 청소년상담복지기관 상담자가 평정하는 방식으로 은둔 청소년을 효과적으로 판별하는데 필요한 스크리닝 척도를 개발하는데 목적이 있다. 먼저, 기존에 개발된 척도와 관련 문헌을 검토하여 1차 예비문항을 구성하고, 학계 전문가의 자문 및 평정을 통해 최종 예비문항을 선정하였다. 이를 은둔 경험이 있는 청소년과 일반청소년을 대상으로 설문조사한 후, 수집된 자료에 대해 탐색적 요인분석과 확인적 요인분석을 실시하여 요인 구조를 검증하였다. 그 결과 3개의 하위요인(사회단절 및 고립, 회피, 불규칙한 생활방식)이 도출되었으며, 최종적으로 13개의 문항이 확정되었다. 척도의 타당성을 확인하기 위해 은둔경험집단과 일반집단간의 변별타당도를 분석하였으며, 은둔형 외톨이 자가보고척도와 우울척도와의 상관분석을 통해 수렴타당도를 확보하였다. Youden's index를 활용하여 고위험군을 판별하기 위한 절단점을 설정한 결과, 사회단절 및 고립이 11.5점, 회피가 13.5점, 불규칙한 생활방식은 5.5점으로 제시되었다. 본 연구는 3가지 하위요인 모두에서 절단점 이상인 경우를 은둔청소년(고위험)으로 판별하였다. 마지막으로 본 연구는 은둔청소년의 개념과 특성이 불명확한 상황에서 청소년상담복지기관 종사자가 은둔청소년을 판별할 수 있는 스크리닝 척도를 개발하였다는 점에서 의의가 있다.

* 주요어: 은둔청소년, 조기개입, 발굴 및 지원

* 본 논문은 2023년 한국청소년상담복지개발원의 '은둔청소년 발굴 및 지원방안' 연구내용의 일부를 발췌·재구성한 것임

† 교신저자(Corresponding Author): 이자영, 한양사이버대학교 상담심리학과 교수,
(04763) 서울시 성동구 왕십리로 220 한양사이버대학교, Tel: 02-2290-0341, E-Mail: 1170003@hycu.ac.kr

서론

은둔의 사전적 의미는 ‘세상을 등지고 숨는 것’으로 되어 있으나, 현재 은둔하는 청소년에 대한 명확한 개념은 정립되지 않고 있다(김혜원 외, 2022). 그러나 선행연구를 고찰해보면, 은둔청소년은 은둔기간, 은둔상태, 사회적인 접촉범위를 기준으로 개념화하는 특징을 보인다. 여인중(2005)은 ‘친구 없이(혹은 하나) 3개월 이상 집 밖 출입을 하지 않고, 사회적 참여를 하지 않는 사람’으로 정의했다. 윤철경과 서보람(2020)은 6개월을 기준으로 ‘다양한 요인으로 취학, 취업 등의 사회적 참여를 회피하고 6개월 이상 타인과의 교류를 단절한 사람’, ‘6개월 이상 집에서 나가지 않고 가족 이외에는(심지어 가족과도) 친밀한 관계를 맺지 못하는 사람’으로 정의했다. 김기현, 이윤주, 유설희, 배진우(2017)는 ‘최소한의 사회적 접촉 없이 3개월 이상 집안에 머물러 있고, 진학이나 취업 등의 사회참여 활동을 할 수 없거나 하지 않고 있으며, 친구가 하나밖에 없거나 혹은 한 명도 없고, 자신의 은둔 상태에 대한 불안감이나 초조감을 느끼는 청소년’으로 정의하였다.

김혜원 등(2022)은 기존의 선행연구를 종합하여 일정기간(3개월 혹은 6개월 이상) 동안, 대부분 자신의 방이나 집안에만 머무르며, 간헐적이고 일시적인 외출은 하더라도 가족 외 대인 관계를 하지 않으며, 지적장애나 정신질환으로 인해 은둔하는 경우는 포함하지 않는다고 정의하였다. 그런데 Wong 등(2015)에 따르면 6개월 이상, 6개월 미만 은둔한 경우를 비교했을 때 그들의 삶에 미치는 부정적 영향에서는 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 이러한 연구결과를 바탕으로 본 연구에서는 은둔청소년의 정의를 내릴 때, 이들의 발굴 및 예방적 개입을 위해 ‘지적장애나 정신질환으로 인해 은둔하는 경우는 제외하고 은둔기간이 최소 3개월 이상이며, 대부분 자신의 방이나 집 안에만 머무르고, 학업이나 취업활동을 하지 않고 가족 이외의 사회적 접촉이 거의 없는 9세에서 24세 연령의 청소년’으로 정의하였다.

그런데 은둔청소년에 대한 사회적 관심이 나타난 2005년 이후 20여년 가까운 시간이 지난 현재, 국내에 이들의 현황을 살펴볼 만한 공식적인 통계는 부재하다. 다만 OECD 기준 우리나라의 15~29세 청소년의 니트 비중(18.9%)이 다른 국가의 평균(13.9%)보다 높은 것으로 나타났다(김기현 외, 2018), 15~29세의 사회적 고립청년 비율은 2.7%로 약 29만명을 추정하고 있다(김기현 외, 2020). 또한 18~24세의 은둔청소년 발생률은 1.97%(윤철경 외, 2022)로 보고하였다. 이러한 결과를 종합하여 청소년기본법에 적용되는 만 9세에서 24세의 청소년을 추정하면, 2021년 기준 전체 838만 3000여 명(여성가족부, 2022) 중 은둔청소년은 단순 대입하면 10만 여명 정도로 예측할 수 있다.

많은 선행연구에서는 은둔의 시작시기를 청소년기로 보고하고 있다(김신아, 2019; 김효순, 김서연, 박희서, 2016; 양미진 외, 2007; 오상빈, 2020; 이지민, 김영근, 2021). 일본 내각부에서 발간한 ‘청년 생활 조사보고서’에서도 은둔의 발생 시기는 24세 이하가 77.5%로 가장 많았고

(복지타임즈, 2020), 은둔 유경험자 중에서 약 40%가 청소년기에 은둔생활을 시작한 것으로 나타났다(광주광역시, 2020, 재인용). 청소년기는 아동기에서 성인기 사이의 과도기로서 이전보다 급격한 인지·정서·행동 발달이 일어나며, 사회구성원으로 성장하기 위한 준비과정이 필요하다(장휘숙, 2004). 그러나 은둔청소년은 일정기간(3~6개월 이상) 자신만의 한정된 공간에서 외부와 단절된 상태로 활동하며 식사나 수면패턴의 불규칙함, 인터넷이나 스마트폰 몰입, 개인의 외모 및 위생을 돌보지 않는 등의 특징을 가진다(김혜원, 2020). 특히 우울, 불안, 회피, 자살충동, 낮은 자존감 등의 정서 상태와 자신을 이상하게 볼 것이라는 피해의식, 자신의 상황·고통을 아무도 이해하지 못할 것이라는 외로움, 스스로에 대한 열등감과 좌절감, 무망감 등의 빠져 있다(김혜원 외, 2022). 이러한 은둔청소년의 특성은 사회적 관계 형성을 어렵게 하여 사회기술의 발달을 저해하고, 집안에 칩거하는 방식으로 스트레스를 피하고 안정감을 얻게 되는데(고스게 유코, 2012), 이로 인해 문제해결 방법을 터득하지 못한 채 성장할 가능성이 높아진다. 따라서 청소년기의 은둔과 고립경험은 개인의 건강한 발달을 저해할 수 있을 뿐만 아니라, 사회 전체의 건강성과 행복에 심각한 영향을 주게 되기 때문에 청소년 시기의 조기 발굴은 매우 필요하다.

한편, 은둔하는 청소년은 사회적 관계를 회피하는 특성을 보여 실제 상담센터에 자발적으로 방문해 심리적 어려움을 호소하거나 상담을 진행하는 경우는 드물다. 간혹 보호자의 요청으로 상담자가 청소년 가정에 방문하여 개입을 진행하는 경우도 있지만, 이때 은둔하는 청소년은 자기보고식 심리검사를 거부할 가능성이 높아 상담자가 은둔수준을 파악하고 선별하는데에는 어려움이 있다. 이러한 점에서 상담자가 은둔하는 청소년과 면담과정에서 나타난 특성을 문항에 체크하는 방식으로 은둔을 판별할 수 있는 척도는 매우 필요하다. 그러나 우리나라 청소년 상담자가 은둔청소년을 판별하기 위해 사용가능한 스크리닝 척도는 부재한 실정이다. 이에 본 연구에서는 청소년상담복지기관 상담자가 평정하는 방식의 은둔청소년 스크리닝 척도를 개발하고자 한다.

현재 국내에서 활용되고 있는 은둔청소년 선별척도는 부모 또는 청소년 당사자가 보고하는 방식의 척도뿐이다. 구체적으로 살펴보면, 개정판 아동용 사회불안척도와 아동용 우울척도의 공존타당도를 통해 개발한 부모 작성 자녀 은둔평가 척도(백형태, 김봉년, 신민섭, 안동현, 이영식, 2011), 은둔형 외톨이 자가보고 척도(25-item Hikikomori Questionnaire, 이하 HQ-25; 제세령, 최태영, 원근희, 봉수현, 2022), 은둔형 부적응 청소년 체크리스트(양미진 외, 2007)가 있다. 먼저 부모 작성용 은둔형 외톨이 선별 도구는 전문가 5명이 문헌 검토를 통해 예비 문항을 만든 후 은둔형 외톨이로 추정되는 부모 즉 정신분열증 등의 정신병적 장애 또는 중등도 이상의 정신신체가 아니면서 3개월 이상 사회적 접촉이나 활동을 하지 않는 청소년(8-25세)의 부모 42명과 일반인 239명을 대상으로 설문조사하고 이를 요인 분석하여 개발하였다. 그 결과 이 척도는 4개 요인 즉 회피(avoidance)요인, 단절(withdrawal)요인, 고립

(isolation)요인, 무관심(indifference)요인으로 구성되었으며, 4개요인 34문항이 추출되었다. 그러나 이 척도는 부모용으로 만들어졌기 때문에 접근성이 높은 부모를 통해 발굴할 수 있다는 장점은 있으나 부모의 주관적 편향이 개입될 여지가 있어 상담자가 은둔청소년의 특성을 정확하게 파악하지 못하는 한계가 있다.

다음으로 Teo 등(2018)이 개발한 은둔형 외톨이 자기보고식 척도(HQ-25)가 있다. 이 척도는 사회화, 고립 그리고 심리적 지지라고 하는 3개의 하위 요인으로 구성되어 있다. 문항은 총 25개 문항으로 사회화(socialization)는 10문항, 고립(isolation)은 9문항 그리고 정서적 지지(emotional support)는 6문항으로 구성되어 있다. 이 척도의 절단점(cut-off)은 42점인 것으로 나타났다. 제세령 등(2022)은 이 척도를 우리나라에 그대로 사용해도 되는지 검증하기 위해 만 13세 이상의 청소년 및 성인 143명(은둔형 외톨이 45명, 대조군 98명)을 대상으로 타당화 하였다. 그 결과 타당한 척도로 증명되었으며, 이를 한국어판 은둔형 외톨이 자기보고 척도로 명명하였다. 그러나 이 척도는 청소년뿐만 아니라 성인까지 사용가능하여 청소년의 특수한 상황과 고유한 특성이 문항에 반영되지 못했다는 한계가 있다.

또한, 양미진 등(2007)이 개발한 은둔형 부적응 청소년 사회성 척도가 있다. 이 척도는 문헌조사, 면접조사 등을 통해 예비 문항을 개발하고, 재학생과 은둔형 부적응 청소년 1,072명을 대상으로 문항 개발 및 타당도 검증을 하였다. 그 결과 은둔형 부적응 청소년 사회성 척도는 5요인(불안, 사회적 기술, 사회적 철회, 대인예민성, 공격성) 33문항으로 구성된 것으로 나타났다. 그 외에 이시형 등(2000)이 개발한 은둔형 외톨이 경향 척도는 소외와 외로움, 사회적 유능감, 친구들과의 상호교류 세 요인으로 구성되었으며, 총 문항 수는 16문항이었다. Sakai 등(2004)이 개발한 HBCL 척도도 있다. 이 척도는 이윤지 등(2015)에 의해 번역 되었으며, 공격적 행동, 대인 불안, 강박 행동, 가족 회피 행동, 우울, 일상생활 활동의 결여, 이해할 수 없는 부적절한 행동, 사회 불참가, 활동성의 저하, 불규칙적인 생활 패턴으로 구성되었다. 그러나 이 척도는 청소년의 자기보고식 척도로 청소년상담자가 은둔청소년을 판별할 수 있는 척도는 아니었다.

앞서 설명한 기존의 척도의 한계를 극복하기 위해 본 연구에서는 은둔 청소년의 조기 발굴에 초점을 두고 판별 결과에 따라 차별적인 지원이 가능하도록 청소년상담복지 현장에서 사용가능한 스크리닝 척도를 개발하고자 한다. 구체적으로 은둔 청소년 관련 선행연구를 통해 예비문항을 추출하고, 예비조사와 본조사로 나누어 척도개발을 진행하였다.

본 연구의 연구문제는 다음과 같다.

첫째, 상담자용 은둔청소년 스크리닝 척도의 구성요인은 어떠한가? 둘째, 상담자용 은둔청소년 스크리닝 척도의 신뢰도는 어떠한가? 셋째, 상담자용 은둔청소년 스크리닝 척도의 타당도(수렴타당도와 변별타당도)는 어떠한가? 이다. 이를 통해 청소년 상담자가 은둔청소년의 조기발굴과 빠른 개입의 가능성을 높일 수 있을 것이다.

척도 개발

청소년 상담자 평정 은둔청소년 스크리닝 척도의 문항을 개발하기 위해 선행연구를 바탕으로 예비문항을 구성한 후 탐색적 요인분석을 실시하였다.

방 법

예비문항구성

청소년 상담자 평정 은둔청소년 스크리닝 척도의 문항을 개발하기 위해 기존에 개발된 은둔청소년을 선별 및 평가하는 척도를 분석하였다. 즉 부모 작성용 은둔형 외톨이 선별도구(백형태 외, 2011), 은둔형 외톨이 자기보고식 척도(HQ-25)(Teo et al., 2018), 은둔형부적응청소년 사회성척도(양미진 외, 2017), 은둔형 외톨이 경향 척도(이시형 외, 2000), 은둔형 외톨이 간단체크리스트(김혜원 외, 2002) 그리고 HBCL 척도(Sakai et al., 2004)의 구성요인을 분석하였다. 그 결과 대부분의 척도에서 은둔청소년의 일반적인 특성인 고립/단절, 회피/사회화, 불규칙한 생활/일상적인 활동의 결여 등이 공통요인으로 나타났으며, 정신건강과 관련 요인으로 불안, 우울, 공격성 등이 있었다. 또한 은둔청소년의 보호요인으로 볼 수 있는 정서적지지도 포함되었다. 이에 근거하여 은둔청소년의 공통특성 영역에서 사회단절/고립(8문항), 회피(6문항), 불규칙한 생활방식(6문항)을 요인으로 추출하였고, 정신건강 영역에서 우울/불안(9문항), 공격행동(6문항), 강박 및 중독행동(3문항)을 요인으로 추출하였다. 마지막으로 사회·정서적지지 영역에서 부모지지(4문항)를 요인으로 추출하였다. 이와 같이 7개의 요인과 42개의 예비문항을 추출하였다.

이후 42개의 예비문항에 대해 은둔청소년 연구경험이 있는 학계 전문가 2인의 자문과 평정을 실시하였다. 전문가 자문을 통해 5개요인 중 정신건강 요인과 사회·정서적지지 요인은 은둔 상태 자체를 측정한다고 보기는 어렵기 때문에 삭제하였으며, 전문가 평정에서 5점 만점 중 4.5이하로 점수를 받은 3문항과 의미가 중첩되는 2문항을 제외하였다. 그 결과 남은 문항은 총 15문항이었다. 구체적으로 살펴보면, ‘사회적으로 철수하여 혼자 고립되어 있는 상태’를 묻는 5문항(예, 학교나 직장(알바)에 가지 않는다. 자기 방에서 나오지 않는다, 친구들과 어울리기보다는 혼자서 인터넷(유튜브)이나 게임에 몰두한다 등), ‘사람들과의 관계를 회피하는 경향’을 묻는 5문항(예, 남들이 자신을 나쁘게 평가할까봐 걱정한다, 누군가와 연락(통화, 문자 등)을 하는 일이 별로 없다, 가능한 사람들과 멀리 떨어져 있고 싶어한다 등), ‘일상생활에서 불규칙하게 생활하는 것과 관련된 내용’의 5문항(예, 방을 정리하지 않아 지저분하다, 일상생활이 불규칙하다, 밤과 낮이 바뀐 생활을 한다)으로 구성되어 있다.

연구대상

예비 문항 개발을 위한 조사는 2023년 7월에 이루어졌으며 전국 13세 이상 24세 이하의 청소년을 대상으로 온라인 설문조사를 실시하였다. 누락이나 오기입 등 불성실한 응답을 제외한 최종 참가자는 165명이었다. 참가자의 성별은 남성이 78명(47.3%), 여성이 87명(52.7%)이었으며, 학교에 재학 중인 119명(72.1%), 비재학중인 청소년이 46명(27.9%)이었다. 17세 19명(11.5%), 18세 28명(17.0%), 19세 34명(20.6%), 20세 32명(19.4%), 21세 21명(12.7%)이 주를 이루었으며, 이들의 평균 나이는 19.11세였다. 현재 은둔 상태인 청소년이 16명(9.7%), 현재 은둔이 아닌 청소년이 149명(90.3%)으로 나타났다.

연구절차

현장 전문가가 은둔청소년을 관찰해서 은둔청소년인지를 판별하기 위한 현장 전문가용 은둔청소년 스크리닝 척도를 개발하기 위해 우선 선행연구 및 문헌 검토와 기존에 개발된 척도를 분석하여 은둔청소년 스크리닝 척도의 요인을 추출하고, 1차 예비문항을 구성하였다. 그리고 최종 예비문항은 학계 전문가의 자문 및 평정을 통해 추출되었다. 마지막으로 은둔(유경험) 청소년 및 일반 청소년을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문지는 청소년들이 자주 방문하는 웹사이트 게시판에 설문 링크를 게시하여 시행되었다. 앞서 연구의 목적과 방법, 익명성 보장에 대해 상세히 안내하였고, 수집된 자료는 연구 목적 외에는 사용하지 않으며, 보관기간인 5년이 지나면 폐기될 것임을 안내하였다. 이를 확인한 후 자발적으로 설문에 참가하도록 하였으며, 중간에 설문을 그만두고 싶을 경우에는 불이익 없음을 명시하였다. 설문에 소요된 시간은 약 5분이었으며, 참여자들에게는 5천원 상당의 기프티콘이 제공되었다. 또한, 더 많은 은둔 청소년이 설문에 참여할 수 있도록 청소년상담복지센터에 홍보를 요청하였으며, 설문 절차는 일반청소년과 동일하게 진행되었다.

자료분석

본 연구에서는 은둔청소년 스크리닝 예비척도의 15문항에 대한 요인구조를 확인하기 위해 탐색적 요인분석 시행 전 왜도와 첨도를 분석하여 다변량 정규성 검증을 실시하였다. 또한 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)와 Barlett 구형성 지표(Barlett's Test of Sphericity) 검증을 통해 자료가 요인분석을 하기에 적합한지를 확인하였으며, 그 결과 으며, 마지막으로 주축요인분석과 프로맥스(Promax Rotation) 회전 방법을 통해 탐색적 요인분석을 실시하였으며, 분석에는 SPSS 22.0을 사용하였다.

탐색적 요인분석

은둔청소년 스크리닝 척도의 문항개발을 위해 은둔 경험이 있는 청소년 및 일반 청소년 대상의 설문조사를 실시한 후 탐색적 요인 분석을 실시하였다. 이를 위해 15개의 예비문항의 정규성을 검증하기 위해 왜도와 첨도를 분석한 결과, 왜도의 절대값은 .156과 1.117 사이에 분포하였으며, 첨도의 절대값은 .193과 1.092 사이에 분포하였다. 따라서 왜도의 절대값은 3 이하, 첨도의 절대값은 8 이하라는 정규성 가정에 충족되는 것으로 나타났다(Kline, 2011). 다음으로 본 자료가 요인분석을 하기에 적합한 자료인지를 확인하기 위해 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)와 Barlett 구형성 지표(Barlett's Test of Sphericity)를 검증한 결과, KMO는 .907, Barlett 구형성 지표는 $\chi^2(78)=1459.739$ ($p<.001$)로 요인분석을 하기에 적합한 자료인 것으로 확인되었다. 그러나 다변량 정규성 검증 결과, 다변량 정규성 가정을 충족하지 못한 것으로 나타났다. 이에 따라, 편향된 결과를 초래할 수 있는 최대우도법의 사용을 지양하고, De Winter와 Dodou(2012)가 제안한 방법을 참고하여 주축요인분석(Principal Axis Factoring, PAF)과 프로맥스(Promax) 회전을 활용하여 탐색적 요인분석을 수행하였다. 그 후 탐색적 요인 분석을 실시하여 고유값(eigen value)과 스크리도표를 살펴본 결과, 고유값이 1.0 이상인 요인은 총 3개인 것으로 나타났다. 또한, 요인부하량이 .40보다 낮거나 다른 요인과 .20 이상 중복되는 2개의 문항 즉 '옷을 갈아입지 않는다' 문항과 '개인위생(두발 및 손발톱 정리, 양치 등)을 신경쓰지 않는다'는 문항은 변별력과 타당성이 저하시키기 때문에 삭제하였다(Black, Babin, & Anderson, 2010). 그 결과 최종적으로 13개의 문항이 남았으며, 그 결과는 표 1에 제시하였다.

각 요인을 살펴보면, 요인 1은 5문항으로 사회적으로 철수하여 혼자 고립된 상태와 관련된 내용이 주를 이루고 있어 '사회단절 및 고립'으로 명명하였으며, 설명 변량은 전체의 54.49%였다. 요인 2는 5문항으로 사람들과의 관계를 회피하는 내용이 주를 이루고 있어 '회피'라고 명명하였다. 설명변량은 전체의 8.125%였다. 요인 3은 3문항으로 정리를 안 하고 불규칙하게 생활하는 것과 관련된 내용이 주를 이루고 있어 '불규칙한 생활방식'으로 명명하였다. 설명변량은 전체의 7.74%다. 탐색적 요인분석에 이어 신뢰도를 분석한 결과, 전체 문항의 내적 합치도는 .928이었으며, 요인 1은 .882, 요인 2는 .867, 요인 3은 .809로 모두 높은 신뢰도를 나타냈다.

<표 1> 은둔청소년 스크리닝 척도 문항의 탐색적 요인분석 결과

		요인적재값			
해당요인	번호	문항	요인 1	요인 2	요인 3
사회단절/ 고립	1	학교나 직장(알바)에 가지 않는다	.970	-.158	-.193
	2	사람들과 거의 교류하지 않는다	.807	.196	-.064
	3	친구들과 어울리기보다는 혼자서 인터넷(유튜브)이나 게임에 몰두한다	.797	.219	-.069
	4	자기 방에서 나오지 않는다	.785	-.185	.177
	5	가족이 없을 때(혹은 잘 때)만 움직인다	.691	-.026	.244
회피	6	남들이 자신을 나쁘게 평가할까봐 걱정한다	-.299	1.059	-.124
	7	하루 종일 거의 집에서 보낸다	.176	.690	.024
	8	누군가와 연락(통화, 문자 등)을 하는 일이 별로 없다	.244	.623	.004
	9	친구가 거의 없다	.156	.582	.132
	10	가능한 사람들과 멀리 떨어져 있고 싶어한다	.093	.574	.273
불규칙한 생활방식	11	방을 정리하지 않아 지저분하다	-.243	.092	.923
	12	일상생활이 불규칙하다	.076	-.081	.863
	13	밤과 낮이 바뀐 생활을 한다	.077	-.076	.833
설명변량 (%)			54.499	8.125	7.774
고유치			7.085	1.068	1.011
신뢰도			.892	.867	.809

척도 타당화

탐색적 요인 분석을 통해 선정된 문항을 대상으로 확인적 요인분석(CFA)을 실시하였고, 이어서 변별타당도와 수렴타당도를 검증하였다. 또한, 은둔청소년 판별을 위한 절단점(cut-off score)을 설정하여, 척도의 실질적인 활용 가능성을 평가하였다.

연구대상

설문조사는 2023년 8월에 이루어졌으며 1차 조사에서와 마찬가지로 전국의 13세 이상 24세 이하 청소년을 대상으로 온라인을 통해 실시하였다. 참여자의 성별은 여자 청소년이 99명(44.5%), 남자청소년 123명(55.4%)이었다. 연구 참여자의 평균 나이는 19.02세였으며, 17세 19명(12.7%), 18세 23명(15.3%), 19세 18명(18.0%), 20세 30명(20.0%), 21세 20명(13.3%)이 주를 이루었다. 이들 중 145명의 청소년이 학교에 재학중이었고, 77명(34.7%)이 학교를 다니지 않는 것으로 나타났다. 또한 47명(21.2%)가 현재 은둔 상태인 것으로 나타났으며, 175명(78.8%)이 은둔하지 않은 상태로 나타났다.

연구절차

척도 개발을 위해 실시한 설문 조사와 동일한 방식으로 진행되었다. 연구 대상만 다르게 진행되었을 뿐 같은 사이트에 연구 윤리 사항을 동일하게 공지한 후 동일한 방식으로 공지하였다. 설문에 소요된 시간은 약 10분이었으며, 참여자들에게 5천원 상당의 기프티콘을 제공하였다.

측정도구

은둔청소년 스크리닝 예비척도

본 연구에서는 은둔청소년 스크리닝 척도를 개발하기 위해 최종 13문항으로 구성된 예비척도를 사용하였다. 이 척도는 ‘사회적으로 철수하여 혼자 고립되어 있는 상태’를 묻는 5문항, ‘사람들과의 관계를 회피하는 경향’을 묻는 5문항, ‘일상생활에서 불규칙하게 생활하는 것과 관련된 내용’의 3문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 5점 척도(0 = 해당되지 않는다, 1 = 별로 해당되지 않는다, 2 = 어느 쪽도 아니다, 3 = 조금 해당된다, 4 = 해당된다)로 응답하게 되어 있으며 점수가 높을수록 은둔의 정도가 심각하다는 것을 의미한다. 본 연구에서 나타난 신뢰도 계수(Cronbach's Alpha)는 .946이었다.

은둔형 외톨이 자가보고 척도

본 연구에서는 Teo 등(2018)이 개발하고 제세령 등(2022)이 타당화한 은둔형 외톨이 자가보고 척도를 사용하였다. 이 척도는 총 29개 문항으로 은둔형 정도를 측정하는 본 문항 25개와 동기를 측정하는 추가 문항 4개로 구성되어 있다. 본 문항은 다시 3개의 하위요인으로 구성되어 있는데, 사회화 10문항, 고립 9문항 그리고 정서적 지지 6문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 5점 척도(0 = 해당되지 않는다, 4 = 해당된다)로 응답하게 되어 있으며 본 문항은 점수가 높을수록 은둔형 외톨이 정도가 심각하다는 것을 의미하며 동기는 높을수록 삶에 대한 동기가 높은 것을 의미한다. 제세령 등(2022)의 연구에서 나타난 신뢰도 계수(Cronbach's Alpha)는 .938이었으며, 본 연구에서의 신뢰도 계수(Cronbach's Alpha)는 .783이었다.

우울 척도

본 연구에서는 청소년 우울을 측정하기 위해 김광일, 김재환, 원호택(1984)가 개발한 간이정신진단검사 13문항 중 한국청소년패널조사에서 설문으로 사용한 10문항을 사용하였다. 각 문항은 4점 척도(1 = 전혀 그렇지 않다, 4 = 매우 그렇다)로 응답하게 되어 있으며 본 문항은 점수가 높을수록 청소년의 우울이 심각하다는 것을 의미한다. 김현정(2015)의 연구에서 나타난 신뢰도 계수(Cronbach's Alpha)는 .910이었으며, 본 연구에서의 신뢰도 계수(Cronbach's Alpha)는 .808이었다.

자료분석

확인적 요인분석을 위해 mplus 8.4를 사용하였으며, 모형 적합도를 검증하기 위해 상대적으로 표본 크기에 민감하지 않을 뿐 아니라 설명력과 간명성을 함께 고려할 수 있는 CFI(Comparative Fit Index), TLI(Tucker-Lewis Index), RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation)를 사용하였다(Schumacker & Lomax, 2004). 또한, 은둔청소년 스크리닝 척도의 변별타당도와 수렴타당도를 확인하기 위해 일원변량분석과 상관분석을 실시하였으며, 진단 유용성을 평가하기 위해 ROC 곡선(Receiver Operating Characteristic Curve)을 사용하였다.

결 과

확인적 요인분석

은둔청소년 스크리닝 척도에 대한 타당도 분석을 실시하였다. 이를 위하여 확인적 요인분석을 실시하였고, 타당도 검증을 위하여 변별타당도와 수렴타당도를 확인하였다. 그리고 ROC 척도를 통해 은둔청소년 스크리닝 척도의 진단 유용성을 검증하였다.


먼저 탐색적 요인분석을 통해 도출된 3개의 하위요인(13문항)을 바탕으로 확인적 요인분석(CFA)을 하여 3요인 연구 모형의 적합도를 검증하였다. 그 결과 3요인 연구모형은 $CFI=.956$, $TLI=.945$, $RMSEA=.079$ 로 나타났다 <표 2>. CFI와 TLI는 .90 이상, RMSEA는 .05 이하이면 좋은 적합도, RMSEA는 .05와 .08 사이면 수용할만한 적합도로 판단되는 점을 고려할 때(홍세희, 2000), 3요인 연구모형은 양호한 적합도를 보이는 것으로 나타났다. 그러나 은둔청소년을 판별하기 위해 3개의 하위요인으로 구분하여 사용하는 것 보다 1개의 요인 즉 총점을 측정하는 것이 더 적절할 가능성을 배제하기 어려워 본 연구에서는 3요인 연구모형과 1요인 모형을 비교하였다. 그 결과 표 2에서 보는 바와 같이 1요인 모형의 적합도는 $CFI=.796$, $TLI=.755$, $RMSEA=.167$ 로 나타났다. 또한 1요인 구조 모형은 CFI와 TLI가 .90보다 작고 RMSEA도 .167로 .1 이상이었기 때문에 수용 가능한 적합도를 보이지 않았다. 따라서 본 연구에서는 3요인 모형이 적절한 것으로 확인되었으며, 이는 총점으로 은둔의 정도를 측정하는 것보다 하위요인을 구분하여 측정하는 것이 더 적절하다는 것을 의미한다. 그리고 연구 모형을 분석한 결과 그림 1과 같이, 은둔청소년 체크리스트의 하위요인 간에는 모두 통계적으로 유의미한 정적 상관관계가 있는 것으로 나타났으며, 각 문항들의 요인부하량은 모두 .50 이상 (.60 ~ .96)으로 $p<.001$ 수준에서 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다.

<표 2> 확인적 요인분석의 모형 적합도 지수

(N=222)

모형	χ^2	df	RMSEA	CFI	TLI
1요인 모형	466.016***	65	.167	.796	.755
3요인 모형	148.076***	62	.079	.956	.945

*** $p < .001$



[그림 1] 확인적 요인분석 결과

타당도 검증

은둔청소년 스크리닝 척도의 변별타당도를 확인하기 위해 집단을 일반집단과 은둔 의심 집단으로 구분하고 은둔청소년 스크리닝 척도의 집단간 평균 차이를 검증하였다. 이때 은둔 의심 집단은 선행연구와 본 연구에서 설정한 기준에 따라, 스스로 현재 은둔(사회적 교류 단절) 상태에 있으며 그 상태가 3개월 이상 지속된 경우로 규정하였다. 그 결과 표 3에서와 같이 은둔 의심 집단은 일반집단에 비해 은둔청소년 스크리닝 척도의 하위요인 사회단절 및 고립($F=213.167$, $p < .001$), 회피($F=99.262$, $p < .001$), 불규칙한 생활방식($F=57.718$, $p < .001$)에서 모두 통계적으로 유의미하게 높은 것으로 확인되었다.

<표 3> 집단별 은둔청소년 스크리닝 척도 평균과 집단 간 차이검증 결과

(N=222)

	일반집단 (N=175)		은둔의심 집단(N=47)		F값
	평균	표준편차	평균	표준편차	
사회단절 및 고립	5.47	3.93	14.72	3.55	213.167***
회피	8.28	4.89	15.85	2.54	99.262***
불규칙한 생활방식	4.05	3.36	8.00	2.23	57.519***

*** $p < .001$

또한 수렴타당도를 확인하기 위해 은둔형 외톨이 자가보고척도, 우울 척도와 상관관계를 분석한 결과 표 4에서와 같이 은둔청소년 스크리닝 척도의 하위요인은 모두 은둔형 외톨이 자가보고척도(사회 단절 및 고립: $r=.68$, $p<.001$, 회피: $r=.78$, $p<.001$, 불규칙한 생활방식: $r=.64$, $p<.001$)와 우울척도(사회 단절 및 고립: $r=.54$, $p<.001$, 회피: $r=.75$, $p<.001$, 불규칙한 생활방식: $r=.69$, $p<.001$)와 모두 통계적으로 유의미한 정적 상관관계를 보였다. 이는 은둔청소년 체크리스트가 변별타당도와 수렴타당도를 확보하고 있다는 것을 의미한다.

<표 4> 은둔청소년 스크리닝 척도와 수렴타당도 검증 척도 간 상관관계 (N=222)

요인		1	2	3	4
은둔청소년 스크리닝 척도	1. 사회 단절 및 고립	-			
	2. 회피	.73**	-		
	3. 불규칙한 생활방식	.62***	.74***	-	
수렴타당도 척도	4. 은둔형 외톨이 자가 척도	.68***	.78***	.64***	
	5. 우울 척도	.54***	.75**	.69***	.70***


*** $p<.001$

은둔청소년 진단의 절단점

은둔청소년 스크리닝 척도의 진단 유용성을 평가하기 위해 ROC 곡선(Receiver Operating Characteristic Curve)를 통해 은둔청소년 집단과 비은둔청소년 집단을 변별 가능한지를 검증하였다. 그 결과 ROC 곡선으로 산출된 Area Under the Curve(AUC)는 사회단절 및 고립이 .929, 회피가 .888, 불규칙한 생활방식이 .818로 나타났다. AUC가 .80 이상이면 훌륭한 예측력을 가지고 있다고 판단되는 점을 고려할 때(Hosmer & Lemeshow, 2000), 본 척도는 은둔청소년을 적절하게 판별하고 있다고 할 수 있다. 또한 ROC 곡선으로 분석하여 하위요인들의 평균 점수를 근거로 했을 때 준거집단을 변별하는 절단점 추정 지표 중 가장 많이 사용되는 것 중 하나인 Youden's index를 사용하였다(Fluss, Faraggi, & Reiser, 2005). Youden's index는 민감도+특이도-1로 계산되며 Youden's index가 1에 가까울수록 효율적인 진단 기준임을 의미한다. 은둔청소년 스크리닝 척도의 Youden's index를 살펴본 결과 표 5에서 보는 바와 같이 사회단절 및 고립은 11.5점(20점 만점)에서, 회피는 13.5점(20점 만점)에서 불규칙한 생활방식은 5.5점(12점 만점)이 절단점인 것으로 확인되었다.

<표 5> 은둔청소년 스크리닝 척도 하위요인별 절단점, 민감도, 특이도, Youden's J (N=222)

	요 인	절단점	민감도	특이도	Youden's J
은둔청소년 스크리닝 척도	사회 단절 및 고립	11.5	.915	.920	.835
	회피	13.5	.915	.811	.726
	불규칙한 생활방식	5.5	.915	.686	.601



[그림 2] 은둔청소년 스크리닝 척도의 ROC 곡선

이상의 연구결과를 통해 본 연구에서 개발한 은둔청소년 스크리닝 척도는 은둔청소년을 판별하는 데 적절하며, 하위요인인 사회단절 및 고립, 회피, 불규칙한 생활방식 등 모든 영역에서 절단점 이상의 점수를 보인 청소년을 은둔청소년으로 판별할 수 있다.

논 의

본 연구에서는 청소년상담복지기관 상담자가 은둔청소년을 조기에 발견하기 위하여 청소년의 은둔 상태의 위기 정도를 판별하는 스크리닝 척도를 개발하고 타당화함으로써, 향후 은둔형청소년을 발굴하고 개입하는 데 초석을 마련하는 데 목적이 있다. 이를 위해 선행연구와 기존의 척도들을 기반으로 1차 예비문항을 만들었으며, 이후 전문가 자문 및 평정을 바탕으로 2차 문항을 완성하였다. 이렇게 완성된 15개의 문항을 165명에게 설문조사하여 탐색적 요인분석을 실시하였으며, 그 결과 적절하지 않은 2개의 문항을 삭제하고 3개의 요인 13개의 문항으로 구성된 은둔청소년 스크리닝 척도를 개발하였다. 이후 확인적 요인분석을 실시하여 3개 요인이 적절한지 검증하였으며, 타당도 검증을 한 후 ROC 분석을 통해 은둔청소년과 비은둔청소년으로 변별 가능한지 확인하였다. 본 연구의 주요 결과 및 이를 바탕으로 한 의의는 다음과 같다.

첫째, 은둔청소년 스크리닝 척도는 3개요인 13개의 문항으로 구성되어 있으며, 전체 변량의 70.364%를 설명하였다. 구체적으로 살펴보면, 요인 1은 사회적으로 철수해서 혼자 고립된 상태와 관련된 문항으로 ‘사회단절 및 고립’으로 명명하였으며, 요인 2는 대인 관계를 회피하는 내용과 관련된 문항으로 ‘회피’라고 명명하였다. 요인 3은 불규칙하게 생활하는 것과 관련된 문항으로 ‘불규칙한 생활방식’으로 명명하였다. 은둔청소년을 선별하기 위해 개발된 척도와 비교해보면, 사회단절 및 고립은 양미진 등(2007), 백형태 등(2011), 김혜원 등(2022) 그리고 Sakai 등(2004)이 개발한 은둔청소년 선별 척도의 구성요인이었으며, 본 연구에서도 은둔청소년을 스크리닝 할 수 있는 주요 요인인 것으로 확인되었다. 다음으로 회피는 양미진 등(2007)이 개발한 은둔형부적응청소년 사회성척도에서는 구성요인이 아니었으나, 백형태 등(2011), 김혜원 등(2022) 그리고 Sakai 등(2004)이 개발한 척도에서는 모두 구성요인이었다. 마지막으로 불규칙한 생활방식은 김혜원 등(2022)과 Sakai 등(2004)이 개발한 척도에서만 구성요인인 것으로 나타났다. 그러나 본 연구에서 개발한 은둔청소년 스크리닝 척도에는 몇몇 연구자들(김혜원 등, 2022; 양미진 등, 2007; Sakai 등, 2004)이 개발한 기존 은둔 청소년 선별 척도에서 포함되었던 정신건강관련 요인(불안, 공격성, 강박, 중독, 우울, 활동성 저하, 이해할 수 없는 부적절한 행동)이 포함되지 않았다. 이는 은둔청소년 중에는 병리적 문제가 없는 청소년들도 있기에(Tajan, 2015), 은둔청소년들을 면밀하게 스크리닝하기 위해서는 정신건강 관련 요인을 배제할 필요가 있다는 것을 반영한 결과이다. 그 외 백형태 등(2011)의 무관심, 양미진 등(2007)의 대인예민성, 김혜원 등(2022)과 Sakai 등(2004)의 일상적인 활동의 결여는 불안이 포함되지 않았다. 즉, 은둔청소년 스크리닝 척도는 청소년 상담 현장에서 은둔청소년을 신속하게 발굴하기 위해 사회단절 및 고립, 회피, 불규칙한 생활방식이라고 하는 은둔청소년의 핵심 요소에 초점을 맞춘 척도라 할 수 있다.

둘째, 은둔청소년 스크리닝 척도의 타당도를 확보하기 위해 변별타당도와 수렴타당도를 검증하였다. 먼저 변별타당도 확보를 위해 일반집단과 은둔 의심 집단으로 구분한 후 집단 간 평균 차이를 분석한 결과 유의미한 차이를 보였다. 또한 수렴타당도 확보를 위해 은둔청소년 스크리닝 척도와 은둔형 외톨이 자가보고척도(제세령 등, 2022) 그리고 우울 척도(김광일, 김재환, 원호택, 1984)간의 상관관계를 분석한 결과 모두 유의미한 상관이 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 은둔청소년 스크리닝 척도가 변별타당도 및 수렴타당도가 확보되었다는 것을 의미한다.

셋째, ROC 곡선 분석을 통해 은둔청소년 스크리닝 척도가 은둔형 집단과 비은둔형 집단을 효과적으로 변별할 수 있는 지 검증하였다. 그 결과 은둔청소년 스크리닝 척도의 Area under curve(AUC) 값은 세 하위 요인에서(사회단절 및 고립=.929, 회피=.888, 불규칙한 생활방식=.818) 모두 높은 점수를 보였다. 이는 Hosmer와 Lemeshow(2000)가 제시한 기준($AUC \geq .75 \sim .92$)을 충족하며, 은둔형 집단과 비은둔형 집단을 잘 구분하는 것을 의미한다. 또한,

Youden's index를 사용하여 산출한 은둔형 집단과 비은둔형 집단이 구분되는 절단점은 사회적 단절 및 고립 11.5점(20점 만점), 회피 13.5점(20점 만점) 그리고 불규칙한 생활방식 5.5점(12점 만점)인 것으로 나타났다. 이러한 절단점은 은둔청소년을 보다 쉽게 스크리닝하는 데 기여할 것으로 보인다.

이를 바탕으로 본 연구에서 개발된 은둔청소년 판별 척도가 상담 현장에서 효과적으로 사용될 수 있도록 구체적인 활용 방안을 제시하고자 한다. 먼저 상담자는 청소년과의 면담 및 관찰을 통해 척도를 평정해야 하며, 평정 기준은 행동이 나타난 빈도를 기준으로 한다. 즉 상담자는 각 문항의 발생 빈도를 기준으로 0점(해당 없음)부터 4점(해당된다)까지 평정해야 한다. 이후 평정 점수에 따라 위험 수준을 평가하고, 그에 따른 개입 방안을 세워야 한다. 본 척도는 사회적 단절 및 고립, 회피, 불규칙한 생활방식의 세 가지 하위요인으로 구성되어 있으며, 이들 모두에서 절단점을 넘은 경우 고위험군으로 분류한다. 고위험군은 즉각적인 심리적 개입이 필요하며, 추가 검사(예: MMPI2, 위기스크리닝 척도)를 통해 정신건강 상태를 평가할 수 있다. 반면 1개 또는 2개의 하위 요인에서 절단점을 넘은 경우 위험군으로 간주하며 예방적 개입이 요구된다. 즉 정기적인 모니터링과 함께 사회적 기술 훈련 및 생활 패턴 조정을 통해 은둔 상태로 악화되는 것을 예방해야 한다. 이러한 구체적인 활용 방안을 통해 본 척도는 은둔청소년을 조기에 발굴하고 적절한 개입을 제공하는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것이다.

이를 바탕으로 본 연구의 의의를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서 개발한 은둔청소년 스크리닝 척도는 은둔청소년을 조기에 발굴하는 데 유용한 도구로 활용될 수 있다. 은둔청소년은 사회적 접촉이 어려워 조기 발견이 쉽지 않으며, 이로 인해 심리적, 정서적, 행동적 문제가 더욱 악화될 수 있다(양미진 외, 2007). 따라서 이들을 조기에 발굴하는 것이 매우 중요하다. 본 척도는 청소년 스스로 자신의 상태를 점검할 수 있을 뿐만 아니라, 교사, 청소년 동반자, 청소년 상담사 등이 은둔 청소년의 특성을 이해하고 이를 판별하는 데 효과적인 도구로 활용될 수 있을 것이다.

둘째, 본 연구는 정신건강 영역을 배제한 은둔청소년 스크리닝 척도를 개발했다는 점에서 중요한 의의를 지닌다. 많은 은둔청소년이 공격성, 우울 등 정신건강 문제를 동반하고 있어 기존 척도들도 정신건강 요인들을 하위요인으로 포함하고 있다(김혜원 등, 2022; 양미진 등, 2007; Sakai 등, 2004). 그러나 은둔청소년의 정의에서는 정신건강 문제를 포함하지 않고 있으며, 정신건강 문제가 없는 은둔청소년도 존재한다. 이에 선행연구들(김혜원 등, 2012; 사이토 다마키, 2012)은 은둔 상태와 정신건강 문제를 분리해서 보고 있다. 이러한 배경에서 본 연구는 정신건강 문제를 제외하고, 은둔 상태 자체에 집중하여 정신건강 문제가 없는 청소년까지 조기에 발굴할 수 있는 스크리닝 척도를 개발했다는 점에서 의의가 크다. 이를 통해 다양한 유형의 은둔청소년을 더욱 정확하게 판별할 수 있을 것으로 보인다.

마지막으로 본 연구의 의의는 은둔청소년의 주요 특성을 밝혀냈다는 점에 있다. 본 연구는 선행연구와 기존 은둔청소년 판별 척도 그리고 전문가 자문 등을 통해 은둔청소년의 주요 특성이 사회단절 및 고립, 회피, 불규칙한 생활방식이라는 것을 확인하였으며, 이를 은둔청소년 스크리닝 척도의 구성요소로 확정하였다. 은둔청소년의 문제가 심각함에도 불구하고 관련 연구가 부족한 상황에서, 본 연구는 은둔청소년의 주요 특성을 규명함으로써 이들에 대한 이해를 높이는 데 기여했다.

본 연구의 제한점 및 향후 연구에 대한 제언은 다음과 같다. 먼저 본 연구에서 개발된 은둔청소년 스크리닝 척도는 신뢰도와 타당성을 갖춘 것으로 증명되었지만, 실제 현장에서는 적용을 통해 검증하지는 못하였다. 따라서 향후 연구에서는 실제 현장에서 상담자가 본 척도를 통해 평정한 점수와 청소년의 자기보고식 점수 간의 변별력과 상관관계를 확인할 필요가 있다. 이는 본 척도가 실제 현장에서의 유용성과 적용 가능성을 확인하는 데 유용할 것으로 보인다. 또한 본 연구는 성별, 학년, 지역 등 다양한 연구 집단에 대한 차이를 고려하지 않았고, 아직 표준화 과정을 거치지 않았다는 제한점이 있다. 따라서 이 척도가 다른 인구 집단에서도 동일하게 적용될 수 있을지 확인하기 위해서는 추가적인 검토가 필요하다. 향후 연구에서는 다양한 인구 집단을 대상으로 표준화 작업을 수행하여 척도의 신뢰도와 타당성을 강화하고, 절단점의 적합성을 검증함으로써 보다 유용하게 활용할 수 있는 도구로 발전시켜야 할 필요가 있다.

참고문헌

- 광주광역시 (2020). 2020 광주광역시 은둔형 외톨이 실태조사. 광주광역시.
- 고스게 유코 (2012). 은둔형 외톨이 사례연구: 한국과 일본사례를 중심으로. 숭실대학교 대학원 석사학위논문.
- 김광일, 김재환, 원호택 (1984). 간이 정신진단검사 실시요강. 서울: 중앙적성연구소.
- 김기현, 이윤주, 유설희, 배진우 (2017). 청소년 사회경제 실태 및 정책방안 연구. 세종: 한국청소년정책연구원.
- 김기현, 배상률, 성재민 (2018). 청년 핵심정책 대상별 실태 및 지원방안 연구 I: 청년 니트(NEET). 세종: 한국청소년정책연구원.
- 김기현, 유민상, 변금선, 배정희, 권향원, 김창환, 박미선, 성재민, 이철선, 최한수 (2020). 제1차 청년정책 기본계획 수립연구. 세종: 한국청소년정책연구원.
- 김신아 (2019). 은둔형 외톨이 자녀를 둔 부모의 심리적 갈등과 영적 경험에 관한 연구. 고신대학교 대학원 박사학위논문.
- 김현정 (2015). 청소년 우울의 영향요인 연구: 보호요인과 위험요인. 국민대학교 행정대학원 석사학위논문.

- 김혜원 (2020). 은둔형 외톨이 현황과 제도적 지원의 정립. 서울시 은둔형 외톨이 현황과 지원방안 토론회 자료집(2020.8.25.).
- 김혜원 (2022). 은둔형 외톨이 청년의 특성 및 은둔경험 분석. 청소년학연구, 29(10), 1-32.
- 김혜원, 조현주, 김지연, 김연옥, 김지향, 박찬희 (2022). 은둔형 외톨이 상담: 당사자와 부모 상담가이드북. 서울: 학지사
- 김효순, 김서연, 박희서(2016). 은둔형 외톨이 성향 청소년의 온라인 게임 중독과정에서 사회적 지지의 조절효과에 관한 연구. 한국컴퓨터정보학회논문지, 21(6), 149-156.
- 백형태, 김봉년, 신민섭, 안동현, 이영식 (2011). 부모 작성용 은둔형 외톨이 선별 도구 개발. 소아청소년정신의학, 22(4), 262-270.
- 복지타임즈(2020.12.31). 일본, 히키코모리 장기화·고령화로 ‘8050 문제’ 대두.
<https://www.bokjitime.com/news/articleView.html?idxno=30153>
- 사이토 다마키 (2012). 은둔형 외톨이: 그 이해와 치유법(김경한, 김혜경, 공역) 서울: 파워북.
- 양미진, 지승희, 김태성, 이자영, 홍지연 (2007). 은둔형 부적응청소년 사회성척도 개발 연구. 아시아교육연구, 8(2), 119-134.
- 여인중 (2005) 은둔형 외톨이. 서울: 지혜문학.
- 여성가족부 (2022). 청소년백서. 서울: 여성가족부.
- 여성가족부 (2023). 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027). 서울: 여성가족부.
- 오상빈 (2020). 고립 생활하는 사람은 누구인가? : 은둔형 외톨이 치유와 예방. 서울: 솔학.
- 윤철경, 서보람 (2020). 은둔형 외톨이 현황과 제도적 지원의 정립. 서울시 은둔형 외톨이 현황과 지원방안 토론회 자료집(2020.8.25.).
- 윤철경, 박선영, 임말희, 김재희, 문금화, 김연정 (2021). 은둔형 외톨이 청소년 가족 지원을 위한 입법과제. 서울: 국회입법조사처.
- 윤철경, 권세진, 박현정, 서희정, 이정현, 황현 (2022). 2022 고립·은둔 청년 바우처 지원방안 연구. 서울: GL학교밖청소년연구소.
- 이시형, 김은정, 김미영, 김진영, 이규미, 구자경 (2000). 외톨이 청소년의 심리사회적 특성과 부적응. 서울: 삼성생명공익재단 사회정신건강연구소.
- 이윤지, 서민재, 최태영 (2015). 한국 청소년에서 사회적 은둔의 정신병리적 특성. 신경정신의학, 54(4), 549-555.
- 이지민, 김영근 (2021). 은둔형 외톨이 경험이 있는 청소년의 은둔 경험에 관한 현상학적 연구. 한국아동심리치료학회지, 16(2), 61-91.
- 장휘숙 (2004). 청년심리학 제3판. 서울: 박영사.
- 제세령, 최태영, 원근희, 봉수현 (2022). 은둔형 외톨이 자가보고 척도의 신뢰도 및 타당도 연구. Journal of Korean Neuropsychiatric Association, 61(2), 80-89.

- 차주환, 이자영, 편여울강, 백정원, 어혜원 (2023). 은둔청소년 발굴 및 지원방안. 부산: 한국청소년상담복지개발원.
- 홍세희 (2000). 구조방정식 모형의 적합도 지수 선정기준과 그 근거. *한국심리학회지: 임상*, 19(1), 161-177.
- Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis: A global perspective*. Pearson.
- De Winter, J. C. F., & Dodou, D. (2012). Factor recovery by principal axis factoring and maximum likelihood factor analysis as a function of factor pattern and sample size. *Journal of Applied Statistics*, 39(4), 695-710.
- Fluss, R., Faraggi, D., & Reiser, B. (2005). Estimation of the Youden Index and its associated cutoff point. *Biometrical Journal: Journal of Mathematical Methods in Biosciences*, 47(4), 458-472.
- Kato T. A, Kanba S, & Teo A. R. (2019). Hikikomori: multidimensional understanding, assessment, and future international perspectives. *Psychiatry Clinical Neuroscience* 73, 427-440.
- Kline, R. B. (2011). *Principles and practice of structural equation modeling (3. Bask)*. NY: Guilford.
- Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). *Applied Logistic Regression (2nd ed.)*. Wiley.
- Sakai M, Iishikawa S, Sato H, Sakano Y.(2004). Development of hikikomori behavior checklist (HBCL) and examination of its reliability and validity. *Japanese Journal of Counseling Science*. 37, 210-220.
- Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). *A beginner's guide to structural equation modeling*. NY: Psychology Press
- Tajan, N. (2015) Social Withdrawal and Psychiatry: A Comprehensive Review of Hikikomori. *Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence*, 63, 324-331.
- Teo, A. R., Chen, J. I., Kubo, H., Katsuki, R., Sato Kasai, M., Shimokawa, N., ... & Kato, T. A. (2018). Development and validation of the 25 item Hikikomori Questionnaire (HQ 25). *Psychiatry and clinical neurosciences*, 72(10), 780-788.
- Wong, P. W., Li, T. M., Chan, M., Law, Y. W., Chau, M., Cheng, C., Fu, K. W., Bacon-Shone, J., & Yip, P. S. (2015) "The prevalence and correlates of severe social withdrawal (hikikomori) in Hong Kong: A cross-sectional telephone-based survey study", *The International journal of social psychiatry*, 61(4), 330 - 342.

[원고접수일: 2024. 09. 06. / 수정원고접수일: 2024. 10. 23. / 게재결정일: 2024. 10. 30.]

Development and Validation of a Screening Scale for Discrimination of Reclusive Adolescents

Ju-hwan Cha, Ja-young Lee, Jeong-won Baik, Yu-wool-kang Pyun, Hye-won Eo

Korea Youth Counseling & Welfare Institute Hanyang Cyber University

The purpose of this study is to develop a screening scale necessary to effectively identify reclusive adolescents in a way that experts in youth counseling and welfare institutions evaluate.

First, a literature review was conducted to develop a scale for reclusive adolescents, from which the factor structure and preliminary items were derived. Feedback and evaluations from experts in the relevant field were then gathered to refine the preliminary items. Subsequently, a survey encompassing both reclusive adolescents (with relevant experiences) and general adolescents was conducted. The Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis results demonstrated that the scale exhibits appropriate reliability and validity. The final scale consists of three sub-factors (social disconnection and isolation, avoidance, and irregular lifestyle) comprising 13 items. Participants rated these items on a five-point Likert scale (ranging from 0 to 4 for each item). Cut-off scores for identifying reclusive adolescents were set at 11.5 for social disconnection and isolation, 13.5 for avoidance, and 5.5 for irregular lifestyle. An individual exceeding the cut-off scores in all three sub-factors was classified as a reclusive (high-risk) adolescent. Notably, the strength of this study is the development of a screening scale for professionals in adolescent counseling and welfare institutes, despite the current lack of clarity in the literature regarding the concept or characteristics of reclusive adolescents.

Key words: Reclusive Adolescents, Early Intervention, Detection and Support Plan

