



NO LO PROTEJAS A MEDIAS **Broadline®**

Una nueva dimensión en protección, una prescripción más completa



BROADLINE® ES INNOVACIÓN: FORMULACIÓN ÚNICA CON ACCIÓN TÓPICA Y SISTÉMICA PARA GATOS



EPRINOMECTINA + PRAZIQUANTEL


- Absorción transcutánea y distribución plasmática
- Eprinomectina, usada por primera vez en gatos
- No se almacenan: acción de corta duración

• ACTIVIDAD SISTÉMICA



Eprinomectina: nematodos (vermes redondos y vermes ganchudos, vermes cardiopulmonares y vermes vesicales)

Praziquantel: cestodos (vermes planos)

NUEVA
COMBINACIÓN
de 4 principios activos
probados



— FIPRONIL + (S)-METOPRENO
..... EPRINOMECTINA + PRAZIQUANTEL



FIPRONIL + (S)-METOPRENO

- Distribución cutánea mediante translocación
- Se almacenan en los lípidos de la piel y glándulas sebáceas: acción de larga duración

• ACTIVIDAD POR CONTACTO

Fipronil: pulgas y garrapatas

(S)-Metopreno: estadios inmaduros de las pulgas

ES EFICAZ EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE:

BROADLINE® es un endectocida tópico para gatos que elimina

VERMES GASTROINTESTINALES

NEMATODOS

VERMES REDONDOS (ÁSCARIS)¹⁻³

Una aplicación de **BROADLINE®** elimina

<i>Toxocara cati</i>	97-100%
<i>Toxocara cati</i> L3 y L4	100%
<i>Toxascaris leonina</i>	96-98%

VERMES GANCHUDOS (ANCYLOSTOMAS)^{1,4}

<i>Ancylostoma tubaeforme</i>	99-100%
<i>Ancylostoma tubaeforme</i> L4	100%
<i>Ancylostoma braziliense</i>	91-99%

CESTODOS

<i>Dipylidium caninum</i>	98-100%
<i>Taenia taeniaeformis</i>	99-100%
<i>Echinococcus multilocularis</i>	100%

PULGAS

Eficacia duradera
(al menos 5 semanas)
frente a varias cepas
de *C. felis* adultas

Bibliografía: 1. Knaus M et al., Efficacy of a novel topical fipronil, (S)-methoprene, eprinomectin and praziquantel combination against naturally acquired intestinal nematode and cestode infections in cats. (In press in vet parasitol). 2. Knaus M et al., Efficacy of a novel topical combination of fipronil, (S)-methoprene, eprinomectin and praziquantel against adult and larval stages of *Toxocara cati* in cats. (In press in vet parasitol). 3. Knaus M et al., Efficacy of a novel topical combination of fipronil, (S)-methoprene, eprinomectin and praziquantel against induced infections of adult *Toxascaris leonina* in cats. (In press in vet parasitol). 4. Prullage JB et al., Efficacy of a novel topical combination of fipronil, (S)-methoprene, eprinomectin, and praziquantel on induced infections of *ancylostoma* spp. nematodes of cats. (In press in vet parasitol). 5. Knaus M et al., Efficacy of a novel topical combination of fipronil, (S)-methoprene, eprinomectin and praziquantel against feline urinary bladder worm (*Capillaria plica*) infection. (In press in vet parasitol). 6. Baker C et al., Efficacy of a Single Dose of A Novel Topical Eprinomectin Combination Formulation to Prevent Heartworm Disease. (In press in vet parasitol).

PARÁSITOS INTERNOS

VERMES VESICALES⁵



BROADLINE® está indicado para el tratamiento de los vermes vesicales

Capillaria plica

100%

PARÁSITOS EXTERNOS

VERMES CARDIOPULMONARES⁶



Una aplicación mensual de **BROADLINE®** previene la dirofilariosis pulmonar

Larvas de *Dirofilaria immitis*

100%

Elimina los principales vermes del gato, **incluyendo cestodos zoonóticos y las peligrosas fases migratorias no diagnosticables de los nematodos**

FASES INMADURAS DE LAS PULGAS



(huevos, larvas y pupas)

Inhibe la eclosión de huevos
C. felis en el medio ambiente

GARRAPATAS



BROADLINE® es un endectocida tópico para gatos que trata infestaciones por garrapatas

BROADLINE®:

APLICADOR TÓPICO, CÓMODO Y PRECISO

LA INNOVACIÓN MÁS ESPERADA POR VETERINARIOS Y PROPIETARIOS

- Sencilla aplicación sobre la piel del gato
- Sin estrés
- Rápida y precisa
- Sin dolor

GUÍA DE APLICACIÓN



1 Corte el blíster y retire el aplicador.



2 Retire ligeramente el émbolo hacia atrás, quite el tapón.




3 Aparte el pelo del animal en la región entre la nuca y la base del cuello, hasta que aparezca la piel.



4 Coloque la punta del aplicador directamente sobre la piel y apriete despacio hasta vaciar todo su contenido en varios puntos, entre la nuca y la base del cuello, para evitar que el producto se escurra.



5 El gato debe ser observado después de la aplicación hasta que el contenido esté totalmente seco para que no lama el producto.



BROADLINE®:

ES SEGURO Y BIEN TOLERADO EN GATITOS Y GATOS ADULTOS

GATITOS

Broadline® está indicado en gatitos a partir de las 7 semanas de edad o con un peso mayor a 0,6 kg.

GATOS ADULTOS

La seguridad de Broadline® ha sido confirmada después de millones de aplicaciones, en las que raramente se observaron reacciones adversas.

Los 4 principios activos tienen excelentes perfiles de seguridad en las fases de gestación y desarrollo, aunque Broadline® no fue evaluado durante la gestación y lactancia en gatas.



Broadline®

UNA NUEVA DIMENSIÓN EN PROTECCIÓN,
UNA PRESCRIPCIÓN MÁS COMPLETA

NUEVO



PROTOCOLO DE DESPARASITACIÓN

GATITOS (2 MESES - 6 MESES)	Alto riesgo de coinfección por parásitos internos y externos	Los protocolos recomiendan un tratamiento mensual entre los 2 y los 6 meses de edad
GATOS ADULTOS > 6 MESES	Riesgo variable según los hábitos del gato y la situación epidemiológica presente	En función de cada situación, los protocolos recomiendan un tratamiento mensual cuando haya riesgo de reinfestación

Elimina los **vermes gastrointestinales** (cestodos, nematodos y sus fases larvarias migratorias), **los vermes cardiopulmonares** (filariosis) y los **vesicales**

Eficaz en la **prevención y tratamiento** contra garrapatas, pulgas, huevos y larvas

Aplicación tópica, sencilla, cómoda, precisa y sin dolor

Protección frente a parásitos zoonóticos

Sin estrés para los gatos y propietarios

Broadline® es marca registrada de Boehringer Ingelheim S.A.

Registro ICA No. 10334-MV