

# ハーツホーン 2 章の演習問題

2025 年 12 月 4 日 15 時 8 分更新

本文書は、修士課程在学中に取り組んだ Algebraic Geometry (Hartshorne, 1977) の演習問題  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  を復元することと、 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  作成の基礎鍛錬を意図したものです。

## 目 次

4	4 節 .....	1
---	-----------	---



## 4 4 節

**演習 4.2**  $S$  を概型とし、 $S$  上の被約概型  $X$  と  $S$  上の分離的概型  $Y$  を考える。このとき、二つの  $S$  上の射  $f, g: X \rightarrow Y$  が、 $X$  の稠密開集合  $U$  上で等しいとき、 $f = g$  であることを示せ。また次の二つの場合で、この結果が成立しない例を与えよ。

- (a)  $X$  が被約でない。
- (b)  $Y$  が分離的でない。

**証明** まず  $f$  と  $g$  が位相空間の連続写像として等しいことを示す。 $f, g$  が  $S$  上の射であるので、ファイバー積の普遍性から図式

$$(4.1) \quad \begin{array}{ccccc} X & & \xrightarrow{f} & & Y \\ & \searrow f \times g & & \nearrow p_1 & \\ & Y \times_S Y & \xrightarrow{p_1} & Y & \\ & \downarrow p_2 & & \downarrow & \\ & Y & \longrightarrow & S & \end{array} \quad (p_1 \text{ と } p_2 \text{ はファイバー積の射影を表す。})$$

の可換性を満足する射  $f \times g: X \rightarrow Y \times_S Y$  が一意的存在する。 $f$  と  $g$  が  $U$  上で等しいことは、包含  $\iota: U \hookrightarrow X$  に対して  $f \circ \iota = g \circ \iota$  が成立することを意味し、 $\Delta: Y \rightarrow Y \times_S Y$

を対角射とすると、二つの図式

$$\begin{array}{ccc}
 U & \xrightarrow{f \circ \iota} & Y \\
 \downarrow (f \times g) \circ \iota & & \downarrow p_1 \\
 Y \times_S Y & \xrightarrow{p_1} & Y \\
 \downarrow p_2 & & \downarrow \\
 Y & \longrightarrow & S
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 U & \xrightarrow{f \circ \iota} & Y \\
 \downarrow \Delta \circ f \circ \iota & & \downarrow p_1 \\
 Y \times_S Y & \xrightarrow{p_1} & Y \\
 \downarrow p_2 & & \downarrow \\
 Y & \longrightarrow & S
 \end{array}$$

がどちらも可換であるから、ファイバー積の普遍性より

$$(4.2) \quad (f \times g) \circ \iota = \Delta \circ f \circ \iota = \Delta \circ g \circ \iota$$

が成立する。よって集合として、

$$\begin{aligned}
 (f \times g)(X) &= (f \times g)(U^-) && (\because U \text{ が稠密部分集合なので。}) \\
 &= (\Delta \circ f)(U^-) && (\because (4.2) \text{ より。}) \\
 &\subset (\Delta \circ f)(U)^- && (\because \Delta \circ f \text{ の連続性より。}) \\
 &= \Delta(f(U))^- \\
 &\subset \Delta(Y) && (\because Y \text{ が分離的で、} \Delta(Y) \text{ が閉集合であるので。})
 \end{aligned}$$

となる。勝手な点  $P \in X$  に対し、

$$\begin{aligned}
 f(P) &= (p_1 \circ (f \times g))(P) && (\because (4.1) \text{ の可換性より。}) \\
 &= p_1((f \times g)(P)) \\
 &= p_2((f \times g)(P)) && (\because (f \times g)(P) \in \Delta(Y) \text{ なので。}) \\
 &= g(P)
 \end{aligned}$$

と計算でき、 $f$  と  $g$  が位相空間の連続写像として等しいことがわかった。特に  $f_* \mathcal{O}_X = g_* \mathcal{O}_X$  である。

次に構造層の射  $f^\#, g^\#: \mathcal{O}_Y \rightarrow f_* \mathcal{O}_X$  が等しいことを示す。 $X$  の点  $P$  を勝手に固定し、 $f(P)$  のアフィン開近傍  $W$  を取って、 $f^{-1}(W)$  を  $V$  と置き、制限によって得られる連続写像を  $f' = g': V \rightarrow W$  と置く。制限  $f'|_W, g'|_W: \mathcal{O}_W \rightarrow f'_* \mathcal{O}_V$  が等しいことを示す。 $W$  がアフィン概型であるので、演習 2.4 から大域切断の環準同型  $\Gamma(W, f^\#), \Gamma(W, g^\#): \Gamma(W, \mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{O}_X)$  で  $f'|_W$  と  $g'|_W$  が決定されるので、 $\Gamma(W, f^\#) = \Gamma(W, g^\#)$  の成立を示せばよい。元  $a \in \Gamma(W, \mathcal{O}_Y)$  を勝手に取り、 $f^\#(a) - g^\#(a)$  を  $b$  と置き、 $b = 0$  となることを見る。 $U$  が  $X$  の稠密部分集合なので、 $U \cap V \neq \emptyset$  であ

り,  $f|_U = g|_U$  であるので, 勝手な点  $Q \in U \cap V$  に対して  $f_Q^\# = g_Q^\#$  が成立し,

$$b_Q = f_Q^\#(a_{f(Q)}) - g_Q^\#(a_{f(Q)}) = 0$$

であることがわかる。部分集合  $V_b = \{Q \in V : b_Q \notin \mathfrak{m}_Q\}$  は演習 2.16 (a) より開集合で, 上の計算より  $V_b \cap (U \cap V) = \emptyset$  であるのに対し,  $U \cap V$  が  $V$  の稠密部分集合であるから,  $V_b = \emptyset$ , すなわち勝手な点  $Q \in V$  に対して  $b_Q \in \mathfrak{m}_Q$  であることがわかる。ゆえに勝手な点  $Q \in V$  に対して  $b_Q$  が  $\mathcal{O}_{V,Q}$  の幂零元で,  $X$  が被約であるから  $b_Q = 0$  であり,  $b = 0$  がわかった。ゆえに  $f^\#|_W = g^\#|_W$  である。もしアフィン開近傍  $W \subset Y$  が  $f(X) \cap W = \emptyset$  を満足するならば,  $f^\#|_W$  と  $g^\#|_W$  が零環の層への射となるから等しい。以上から,  $Y$  のアフィン開被覆上で  $f^\#$  と  $g^\#$  が等しく,  $f^\# = g^\#$  であることが示された。 証明終

