

# 組み合わせ論的ホッジ理論 雑記帳

2025 年 3 月 19 日 15 時 32 分更新

[AHK18] を読むにあたって証明のギャップを埋めることを目的とした命題などをここに記す。

## 1 バーグマン扇など

**命題 1.1** ([AHK18, Prop 2.4] と [AHK18, Prop 3.3] のために) 扇  $\Sigma$  とその部分集合  $\Delta$  を考える。任意の  $\Delta$  の錐  $\delta$  に対し  $\delta$  の面すべてが  $\Delta$  に属すると仮定する。このとき  $\Delta$  は扇である。

**証明** 勝手な二つの錐  $\delta_1, \delta_2 \in \Delta$  に対し  $\delta_1 \cap \delta_2$  が共通の面であることを示せば良いが、それは  $\Delta \subset \Sigma$  であることと  $\Sigma$  が扇であることから従う。 ■

**命題 1.2** ([AHK18, Prop. 3.3] のために)  $M$  を有限集合  $E$  上のマトロイドとし  $\mathcal{P}$  を  $\mathcal{P}(M)$  の順序フィルターとする。族  $\Sigma_{M, \mathcal{P}}$  は  $\{\sigma_{I < \mathcal{F}} \mid \text{cl}_M(I) \notin \mathcal{P}, \mathcal{F} \subset \mathcal{P}\}$  として与えられるのであった。このとき  $\sigma_{I < \mathcal{F}} \in \Sigma_{M, \mathcal{P}}$  に対してその面もすべて  $\Sigma_{M, \mathcal{P}}$  に属す。

**証明** 一般論から  $\sigma_{I < \mathcal{F}}$  の面は  $I$  の部分集合  $I'$  と  $\mathcal{F}$  の部分集合  $\mathcal{F}'$  を用いて  $\sigma_{I' < \mathcal{F}'}$  と表すことができる。すると  $\text{cl}_M(I') \notin \mathcal{P}$  である。そうでなかったとすると  $I' \subset I$  であることと  $\mathcal{P}$  が順序フィルターであることから  $\text{cl}_M(I) \in \mathcal{P}$  となり矛盾が生じる。ゆえに  $\sigma_{I' < \mathcal{F}'} \in \Sigma_{M, \mathcal{P}}$  であり題意は示された。 ■

**注意 1.3** この証明手法によって  $\tilde{\Sigma}_{M, \mathcal{P}}$  に対しても同様の主張が成立することが従う。

**命題 1.4**  $E$  を有限集合とし  $\mathcal{P}$  を  $\mathcal{P}(E)$  の順序フィルターとする。このとき  $\Sigma_{\mathcal{P}}$  に属する二つの錐  $\sigma_{I_1 < \mathcal{F}_1}$  と  $\sigma_{I_2 < \mathcal{F}_2}$  に対し、 $\sigma_{I_1 < \mathcal{F}_1} \subset \sigma_{I_2 < \mathcal{F}_2}$  となるのは  $I_1 \subset I_2$  かつ  $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$  となるときかつその時に限る。

**証明**  $I_1 \subset I_2$  かつ  $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$  のときに  $\sigma_{I_1 < \mathcal{F}_1} \subset \sigma_{I_2 < \mathcal{F}_2}$  となることは定義から従う。

逆に  $\sigma_{I_1 < \mathcal{F}_1} \subset \sigma_{I_2 < \mathcal{F}_2}$  が成立する時を考える。 $I_1 \not\subset I_2$  であつたとすると元  $i \in I_1 \setminus I_2$  が少なくとも一つ存在し  $\mathbf{e}_i \in \sigma_{\emptyset < \mathcal{F}_2}$  である。ゆえに  $\{i\} \in \mathcal{F}_2$  であり  $I_2 = \emptyset$  である。 $\mathcal{F}_2$  が全順

序部分集合であることから  $I_1 \setminus I_2 = I_1$  は一元集合でなければならない。すちなわち  $\{i\}$  であるがこれは  $I_1 \notin \mathcal{P}$  であることに矛盾し  $I_1 \subset I_2$  であることが従う。次に  $\mathcal{F}_1 \not\subset \mathcal{F}_2$  であったと仮定し  $F \in \mathcal{F}_1 \setminus \mathcal{F}_2$  を一つ取る。 $\mathbf{e}_F \in \sigma_{I_2 < \mathcal{F}_2}$  であるから

$$\mathbf{e}_F = \sum_{i \in I_2} \lambda_i \mathbf{e}_i + \sum_{G \in \mathcal{F}_2} \lambda_G \mathbf{e}_G, \lambda_i, \lambda_G \in \mathbb{R}_{>0}$$

のような一意的な表示が得られるが、 $F$  の取り方からすべての  $G \in \mathcal{F}_2$  に対し  $\lambda_G = 0$  となる。したがって  $F \subset I_2$  であるが  $\mathcal{P}$  が順序フィルターであることから  $I_2 \in \mathcal{P}$  となり矛盾が生じる。ゆえに  $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$  である。 ■

**命題 1.5**  $E$  を有限集合とし  $\mathcal{P}$  を  $\mathcal{P}(E)$  の順序フィルターとする。このとき  $\Sigma_{\mathcal{P}}$  に属する二つの錐  $\sigma_{I_1 < \mathcal{F}_1}$  と  $\sigma_{I_2 < \mathcal{F}_2}$  に対し、 $\sigma_{I_1 < \mathcal{F}_1} \cap \sigma_{I_2 < \mathcal{F}_2} = \sigma_{(I_1 \cap I_2) < (\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2)}$  が成立する。

**証明** 定義から直ちに  $\sigma_{I_1 < \mathcal{F}_1} \cap \sigma_{I_2 < \mathcal{F}_2} \supset \sigma_{(I_1 \cap I_2) < (\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2)}$  であることは従うので逆の包含が成立することを示す。

[AHK18, Prop. 2.4] より  $\Sigma_{\mathcal{P}}$  は特に扇であるので  $\sigma_{I_1 < \mathcal{F}_1} \cap \sigma_{I_2 < \mathcal{F}_2}$  は  $\sigma_{I_1 < \mathcal{F}_1}$  の面である。ゆえに  $\sigma_{I_1 < \mathcal{F}_1} \cap \sigma_{I_2 < \mathcal{F}_2} = \sigma_{I_3 < \mathcal{F}_3}$  かつ  $I_3 \subset I_1$  かつ  $\mathcal{F}_3 \subset \mathcal{F}_1$  を満たす  $I_3$  と  $\mathcal{F}_3$  が存在する。さらに命題 1.4 より  $I_3 \subset I_2$  かつ  $\mathcal{F}_3 \subset \mathcal{F}_2$  となるので  $I_3 \subset I_1 \cap I_2$  かつ  $\mathcal{F}_3 \subset \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$  となり逆の包含が成立することが従う。 ■

## 参考文献

[AHK18] Karim Adiprasito, June Huh, and Eric Katz. “Hodge theory for combinatorial geometries”. In: *Ann. of Math. (2)* **188.2** (2018), pp. 381–452.