



Ahl Al Bayt University

جامعة أهل البيت

College of Medical & Health Technologies

كلية التقنيات الطبية والصحية

Department Anesthesia Techniques and laser

قسم تقنيات التخدير والليزر

Medical Physics/ First Stage

الفيزياء الطبية / المرحلة الأولى



Third Lecture

المحاضرة الثالثة

Energy, work and power of the body.

الطاقة والعمل وقوة الجسم.

What we study in this lec.:

ما ندرسه في هذا المحاضر:

By Ass. Lec. Maher Hadi

مع المدرس المساعد ماهر هادي

- Energy Metabolism (BMR) Unit of energy

• استقلاب الطاقة (BMR) وحدة الطاقة

- Factors affecting basal metabolic rate

• العوامل المؤثرة على معدل الأيض الأساسي

- Energy Expenditure



Energy: is defined as the ability to

الطاقة: تعرف بأنها القدرة على بذل شغل

•The body is constantly using energy to perform tasks such as

• يستخدم الجسم الطاقة باستمرار لأداء مهام مثل

breathing, digesting food, and maintaining a constant body

التنفس، وهضم الطعام، والحفاظ على ثبات الجسم

temperature.

درجة حرارة.

•This energy is obtained from the food we consume, which is

• يتم الحصول على هذه الطاقة من الطعام الذي نستهلكه، وهو

converted into chemical energy through a process called

تحويلها إلى طاقة كيميائية من خلال عملية تسمى

metabolism.

الاستقلاب.

All activities in the body, including energy changes.

جميع الأنشطة في الجسم، بما في ذلك تغيرات الطاقة.

Converting energy into work, such as lifting weights or riding a

تحويل الطاقة إلى عمل، مثل رفع الأثقال أو ركوب الخيل

bicycle, represents only a small part of the body's total energy

فالدراجة لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي طاقة الجسم

transformations.

التحويلات.

The body uses the food energy to:

يستخدم الجسم الطاقة الغذائية من أجل:



Metabolism (BMR): is the set of biochemical reactions

الاستقلاب (BMR): هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تحدث في الجسم

body to maintain life and sustain bodily functions.

الجسم للحفاظ على الحياة والحفاظ على وظائف الجسم.

•Factors affecting basal metabolic rate:

العوامل المؤثرة على معدل الأيض الأساسي:

1. Basal metabolic rate depends on the function of the thyroid gland. A person with hyperthyroidism has a higher basal metabolic rate than a person with normal thyroid function.

1. يعتمد معدل الأيض الأساسي على وظيفة الغدة الدرقية. الشخص المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية لديه معدل أيض أساسي أعلى من الشخص الذي يتمتع بوظيفة الغدة الدرقية الطبيعية.

than a person with normal thyroid function.

من الشخص الذي يتمتع بوظيفة الغدة الدرقية الطبيعية.

2. Basal metabolic rate is related to the surface area or mass of the body. The energy used in basal metabolism is related to the surface area of the body, not the mass. The energy used in basal metabolism is related to the surface area of the body, not the mass.

2. يرتبط معدل الأيض الأساسي بمساحة سطح الجسم أو كتلته. يتم تحويل الطاقة المستخدمة في عملية التمثيل الغذائي الأساسي إلى حرارة.

that is dissipated from the skin.

الذي يتبدد من الجلد.

3. Metabolic rate depends largely on body temperature.

3. يعتمد معدل التمثيل الغذائي إلى حد كبير على درجة حرارة الجسم.

Any energy that is left over is stored as body fat.

يتم تخزين أي طاقة متبقية على شكل دهون في الجسم.

We can calculate BMR using different formulas, the

يمكننا حساب معدل الأيض الأساسي (BMR) باستخدام صيغ مختلفة، وهي

Mifflin-St Jeor Equation

معادلة ميفلين-سانت جيور

This equation is used to estimate the Basal Metabolic Rate (BMR), which is the number of calories the body needs at rest to maintain basic physiological functions such as breathing and circulation.

تستخدم هذه المعادلة لتقدير معدل الأيض الأساسي (BMR)، وهو عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم أثناء الراحة للحفاظ على الوظائف الفسيولوجية الأساسية مثل التنفس والدورة الدموية.

Formula:

صيغة:

1. For Men:

1. للرجال:

$$BMR = 10 \times \text{mass (kg)} + 6.25 \times \text{height (cm)} - 5 \times \text{age (years)} + 5$$

الوزن (كجم) + 6.25 × الارتفاع (سم) - 5 × العمر (بالسنوات) + 5 = BMR

2. For Women:

2. للنساء:

$$BMR = 10 \times \text{mass (kg)} + 6.25 \times \text{height (cm)} - 5 \times \text{age (years)} - 161$$

معدل الأيض الأساسي = 10 × الكتلة (كجم) + 6.25 × الارتفاع (سم) - 5 × العمر (بالسنوات) - 161

Mifflin-St Jeor Equation

معادلة ميفلين-سانت جيور

This equation is used to estimate the Basal Metabolic Rate (BMR), which is the number of calories the body needs

تستخدم هذه المعادلة لتقدير معدل الأيض الأساسي (BMR)، وهو عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم

at rest to maintain basic physiological functions such as breathing and circulation.

في حالة الراحة للحفاظ على الوظائف الفسيولوجية الأساسية مثل التنفس والدورة الدموية.

Formula:

صيغة:

1. For Men:

1. للرجال:

$$\text{BMR} = 10 \times \text{mass (kg)} + 6.25 \times \text{height (cm)} - 5 \times \text{age (years)} + 5$$

معدل الأيض الأساسي = $10 \times \text{الكتلة (كجم)} + 6.25 \times \text{الارتفاع (سم)} - 5 \times \text{العمر (بالسنوات)} + 5$

2. For Women:

2. للنساء:

$$\text{BMR} = 10 \times \text{mass (kg)} + 6.25 \times \text{height (cm)} - 5 \times \text{age (years)} - 161$$

معدل الأيض الأساسي = $10 \times \text{الكتلة (كجم)} + 6.25 \times \text{الارتفاع (سم)} - 5 \times \text{العمر (بالسنوات)} - 161$

Example1: Calculate the basal metabolic rate (BMR) using the Mifflin-St. Jour equation for a 30-year-old

مثال 1: حساب معدل الأيض الأساسي (BMR) باستخدام Mifflin-St. معادلة جور لرجل عمره 30 سنة ووزنه 70 كيلو و

standing 175 cm tall.

يقف 175 سم.

Solution:

حل:

Gender: Male // ((mass: 70 kg) //(Height: 175 cm) //(Age: 30 years))

الجنس: ذكر // ((الكتلة: 70 كجم) //(الارتفاع: 175 سم) //(العمر: 30 سنة))

$$\text{BMR} = 10 \times \text{mass (kg)} + 6.25 \times \text{height (cm)} - 5 \times \text{age (years)} + 5$$

معدل الأيض الأساسي = $10 \times \text{الكتلة (كجم)} + 6.25 \times \text{الارتفاع (سم)} - 5 \times \text{العمر (بالسنوات)} + 5$

$$\text{BMR} = (10 \times 70) + (6.25 \times 175) - (5 \times 30) + 5 \quad (700) + (1093.75) - (150) + 5$$

Example2:

مثال 2:

Calculate the Basal Metabolic Rate (BMR) using the Mifflin-St Jeor equation for a 30-year-old woman,

حساب معدل الأيض الأساسي (BMR) باستخدام معادلة ميفلين-سانت جيور لامرأة تبلغ من العمر 30 عامًا،

weighing 70 kg and standing 175 cm tall.

وزنه 70 كجم وطوله 175 سم.

Solution: Gender: feMale

// ((mass: 70 kg) //(Height: 175 cm)//(Age: 30 years))

الحل: الجنس: أنثى // ((الكتلة: 70 كجم) //(الارتفاع: 175 سم) //(العمر: 30 سنة))

Equation for Women:

المعادلة للنساء:

BMR=10× mass (kg)+6.25×height (cm)·5×age (years)·161

معدل الأيض الأساسي = 10 × الكتلة (كجم) + 6.25 × الارتفاع (سم) - 5 × العمر (بالسنوات) - 161

BMR=(10×70)+(6.25×175)·(5×30)·161

معدل الأيض الأساسي = (10 × 70) + (6.25 × 175) - (5 × 30) - 161

)700+1093.75(=1793.75

1793.75·150=1643.75

1643.75·161

)700+1093.75(=1793.75 1793.75-150=1643.75 1643.75-161

BMR·1483 kcal/day

معدل الأيض الأساسي 1483 سعرة حرارية/يوم

This reflects the natural physiological differences in body composition, as men generally have a higher muscle mass and a higher basal

وهذا يعكس الاختلافات الفسيولوجية الطبيعية في تكوين الجسم، حيث أن الرجال عمومًا لديهم كتلة عضلية أعلى وقاعدة أعلى

metabolic rate compared to women of the same weight, height, and age.

معدل الأيض مقارنة بالنساء من نفس الوزن والطول والعمر.

Unit of energy

وحدة الطاقة

- A convenient unit for expressing the rate of energy con

• - وحدة مناسبة للتعبير عن معدل استهلاك الجسم للطاقة هي الممت. التقى هو

defined as 50 kcal/m² of body surface area per hour.

يتم تعريفها على أنها 50 سرعة حرارية / م² من مساحة سطح الجسم في الساعة.

- The most widely accepted physics units for energy is N

• - الوحدات الفيزيائية الأكثر قبولا للطاقة هي نيوتن متر أو الجول (J).

- summarized as follows:

• ملخصة على النحو التالي:

$$1 \text{ kcal} = 4184 \text{ J}$$

1 كيلو كالوري = 4184 ج

$$1 \text{ J} = 10^7 \text{ ergs}$$

1 ي = 10⁷ إرج

$$1 \text{ kcal/hr} = 1.162 \text{ W}$$

1 سرعة حرارية/ساعة = 1.162 واط

$$1 \text{ met} = 50 \text{ kcal/m}^2$$

1 ميت = 50 سرعة حرارية/م²

Example:1

مثال:1

Convert 2 kilocalories (kcal) to joules (J).

تحويل 2 سعرة حرارية (كيلو كالوري) إلى جول (J).

Solution:

حل:

We know the conversion factor:

نحن نعرف عامل التحويل:

$$2\text{kcal}=2\times4184=8368\text{J}.$$

$2\text{kcal}=2\times4184=8368\text{J}.$

Example:2

مثال:2

Convert 5000 joules (J) to kilocalories (kcal).

تحويل 5000 جول (J) إلى سعرة حرارية (كيلو كالوري).

...: We know that: 1 kilocalorie (kcal) = 4184 joules (J).

...: (J) نعلم أن: 1 كيلو سعر حراري = 4184 جول.

To convert from joules to kilocalories, divide the number of joules by 4184.

للتحويل من الجول إلى كيلو سعر حراري، قم بقسمة عدد الجول على 4184.

The first law of thermodynamics can be written as

يمكن كتابة القانون الأول للديناميكا الحرارية على النحو التالي:

$$\Delta U = Q - W$$

$$\Delta U = Q - W$$

Where, ΔU Is the change in stored energy.

حيث ΔU هو التغير في الطاقة المخزنة.

Q Is the heat lost or gained.

هل الحرارة المفقودة أم المكتسبة؟ Q

W Is the work done by the body

هو الشغل الذي يبذله الجسم W

Work of the body

عمل الجسم

From the description of energy (ability to do work), we can conclude that where energy

من وصف الطاقة (القدرة على بذل شغل)، يمكننا أن نستنتج أن الطاقة هي

resides, there is an ability to do work. Therefore, because cells of the body store energy

يوجد، هناك القدرة على القيام بالعمل. ولذلك، لأن خلايا الجسم تخزن الطاقة،

they can do work.

يمكنهم القيام بالعمل.

The internal energy stored (ΔU) during break down of a molecule can do work ($-W$)

الطاقة الداخلية المخزنة (ΔU) أثناء تحليل الجزيء يمكنها بذل شغل ($-W$)

the heat content (Q) of the body is the sum of the first and second laws of thermodynamics

change in stored energy in the body = heat lost or gained .

التغير في الطاقة المخزنة في الجسم = الحرارة المفقودة أو المكتسبة - الشغل المبذول

(i.e. food energy, body fat and body heat) of the body

(أي الطاقة الغذائية ودهون الجسم وحرارة الجسم) من الجسم

.....

الطاقة وإس هتالكها يف اجلسم

Energy in the Human Body

الطاقة في جسم الإنسان

What is Energy Expenditure?

ما هو إنفاق الطاقة؟

The amount of energy used for vital functions & physical

كمية الطاقة المستخدمة للوظائف الحيوية والجسدية

activities (measured in kcal).

الأنشطة (تقاس بالسرعات الحرارية).

Key Factors:

العوامل الرئيسية:

- Physical activity level

• مستوى النشاط البدني


- Body weight & composition

• وزن الجسم وتكوينه

- Intensity & duration of activity

• كثافة ومدة النشاط

Forms of Energy in the Body:



Components of Daily Energy Expenditure

مكونات نفقات الطاقة اليومية

The Three Pillars of Energy Expenditure

الركائز الثلاث لإنفاق الطاقة

1. Basal Metabolic Rate (BMR) / Resting Metabolic Rate (RMR)

1. معدل الأيض الأساسي (BMR) / معدل الأيض أثناء الراحة (RMR)

60-70% of total daily energy expenditure

60-70% من إجمالي إنفاق الطاقة اليومي

Energy used for essential life functions at complete rest:

الطاقة المستخدمة للقيام بوظائف الحياة الأساسية في حالة الراحة الكاملة:

- Maintaining body temperature

• الحفاظ على درجة حرارة الجسم

- Powering vital organs (heart, lungs, brain)

• تزويد الأعضاء الحيوية بالطاقة (القلب، الرئتين، الدماغ)

- Cell repair and regeneration

• إصلاح الخلايا وتجديدها

- Basic neurological functions

• الوظائف العصبية الأساسية

2. Thermic Effect of Food (TEF)

2. التأثير الحراري للأغذية (TEF)

Approximately 10% of total daily energy expenditure


ما يقرب من 10% من إجمالي نفقات الطاقة اليومية

Energy required to digest, absorb, and process nutrients:

الطاقة اللازمة لهضم وامتصاص ومعالجة العناصر الغذائية:

- Chewing and swallowing
- 2- Enzyme production
- 3- Nutrient absorption & transport
- 4- Storing excess energy

Expenditure Distribution (Moderately Active Individual)



Energy expenditure rates in the body's organs at rest

|| معدلات صرف الطاقة في أعضاء الجسم عند

استراحة

- Under resting conditions about 25% of the body's energy is being used by

• في ظروف الراحة يتم استخدام حوالي 25% من طاقة الجسم

the skeletal muscles and the heart,

العضلات الهيكلية والقلب،

- 19% Is Being Used By The Brain,

19% يستخدمها الدماغ،

- 10% Is Being Used By The Kidneys, And

10% يستخدم عن طريق الكلى، و

- 27% Is Being Used By The Liver And The Spleen.

27% يستخدم من قبل الكبد والطحال.

- A Small Percent Of About 5% Of Food Energy Being Excreted In Feces And Urine

يتم إخراج نسبة صغيرة من حوالي 5% من الطاقة الغذائية في البراز والبول

Methods of Measuring Energy Expenditure

طرق قياس إنفاق الطاقة

Heart rate monitors.

- أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب.

Activity trackers (e.g. smartwatches)

H.W

الأب

Question 1: Calculating Basal Metabolic Rate (Mifflin-St Jeor Equation) Problem: Calculate the Basal Metabolic Rate (BMR) for each

السؤال 1: حساب معدل الأيض الأساسي (معادلة ميفلين-سانت جيور) المشكلة: حساب معدل الأيض الأساسي (BMR) لكل

of the following two cases: Case A: A 35-year-old man, weighing 80 kg, and 180 cm tall Case B: A 28-year-old woman, weighing 65

من الحالتين التاليتين: الحالة أ: رجل يبلغ من العمر 35 عاماً، وزنه 80 كجم، وطوله 180 سم. الحالة ب: امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً، ووزنها 65 كجم،

and 165 cm tall

وطوله 165 سم

Question2: An energy drink label states that it provides 85,000 Joules of energy.

السؤال الثاني: يشير ملصق مشروب الطاقة إلى أنه يوفر 85000 جول من الطاقة.

Calculate how many kilocalories (kcal) this is equivalent to, using the conversion?

احسب كم عدد السعرات الحرارية (kcal) المكافئة باستخدام التحويل؟