

ANALYSIS 2 - HAUSAUFGABE 6

Tom Nick 342225
Tom Lehmann 340621
Maximilian Bachl 341455

Aufgabe 1

Es handelt sich hier um die Suche nach Extrema mit Nebenbedingung, weshalb wir zunächst nach Extrema auf dem Rand des Kreises suchen.

Die Nebenbedingung lautet: $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$.

1. Singulärer Fall:

$$\nabla g(\vec{x}) = \vec{0} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \Rightarrow (x, y) = (0, 0)$$

Da $g(0, 0) = -1 \neq 0$ gibt es hier keinen singulären Fall.

2. $\nabla f(\vec{x}) = \lambda \cdot \nabla g(\vec{x})$

$$\nabla f(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 6x - 2y \\ -2x + 2y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} = \lambda \cdot \nabla g(\vec{x})$$

Also:

$$\begin{aligned} 6x - 2y &= \lambda \cdot 2x \Rightarrow x \text{ TODO} \\ -2x + 2y &= \lambda \cdot 2y \end{aligned}$$

TODO

Wir prüfen zunächst die notwendige Bedingung für kritische Punkte $\nabla f(\vec{x}_k) = 0$:

$$\nabla f(\vec{x}) = \vec{0} = \begin{pmatrix} 2(x - y) + 4x \\ -2(x - y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x - 2y \\ -2x + 2y \end{pmatrix}$$

Also:

$$\begin{aligned} 0 &= 6x - 2y \text{ Evtl. Nummerierung hinzufügen} \\ 0 &= -2x + 2y \\ \Rightarrow 0 &= 4x \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 0 \end{aligned}$$

Wir erhalten deshalb einen kritischen Punkt: $x_{k1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Die Hessematrix ist, da es sich bei f um eine zweimal stetig partiell differentierbare Funktion handelt, gemäß dem Satz von Schwarz, invertierbar.

$$\begin{aligned} f''(\vec{x}) &= H_f(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \\ D_1 &= \det(6) = 6 > 0 \\ D_2 &= \det \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = 8 > 0 \end{aligned}$$

Damit ist $H_f(\vec{x})$ positiv definit, woraus schlusszufolgern ist, dass die Funktion f bei $f(0,0) = 0$ ein lokales Minimum besitzt. Da $f(x,y)$ eine Komposition aus $(x-y)^2 > 0 \quad \forall x,y \in \mathbb{R}$ und $2x^2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ ist, ist $f(0,0) = 0$ sogar ein globales Minimum.