

# Theoretische Grundlagen der Informatik 3: Hausaufgabenabgabe 8

## Tutorium: Sebastian , Mi 14.00 - 16.00 Uhr

Tom Nick - 340528  
 Maximilian Bachl - 341455  
 Marius Liwotto - 341051

### Aufgabe 1

- (i)
- Gilt für alle Graphen mit einer Kante:  $A_1 \models \varphi_1, A_2 \models \varphi_1, A_3 \models \varphi_1$
  - Gilt für alle Graphen bei dem jeder Knoten zwei Kanten hat und ein dritter Knoten existiert, der keine Kante zu diesem Knoten hat.  $A_1 \models \varphi_2, A_2 \models \varphi_2, A_3 \not\models \varphi_2$
  - Gilt für alle Graphen, bei denen alle unterschiedlichen Knoten mit allen unterschiedlichen Knoten verbunden sind.  $A_1 \models \varphi_3, A_2 \models \varphi_3, A_3 \not\models \varphi_3$

(ii)

$$\begin{aligned}\psi_0(x) &= \forall y(x \cdot y = x) \\ \psi_1(x) &= \forall y(x \cdot y = y) \\ \psi_i(x) &= \exists y(\psi_1(y) \wedge \exists z(\psi_0(z) \wedge y + (x \cdot x) = z)) \\ \psi_{\text{inverse mult.}} &= \exists z((\psi_1(z) \wedge \forall x \exists y(x \cdot y = z)) \\ \phi_1 &= \neg(\psi_{\text{inverse mult.}}) \\ \phi_2 &= \psi_{\text{inverse mult.}} \wedge \neg(\exists x \psi_i(x)) \\ \phi_3 &= \exists x \psi_i(x)\end{aligned}$$

$\psi_0(x)$  beschreibt eine 0. Also das übergeben x hat die Eigenschaften der 0 bzw. bei diesen Mengen erfüllt nur die 0 diese Eigenschaften. Analog mit  $\psi_1(x)$  für 1 und  $\psi_i(x)$  für  $i$ .  $\psi_{\text{inverse mult.}}$  gilt wenn jedes Element bezüglich der Multiplikation ein inverses Element besitzt (Wenn 1 das neutrale Element ist). Die natürlichen Zahlen besitzen diese Eigenschaft nicht, weshalb  $\phi_1$  nur von diesen erfüllt wird ( $\mathbb{Z}$  würde auch  $\phi_1$  erfüllen.) Die rationalen Zahlen besitzen zwar für jedes Element ein inverses bzgl. der Multiplikation, aber kein Element mit den Eigenschaften von  $i$ . Die komplexen Zahlen besitzen ein Element mit den Eigenschaften von  $i$ .

### Aufgabe 2

$$\begin{aligned}\text{var}(\phi) &= \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \\ \beta(x_i) &= \begin{cases} \top, & x_i = 1 \\ \perp, & x_i = 0 \end{cases} \\ \varphi_e &= \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \neg Z^A(\llbracket \phi \rrbracket^\beta) \\ \varphi_t &= \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \neg Z^A(\llbracket \phi \rrbracket^\beta)\end{aligned}$$

### Aufgabe 3

$$\varphi_k = \exists x_1 \dots \exists x_k (\forall y (\bigvee_{1 \leq i \leq k} x_i = y \vee E(y, x_i)))$$