

Theoretische Grundlagen der Informatik 3: Hausaufgabenabgabe 4

Tutorium: Sebastian , Mi 14.00 - 16.00 Uhr

Tom Nick - 340528
Maximilian Bachl - 341455
Marius Liwotto - 341051

Aufgabe 1

- (i) Der Aufbau von φ besitzt 3 Muster für Klauseln, welche auf dem Aufgabenblatt auch untereinander dargestellt sind. Man kann φ auch schreiben als:

$$\bigvee_{X \in \{A, B, C\}} (X_0 \vee X_1) \wedge \bigvee_{Y \in \{A, B, C\} \setminus \{X\}} (\neg X_0 \vee \neg Y_0) \wedge (\neg X_1 \vee \neg Y_1)$$

Diese Form lässt es offensichtlich machen, warum

1. φ nicht erfüllbar ist:

In der zweiten grossen Konjunktion, kommt in den Klauseln jeweils die negierte Version der Variablen der Klausel aus der ersten grossen Konjunktion vor $((X_0 \vee X_1) \wedge (\neg X_0 \vee \dots) \wedge (\neg X_1 \vee \dots))$. Da dies jedoch für alle Variablen aus φ gleichermassen gilt, kann φ nicht erfüllbar sein.

2. φ erfüllbar ist, wenn eine beliebige Klausel entfernt wird:

Fall 1: Eine Klausel des Typs $(X_0 \vee X_1)$ mit $X \in \{A, B, C\}$ wird weggelassen:

$\Rightarrow X_0, X_1$ kann mit 0 belegt werden.

\Rightarrow Klauseln der Form $(\neg X_0 \vee \neg Y_0)$ und $(\neg X_1 \vee \neg Y_1)$ mit $Y \in \{A, B, C\} \setminus \{X\}$ sind erfüllt

\Rightarrow Belege Y_0, Z_1 mit 1 und Y_1, Z_0 mit 0, wobei $Z \in \{A, B, C\} \setminus \{X, Y\}$

\Rightarrow Die Klauseln $(Y_0 \vee Y_1), (Z_0 \vee Z_1), (\neg Y_0 \vee \neg Z_0), (\neg Y_1 \vee \neg Z_1)$ sind erfüllt.

Fall 2: Eine Klausel des Typs $(\neg X_0 \vee \neg Y_0)$ mit $X \in \{A, B, C\}, Y \in \{A, B, C\} \setminus \{X\}$ wird weggelassen.

Belege (X_0, Y_0) mit 1

$\Rightarrow (X_1, Y_1)$ können mit 0 belegt werden.

\Rightarrow Klauseln der Form $(\neg X_1 \vee \neg Z_1)$ und $(\neg Y_1 \vee \neg Z_1)$ mit $Z \in \{A, B, C\} \setminus \{X, Y\}$ sind erfüllt

$\Rightarrow Z_1$ kann mit 1 belegt werden.

$\Rightarrow (Z_0 \vee Z_1)$ ist erfüllt

$\Rightarrow Z_0$ kann mit 0 belegt werden

\Rightarrow Klauseln der Form $(\neg X_0 \vee \neg Z_0)$ und $(\neg Y_0 \vee \neg Z_0)$ sind erfüllt

Fall 3: Eine Klausel des Typs $(\neg X_1 \vee \neg Y_1)$ mit $X \in \{A, B, C\}, Y \in \{A, B, C\} \setminus \{X\}$ wird weggelassen.
analog zu Fall 2.

(ii)

$$\begin{aligned}
& \varphi \stackrel{res(\{A_0, A_1\}, \{\neg A_0, \neg C_0\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \\
& \stackrel{res(\{A_1, \neg C_0\}, \{\neg A_1, \neg B_1\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \cup \{\neg C_0, \neg B_1\} \\
& \stackrel{res(\{B_0, B_1\}, \{\neg B_1, \neg C_1\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \cup \{\neg C_0, \neg B_1\} \cup \{B_0, \neg C_1\} \\
& \stackrel{res(\{B_0, B_1\}, \{\neg A_1, \neg B_1\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \cup \{\neg C_0, \neg B_1\} \cup \{B_0, \neg C_1\} \cup \{\neg A_1, B_0\} \\
& \stackrel{res(\{A_1, \neg C_0\}, \{\neg A_1, B_0\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \cup \{\neg C_0, \neg B_1\} \cup \{B_0, \neg C_1\} \cup \{\neg A_1, B_0\} \cup \{\neg C_0, B_0\} \\
& \stackrel{res(\{\neg B_0, \neg C_0\}, \{\neg C_0, B_0\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \cup \{\neg C_0, \neg B_1\} \cup \{B_0, \neg C_1\} \cup \{\neg A_1, B_0\} \cup \{\neg C_0, B_0\} \cup \{\neg C_0\} \\
& \stackrel{res(\{C_0, C_1\}, \{\neg C_0\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \cup \{\neg C_0, \neg B_1\} \cup \{B_0, \neg C_1\} \cup \{\neg A_1, B_0\} \cup \{\neg C_0, B_0\} \cup \{\neg C_0\} \cup \{C_1\} \\
& \stackrel{res(\{\neg A_1, \neg C_1\}, \{C_1\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \cup \{\neg C_0, \neg B_1\} \cup \{B_0, \neg C_1\} \cup \{\neg A_1, B_0\} \cup \{\neg C_0, B_0\} \cup \{\neg C_0\} \cup \{C_1\} \\
& \quad \cup \{\neg A_1\} \\
& \stackrel{res(\{B_0, \neg C_1\}, \{C_1\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \cup \{\neg C_0, \neg B_1\} \cup \{B_0, \neg C_1\} \cup \{\neg A_1, B_0\} \cup \{\neg C_0, B_0\} \cup \{\neg C_0\} \cup \{C_1\} \\
& \quad \cup \{\neg A_1\} \cup \{B_0\} \\
& \stackrel{res(\{A_1, \neg C_0\}, \{\neg A_1, B_0\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \cup \{\neg C_0, \neg B_1\} \cup \{B_0, \neg C_1\} \cup \{\neg A_1, B_0\} \cup \{\neg C_0, B_0\} \cup \{\neg C_0\} \cup \{C_1\} \\
& \quad \cup \{\neg A_1\} \cup \{B_0\} \cup \{\neg A_0\} \cup \{A_1\} \\
& \stackrel{res(\{\neg A_1\}, \{A_1\})}{=} \varphi \cup \{A_1, \neg C_0\} \cup \{\neg C_0, \neg B_1\} \cup \{B_0, \neg C_1\} \cup \{\neg A_1, B_0\} \cup \{\neg C_0, B_0\} \cup \{C_1\} \\
& \quad \cup \{\neg A_1\} \cup \{B_0\} \cup \{\neg A_0\} \cup \{A_1\} \cup \square
\end{aligned}$$

Somit ist φ unerfüllbar, da sich die leere Klausel resolvidieren lässt.

Aufgabe 2

- (i) Damit eine Klauselmenge nicht erfüllbar ist, muss es eine Resolutionswiderlegung geben, d.h. man muss aus der Klauselmenge die leere Klausel herleiten können. Die leere Klausel lässt sich wiederum nur herleiten, wenn 2 Klauseln der Form $\{V\}\{\neg V\}$ aus der Klauselmenge hergeleitet werden können, d.h., dass es möglich sein muss eine pos. Klausel herzuleiten.

Ich werde nun beweisen, dass es nicht möglich ist eine positive Klausel herzuleiten, wenn man eine Klauselmenge gegeben hat, die keine positiven Klauseln enthält.

Annahme: \mathcal{C} ist eine Klauselmenge ohne positive Klauseln.

Fall: 1 Es können keine Resolventen gebildet werden

Hier ist nichts zu beweisen.

Fall: 2 Es können Resolventen gebildet werden

Es existieren 2 Klauseln $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2 \in \mathcal{C}$ mit $\mathcal{C}_1 = \{X_1, \dots, X_n\}, \mathcal{C}_2 = \{\neg X_1, \dots, X_m\}$, sodass:

$$\begin{aligned}
R &:= \mathcal{C}_1 \setminus \{X_1\} \cup \mathcal{C}_2 \setminus \{\neg X_1\} \\
\mathcal{C} &\stackrel{res(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)}{=} \mathcal{C} \cup \{R\}
\end{aligned}$$

Es gilt wegen \mathcal{C} enthält keine pos. Klauseln:

$$\exists i \in [1, n]. (\neg X_i \in \mathcal{C}_1) \Rightarrow \neg X_i \in R \Rightarrow R \text{ ist keine pos. Klausel}$$

\Rightarrow es können keine pos. Klauseln durch das Resolvieren der Klauseln aus \mathcal{C} entstehen

\Rightarrow es nicht möglich eine pos. Klausel aus \mathcal{C} herzuleiten

Da es notwendig ist eine positive Klausel herzuleiten, damit die leere Klausel hergeleitet werden kann, folgt, dass es keine Resolutionswiderlegung für eine Klauselmengel ohne pos. Klauseln gibt. Daraus folgt, wegen dem Resolutionskalkül, dass jede Klauselmengel ohne pos. Klauseln erfüllbar ist.

$$(ii) \quad \{\{-Z, Y\}, \{V, Y, Z\}, \{\neg X, V\}, \{\neg V, Y\}, \{\neg Y\}\} \stackrel{res(\{-Z, Y\}, \{V, Y, Z\})}{\equiv} \mathcal{C} \cup \{\{Y, V\}\} \stackrel{res(\{\neg V, Y\}, \{V, Y, Z\})}{\equiv} \\ \mathcal{C} \cup \{\{Y, V\}\} \cup \{\{Y, Z\}\} \stackrel{res(\{-Z, Y\}, \{Y, Z\})}{\equiv} \mathcal{C} \cup \{\{Y, V\}\} \cup \{\{Y, Z\}\} \cup \{\{Y\}\} \stackrel{res(\{\neg Y\}, \{Y\})}{\equiv} \mathcal{C} \cup \{\{Y, V\}\} \cup \\ \{\{Y, Z\}\} \cup \{\{Y\}\} \cup \{\emptyset\}$$

Aus dem Resolutionskalkül folgt, dass \mathcal{C} nicht erfüllbar ist, da es die leere Klausel enthält.

- (iii) Die P-Resolution muss korrekt sein, da alle von der P-Resolution gebildeten Resolventen auch mit der normalen Resolution gebildet werden können. Wenn also die leere Klausel mit der P-Resolution gebildet werden kann, dann kann man mit der normalen Resolution ebenfalls die leere Klausel herleiten. Aus der VL wissen wir, dass wenn man mit der Resolution die leere Klausel herleiten kann, so ist die Klauselmengue unerfüllbar. Daraus folgt unweigerlich, dass die Herleitung der leeren Klausel mit der P-Resolution, bedeutet, dass die Klauselmengue unerfüllbar ist.

Aufgabe 3

Rückrichtung:

Den Kanten $\{u, v\} \in E$ werden die Variablen $X_{u,v,col}$ und $col \in \{0, \dots, 3\}$ zugeordnet.

$$\text{proper-colour} = \left\{ \bigvee_{col \in \{0, \dots, 3\}} (X_{u,v,col} \wedge \bigwedge_{\overline{col} \in \{0, \dots, 3\} \setminus \{col\}} \neg X_{u,v,\overline{col}}) \mid u, v \in V \right\}$$

Die Funktion proper-colour stellt sicher, dass jeder Kante nur eine Farbe zugewiesen wird.

$$\text{different-colour} = \{X_{u,v,col} \wedge \neg X_{u',v',col} \mid \{u, v\} \cap \{u', v'\} \neq \emptyset \wedge \{u, v\} \neq \{u', v'\} \wedge c(\{u, v\}) = col \wedge \{u, v\}, \{u', v'\} \in E\}$$

$$\Phi = \text{proper-colour} \cup \text{different-colour}$$

Sei $\Phi_0 \subset \Phi$ endlich.

$$E' = \{\{u, v\} \in E \mid \text{es existiert ein } col \in \{0, \dots, 3\}, \text{ sodass } X_{u,v,col} \in \text{var}(\Phi_0)\}$$

Der von E' induzierte Untergraph ist endlich, da $\text{var}(\Phi_0)$ endlich ist. Daraus folgt nach Annahme, dass der Untergraph 4-kantenfärbbar ist.

Sei f definiert als:

$$f : E' \rightarrow \{0, \dots, 3\} \text{ eine 4-Kantenfärbung von } G'|_{E'}$$

Und β wie folgt definiert:

$$\beta(X_{u,v,f(\{u,v\})}) = 1, \beta(X_{u,v,col}) = 0 \text{ mit } f(\{u,v\}) \neq col$$

Somit erfüllt $\beta \Phi_0$.

Nach dem Kompaktheitssatz gilt nun, dass Φ ebenfalls erfüllbar ist, da alle endlichen Teilmengen Φ_0 erfüllbar sind. Daraus folgt auch, dass G 4-kantenfärbbar ist, wenn es alle endlichen Untergraphen sind.

Hinrichtung:

Die Hinrichtung ist trivial.

Aufgabe 4

- (i) a) $\varphi = \bigwedge_{0 \leq i < j \leq \infty} X_{i,j}$
b) $\psi = \bigwedge_{0 \leq i < j < k \leq \infty} (X_{i,j} \wedge X_{j,k} \Rightarrow X_{i,k})$

- (ii) Wir konstruieren folgende Menge:

$$\Phi = \{X_1, X_2, \dots\}$$

$$\psi = \bigwedge_{i=1}^{\infty} X_i$$

Nach dem 2. Punkt des Kompaktheitssatzes muss gelten: $\Phi \models \psi \Leftrightarrow \Phi_0 \models \psi$, wobei Φ_0 eine endliche Teilmenge von Φ ist.

Hier erfüllt Φ offensichtlich ψ , wobei es keine endliche Teilmenge Φ_0 von Φ gibt, die ψ erfüllt.

Das ist ein Widerspruch zum Kompaktheitssatz.