

Оглавление

1	Постановка задачи	3
1.1	Предварительные сведения	3
1.2	Беззвездные языки	3
1.3	Кусочно тестируемые языки	5
2	Сведения из теории полугрупп	9
2.1	Отношения Грина	9
2.2	Пример: отношения Грина в моноиде преобразований	11
2.3	Лемма Грина	12
2.4	Роль идемпотентов	14
2.5	Вычисление регулярных \mathcal{D} -классов	17
3	Теорема Саймона	21
4	Синтаксический моноид	25
4.1	Моноид переходов автомата	25

Глава 1

Постановка задачи

1.1 Предварительные сведения

Мы предполагаем, что читатель знаком с основами теории формальных языков и конечных автоматов в пределах стандартного университетского курса дискретной математики. В частности, мы предполагаем известной теореме Клини о том, что класс языков над данным конечным алфавитом Σ , распознаваемых конечными детерминированными автоматами, совпадает с классом *рациональных* языков над Σ , т.е. с наименьшим классом языков, который

- а) содержит пустой язык и все языки вида $\{a\}$, где $a \in \Sigma$;
- б) вместе с любым языком L содержит его *итерацию* L^* , т.е. множество всевозможных конечных произведений слов из L (включая пустое произведение, которое считается равным пустому слову 1);
- в) вместе с любыми двумя языками содержит их объединение и их произведение.

Мы будем считать известным задание рациональных языков *регулярными выражениями* и будем пользоваться такими заданиями.

1.2 Беззвездные языки

Среди операций, используемых в определении рациональных языков, итерация является наиболее «сложной», так как фактически описывает некоторый бесконечный процесс:

$$L^* = \{1\} \cup L \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots \cup L^n \cup \dots$$

Действительно ли она необходима? Ясно, что просто удалить итерацию из определения рациональных языков нельзя, поскольку все остальные операции не могут произвести бесконечный язык из конечных языков. Но, может быть, можно заменить итерацию какой-нибудь более простой операцией, которая тем не менее может произвести бесконечный язык из конечных? Например, таким свойством обладает операция взятия *дополнения*. Напомним, что из теоремы Клини вытекает, что класс рациональных языков замкнут относительно взятия дополнений. Дадим соответствующее определение.

Определение 1.2.1. Класс *беззвездных* (star-free) языков над данным конечным алфавитом Σ – это наименьший класс языков, который

- а) содержит пустой язык и все языки вида $\{a\}$, где $a \in \Sigma$;
- б') вместе с любым языком L содержит его дополнение L^C ;
- в) вместе с любыми двумя языками содержит их объединение и их произведение.

Вопрос, который мы обсуждали выше, можно теперь сформулировать так: верно ли, что любой рациональный язык является беззвездным? Ответ на этот вопрос отрицателен – есть языки, которые не являются беззвездными. В качестве примера можно привести языки $(a^2)^*$ и $\{aba, b\}^*$. Мы докажем это позже, после того, как разовьем соответствующую технику.

Естественным образом возникает *проблема беззвездности*: как по данному языку над конечным алфавитом узнать, является ли он беззвездным. Эту проблему решил в 1966 г. Шютценберже¹. Отметим, что проблема беззвездности далеко не тривиальна: если язык задан каким-то регулярным выражением, явно использующим итерацию $*$, это еще не означает, что язык не является беззвездным.

Пример 1.2.1. Рациональный язык $(ab)^*$ над алфавитом $\Sigma = \{a, b\}$ на самом деле является беззвездным. Действительно, несложно проверить, что

$$(ab)^* = (\emptyset^C a \cup b \emptyset^C \cup \emptyset^C a^2 \emptyset^C \cup \emptyset^C b^2 \emptyset^C)^C.$$

В самом деле, с учетом того, что $\emptyset^C = \Sigma^*$, выражение в правой части описывает в точности множество всех слов, которые

¹Marcel-Paul (Marco) Schützenberger (1920 – 1996) – французский математик, сделавший существенный вклад в развитие теоретических компьютерных наук. Свою первую научную степень он получил по медицине в 1948 году, его диссертация была отмечена призом французской академии медицины. Вторую диссертацию по теории информации Шютценберже защитил в 1953 году. Математические интересы Шютценберже очень широки и включают теорию автоматов, формальных языков, теорию информации. Его можно по праву считать основателем комбинаторики слов, которая начала бурно развиваться с выходом в 1983 году одноименной книги, написанной под псевдонимом М. Лотэр (M. Lothaire) Шютценберже в соавторстве с учениками. Его именем названы несколько важных теорем и математических объектов.

- не оканчиваются на a ;
- не начинаются с b ;
- не содержат двух вхождений буквы a подряд;
- не содержат двух вхождений буквы b подряд.

Ясно, что это множество состоит из пустого слова и всевозможных слов, которые начинаются с a , оканчиваются на b и в которых вхождения букв a и b чередуются. Но это в точности описание множества $(ab)^*$.

Упражнение 1.2.1. Доказать, что языки $\{ab, ba\}^*$ и $(a(ab)^*b)^*$ являются беззвездными.

1.3 Кусочно тестируемые языки

Определение 1.3.1. Язык над данным конечным алфавитом Σ называется *кусочно тестируемым*, если он может быть получен с помощью конечного числа операций объединения, пересечения и дополнения из языков вида $\Sigma^*a_1\Sigma^*a_2\Sigma^*\dots\Sigma^*a_k\Sigma^*$, где $a_i \in \Sigma$.

Можно определить класс кусочно тестируемых языков и с помощью соответствующих распознавателей – так называемых *автоматов-гидр*. (Напомним, что гидрой в греческой мифологии называлось многоглавое чудовище, см. рис. 1.1.)




Рис. 1.1: Девятиглавая гидра

Автомат-гидра с h головками – это устройство, в состав которого входят:




Рис. 1.2: Автомат-гидра с семью головками

- потенциально бесконечная лента, разделенная на ячейки, в которых могут быть вписаны буквы некоторого конечного алфавита Σ ;
- h читающих головок, которые могут передвигаться вдоль ленты независимо друг от друга, но с сохранением взаимного порядка (первая головка всегда остается самой левой и т.д.), причем каждая головка может считывать символ из обозреваемой ей ячейки;
- конечной read-only памяти, которая содержит два списка слов длины $\leq h$ над Σ : список паролей и список запретов.

Автомат-гидра *принимает* слово $w \in \Sigma^*$, если он находит в w один из паролей и при этом не обнаруживает в w ни одного из запретов. В противном случае он *отвергает* w . Например, автомат, изображенный на рис. 1.2, принимает слово, написанное на ленте (AmpleUglyElkByRumba), поскольку находит в этом слове пароль (algebra), но не находит в нем запрещенного слова (erotica). Язык $L \subseteq \Sigma^*$ *распознается* автоматом-гидрой, если данный автомат принимает в точности те слова, которые принадлежат L . Несложно понять, что класс языков, распознаваемых автоматами-гидрами, совпадает с классом кусочно тестируемых языков.

Пример 1.3.1. Язык $\Sigma^*ab\Sigma^*$ является кусочно тестируемым тогда и только тогда, когда $\Sigma = \{a, b\}$.

Утверждение «тогда» понятно, так как $\Sigma^*ab\Sigma^* = \Sigma^*a\Sigma^*b\Sigma^*$ – если в слове от букв a и b есть вхождение a , предшествующее вхождению b , то есть и вхождение a , непосредственно предшествующее вхождению b . А вот утверждение «только тогда» мы пока доказать не можем.

Возникает *проблема кусочной тестируемости*: как по данному языку над конечным алфавитом узнать, является ли он кусочно тестируемым. Эту

проблему решил в 1972 г. Саймон ².

²Imre Simon (1943 – 2009) – бразильский математик и информатик венгерского происхождения. Проблему кусочной тестируемости Саймон решил в своей диссертации под руководством Януша Бжозовского в 1972 году. Дальнейшие его исследования были связаны в основном с комбинаторикой слов и теорией автоматов. В связи с некоторыми вопросами этих областей, Саймон ввел в рассмотрение множество действительных чисел с операциями $x \oplus y = \min\{x, y\}$ и $x \otimes y = x + y$. Это понятие получило название *тропическое полукольцо*, «тропическое» – в честь места, где жил его автор.

Глава 2

Необходимые сведения из теории полугрупп

2.1 Отношения Грина

Напомним, что *полугруппой* называется непустое множество, на котором определена операция, удовлетворяющая закону ассоциативности. Для полугруппы S через S^1 будем обозначать полугруппу S с единицей, возможно присоединенной.

Отношениями Грина называются следующие бинарные отношения:

1. $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow aS^1 = bS^1$. Это означает, что $\exists u, v \in S^1 : a = bu, b = av$, т.е. элементы a и b делят друг друга справа (aS^1 – главный правый идеал, порожденный элементом a).
2. $a\mathcal{L}b \Leftrightarrow S^1a = S^1b$.
3. $a\mathcal{H}b \Leftrightarrow aS^1 = bS^1, S^1a = S^1b$, т.е. $\mathcal{H} = \mathcal{R} \cap \mathcal{L}$.
4. $a\mathcal{J}b \Leftrightarrow S^1aS^1 = S^1bS^1$. Это означает, что $\exists u, v, x, y \in S^1 : a = ubv, b = xau$ (S^1aS^1 – главный идеал, порожденный элементом a).

Упражнение 2.1.1. *Отношения Грина являются отношениями эквивалентности.*

Также можно рассмотреть связанные с отношениями Грина отношения предпорядка:

1. $a \leq_{\mathcal{R}} b \Leftrightarrow aS^1 \subseteq bS^1$.
2. $a \leq_{\mathcal{L}} b \Leftrightarrow S^1a \subseteq S^1b$.
3. $a \leq_{\mathcal{H}} b \Leftrightarrow aS^1 \subseteq bS^1, S^1a \subseteq S^1b$.

$$4. a \leq_{\mathcal{J}} b \Leftrightarrow S^1 a S^1 \subseteq S^1 b S^1.$$

Предложение 2.1.1. *Отношения $\leq_{\mathcal{L}}$ и \mathcal{L} стабильны справа, а $\leq_{\mathcal{R}}$ и \mathcal{R} – слева.*

Доказательство. $a \leq_{\mathcal{L}} b \Leftrightarrow a = ub$ для некоторого $u \in S^1$. Умножим на c справа: $ac = ubc \Leftrightarrow ac \leq_{\mathcal{L}} bc$. \square

Если α и β бинарные отношения, то

$$\alpha\beta = \{(x, y) \mid \exists z : (x, z) \in \alpha, (z, y) \in \beta\}.$$

Предложение 2.1.2. $\mathcal{L}\mathcal{R} = \mathcal{R}\mathcal{L}$ и потому отношение $\mathcal{D} = \mathcal{L}\mathcal{R}$ является наименьшим отношением эквивалентности, содержащим \mathcal{L} и \mathcal{R} одновременно.

Доказательство. Пусть $a\mathcal{L}\mathcal{R}b$: $\exists c \in S$ такое, что $a\mathcal{L}c$ и $c\mathcal{R}b$, т.е. $\exists u, v \in S^1, \exists x, y \in S^1 : a = uc, c = va, c = bx, b = cy$. Через d обозначим $ay = usc = ub$. Покажем, что $a\mathcal{R}d$ и $d\mathcal{L}b$. $a\mathcal{L}c \Rightarrow ay\mathcal{L}cy \Rightarrow d\mathcal{L}b$. $c\mathcal{R}b \Rightarrow uc\mathcal{R}ub \Rightarrow a\mathcal{R}d$. Получили, что $a\mathcal{R}\mathcal{L}b$, т.е. $\mathcal{L}\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}\mathcal{L}$. Аналогично получаем обратное включение. Таким образом, $\mathcal{L}\mathcal{R} = \mathcal{R}\mathcal{L}$. \square

Ясно, что $\mathcal{L} \subset \mathcal{D}$ и $\mathcal{R} \subset \mathcal{D}$. Покажем, что \mathcal{D} является отношением эквивалентности:

1. Рефлексивность – очевидно.
2. Симметричность – сразу следует из того, что $\mathcal{L}\mathcal{R} = \mathcal{R}\mathcal{L}$.
3. Транзитивность – пусть $a\mathcal{D}b$, $b\mathcal{D}c$, тогда $a\mathcal{L}x\mathcal{R}b\mathcal{L}y\mathcal{R}c$, $x\mathcal{R}\mathcal{L}y \Rightarrow x\mathcal{L}\mathcal{R}y$, т.е. $x\mathcal{L}z\mathcal{R}y$; $a\mathcal{L}z$, $z\mathcal{R}c$, тогда $a\mathcal{L}\mathcal{R}c$.

Таким образом, имеет место следующая диаграмма:




Рис. 2.1: Включения между отношениями Грина

2.2 Пример: отношения Грина в моноиде преобразований

Пусть X – множество. Через T_X обозначим моноид всех преобразований множества X . Для $\alpha \in T_X$ через $\text{Im } \alpha$ обозначается *образ* α , т.е. множество

$$\{y \in X \mid (\exists x \in X) y = x\alpha\},$$

а через $\ker \alpha$ обозначается *ядро* α , т.е. разбиение множества X , при котором элементы $x, y \in X$ принадлежат одному классу тогда и только тогда, когда $x\alpha = y\alpha$. Заметим, что мощность множества классов разбиения $\ker \alpha$ (обозначаемая $|\ker \alpha|$) равно мощности $|\text{Im } \alpha|$ множества $\text{Im } \alpha$.

Предложение 2.2.1. *Для любых $\alpha, \beta \in T_X$ имеем:*

1. $\alpha \leq_{\mathcal{L}} \beta \iff \text{Im } \alpha \subseteq \text{Im } \beta$;
2. $\alpha \leq_{\mathcal{R}} \beta \iff \ker \alpha \supseteq \ker \beta$;
3. $\alpha \leq_{\mathcal{J}} \beta \iff |\text{Im } \alpha| \leq |\text{Im } \beta|$.

Доказательство. (1) Если $\alpha \leq_{\mathcal{L}} \beta$, то существует такое преобразование $\gamma \in T_X$, что $\alpha = \gamma\beta$. Тогда $\text{Im } \alpha = \text{Im } \gamma\beta = (\text{Im } \gamma)\beta \subseteq \text{Im } \beta$.

Обратно, если $\text{Im } \alpha \subseteq \text{Im } \beta$, то для каждого $x \in X$ существует такой $y \in X$, что $x\alpha = y\beta$. Рассмотрим отображение γ , сопоставляющее каждому x один из таких y . Тогда $\alpha = \gamma\beta$.

(2) Если $\alpha \leq_{\mathcal{R}} \beta$, то существует такое преобразование $\gamma \in T_X$, что $\alpha = \beta\gamma$.

Пусть $(x, y) \in \ker \beta$, т.е. $x\beta = y\beta$. Тогда $x\alpha = x\beta\gamma = y\beta\gamma = y\alpha$. Это значит, что $(x, y) \in \ker \alpha$.

Обратно, если $\ker \alpha \supseteq \ker \beta$, то соответствие $\gamma = \beta^{-1}\alpha$ является однозначным отображением и потому принадлежит T_X . Ясно, что $\alpha = \beta\gamma$.

(3) Если $\alpha \leq_{\mathcal{J}} \beta$, то существуют такие преобразования $\gamma, \delta \in T_X$, что $\alpha = \gamma\beta\delta$. Отсюда немедленно получаем, что $|\text{Im } \alpha| \leq |\text{Im } \beta|$.

Обратно, рассмотрим отображение $\varepsilon : X \rightarrow X$, которое каждому классу $\ker \alpha$ сопоставляет элемент из $\text{Im } \beta$ так, что разным классам соответствуют разные элементы. Поскольку $|\ker \alpha| = |\text{Im } \alpha| \leq |\text{Im } \beta|$, то организовать такое отображение возможно.

Так как $\ker \varepsilon = \ker \alpha$, по пункту (2) имеем $\varepsilon \mathcal{R} \alpha$. Далее, $\text{Im } \varepsilon \subseteq \text{Im } \beta$, поэтому по пункту (1) имеем $\varepsilon \leq_{\mathcal{L}} \beta$. Отсюда $\alpha \leq_{\mathcal{L}} \beta$ и потому $\alpha \leq_{\mathcal{J}} \beta$. \square

Отметим, что из доказательства пункта (3) вытекает, что в моноиде T_X отношения \mathcal{D} и \mathcal{J} совпадают.

Следствие 2.2.1. *Для любых $\alpha, \beta \in T_X$ имеем:*

1. $\alpha \mathcal{L} \beta \iff \text{Im } \alpha = \text{Im } \beta$;
2. $\alpha \mathcal{R} \beta \iff \ker \alpha = \ker \beta$;
3. $\alpha \mathcal{J} \beta \iff \alpha \mathcal{D} \beta \iff |\text{Im } \alpha| = |\text{Im } \beta|$.

2.3 Лемма Грина

Пусть $a \in S$, договоримся обозначать

\mathcal{R} -класс, содержащий a , через R_a ;
 \mathcal{L} -класс, содержащий a , через L_a ;
 \mathcal{H} -класс, содержащий a , через H_a ;
 \mathcal{D} -класс, содержащий a , через D_a .

Заметим, что $H_a = L_a \cap R_a$ для любого a .

Лемма 2.3.1. Пусть L – \mathcal{L} -класс, R – \mathcal{R} -класс. Тогда $R \cap L \neq \emptyset$ тогда и только тогда, когда L и R содержатся в одном \mathcal{D} -классе.

Доказательство. Пусть $a \in L \cap R$. Тогда ясно, что L и R содержатся в D_a .

Обратно, пусть L и R содержатся в \mathcal{D} -классе D . Возьмем произвольные $x \in L$ и $y \in R$. Тогда $x \mathcal{D} y$, т.е. существует такой элемент a , что $x \mathcal{L} a \mathcal{R} y$. Тогда $a \in L \cap R$, откуда $L \cap R \neq \emptyset$. \square

Лемма 2.3.1 подсказывает, что \mathcal{D} -классы удобно мыслить себе как прямоугольные таблицы (по традиции именуемые *egg-box картинками*), в которых строки изображают \mathcal{R} -классы, столбцы – \mathcal{L} -классы, а ячейки – \mathcal{H} -классы.




Рис. 2.2: egg-box картинка

Следующий важный результат показывает, что элементы каждого \mathcal{D} -класса распределены по ячейкам соответствующей egg-box картинки равномерно.

Предложение 2.3.1 (Лемма Грина). Пусть $a\mathcal{R}b$, т. е. существуют $u, v \in S^1$, такие, что $au = b$ и $bv = a$. Рассмотрим отображения $\rho_u : S \rightarrow S$, задаваемое правилом $x\rho_u = xu$, и $\rho_v : S \rightarrow S$, задаваемое правилом $x\rho_v = xv$. Тогда ограничение ρ_u на класс L_a – это биекция L_a на L_b , ограничение ρ_v на класс L_b – обратная к ней биекция, и оба ограничения сохраняют \mathcal{H} -классы.




Рис. 2.3: Иллюстрация к лемме Грина

Доказательство. Возьмем произвольный элемент $x \in L_a$. Из $x \mathcal{L} a$ следует, что $xu \mathcal{L} au = b$, поскольку отношение \mathcal{L} стабильно справа. Следовательно, $L_a\rho_u \subseteq L_b$. Далее, существует элемент $t \in S^1$, такой, что $x = ta$. Имеем

$$x\rho_u\rho_v = xuv = tauv = tbv = ta = x,$$

т. е. ограничение ρ_v на класс L_b – обратное отображение к ограничению ρ_u на класс L_a .

Получается, что ограничение ρ_v на класс L_b отображает L_b на L_a , следовательно, ограничения ρ_u и ρ_v на соответственно L_a на L_b – взаимно обратные биекции. Поскольку $xuv = x$, имеем $x\mathcal{R}xu$, и если $x \mathcal{H} y$, то $xu \mathcal{H} yu$. Обратно, если $xu \mathcal{H} yu$, то $x \mathcal{H} y$ \square

В качестве примера рассмотрим \mathcal{D} -строение моноида T_3 всех преобразований 3-элементного множества $\{1, 2, 3\}$. Согласно доказанному в §2.2, у него ровно три \mathcal{D} -класса: класс D_3 всех преобразований с 3-элементным образом, класс D_2 всех преобразований с 2-элементным образом и класс D_1 всех преобразований с 1-элементным образом. Ясно, что преобразование 3-элементного множества, образ которого 3-элементен, есть не что иное как перестановка этого множества. Таким образом, класс D_3 состоит из 6 перестановок исходного множества. Класс D_1 состоит из трех константных преобразований. Интереснее всего устроен класс D_2 . Его egg-box картинка показана ниже.

	$\{1, 2\}$	$\{1, 3\}$	$\{2, 3\}$
1 23	$(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{smallmatrix})$	$(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{smallmatrix})$	$(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \end{smallmatrix})$
2 13	$(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{smallmatrix})$	$(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \end{smallmatrix})$	$(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \end{smallmatrix})$
3 12	$(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{smallmatrix})$	$(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{smallmatrix})$	$(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{smallmatrix})$

Таблица 2.1: \mathcal{D} -класс моноида T_3 , состоящий из всех преобразований с 2-элементным образом. Над каждым \mathcal{L} -классом показано параметризующее его 2-элементное подмножество, а левее каждого \mathcal{R} -класса – параметризующее его разбиение.

2.4 Роль идемпотентов

Элемент e называется *идемпотентом*, если $e^2 = e$.

Лемма 2.4.1. *В конечной полугруппе для любого элемента, найдется его степень, которая является идемпотентом.*

Доказательство. Пусть S – конечная полугруппа, $a \in S$, рассмотрим элементы a, a^2, a^3, \dots . Найдутся такие n и k , что $a^n = a^{n+k}$. Рассмотрим a^{nk} . Имеем $(a^{nk})^2 = a^{2nk} = a^{nk+nk} = a^{nk}$. Следовательно, nk – искомая степень. \square

Упражнение 2.4.1. *Для данного элемента полугруппы найти наименьшую степень, в которой он является идемпотентом.*

Упражнение 2.4.2. *Пусть полугруппа S имеет порядок n . Доказать, что для любого $a \in S$ элемент $a^{n!}$ является идемпотентом.*

Предложение 2.4.1. *В конечной полугруппе $\mathcal{D} = \mathcal{J}$.*

Доказательство. Включение $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{J}$ выполняется в любой полугруппе в силу того, что \mathcal{D} – наименьшее отношение эквивалентности, содержащее отношения \mathcal{R} и \mathcal{L} .

Пусть $a \not\mathcal{J} b$. Найдутся такие $u, v, x, y \in S^1$: $uav = b, xby = a$, отсюда $xuavu = a$. Следовательно для любого k получим $(xu)^k a (vy)^k = a$. Отсюда по лемме найдется такое k , что $(xu)^k = e, (vy)^k = f$, следовательно $ea f = a$, откуда $ea = a$ и $af = a$.

Покажем, что $ua \mathcal{L} a$. Ясно, что $ua \in S^1 a$. Обратно, $a = ea = (xu)^k a = (xu)^{k-1} x \cdot ua \in S^1 ua$. Аналогично $a \mathcal{R} av$. Получаем $ua \mathcal{R} uav = b$ и $a \mathcal{L} ua \mathcal{R} b$, т.е. $a \mathcal{L} \mathcal{R} b$ и $a \mathcal{D} b$ \square

Теперь мы снова рассматриваем произвольные полугруппы.

Предложение 2.4.2 (Теорема Миллера-Клиффорда). *Пусть $a, b \in S$, тогда $ab \in R_a \cap L_b$ тогда и только тогда, когда пересечение $R_b \cap L_a$ содержит идемпотент.*




Рис. 2.4: Иллюстрация к теореме Миллера–Клиффорда

Доказательство. \Rightarrow Если $ab \in R_a \cap L_b$, то по лемме Грина $\rho_b|_{L_a}$ – биекция L_a на L_b . Пусть $e \in R_b \cap L_a$ – такой элемент, что $e\rho_b = eb = b$. Тогда $e\mathcal{R}b$, в частности, $e = bu$ для некоторого $u \in S^1$. Имеем $e^2 = e(bu) = (eb)u = bu = e$, т. е. e – идемпотент.

\Leftarrow Пусть e – идемпотент из $R_b \cap L_a$. Из $e\mathcal{R}b$ следует, что $eb = b$, а из $e\mathcal{L}a$ следует, что $ae = a$. Умножив соотношение $e\mathcal{R}b$ слева на a , получим $a = ae\mathcal{R}ab$. Аналогично, умножив соотношение $e\mathcal{L}a$ справа на b , получим $b = eb\mathcal{R}ab$. Следовательно $ab \in R_a \cap L_b$. \square

Следствие 2.4.1. Пусть H – \mathcal{H} -класс, тогда следующие условия эквивалентны:

- (1) H содержит идемпотент;
- (2) существуют $a, b \in H$, такие, что $ab \in H$;
- (3) H – группа.

Доказательство. Импликации (1) \Rightarrow (2) и (3) \Rightarrow (1) очевидны.

(2) \Rightarrow (3) Имеем $H = R_a \cap L_b = R_b \cap L_a$. По теореме Миллера–Клиффорда в H найдется идемпотент e . Применяя ту же теорему в обратную сторону, заключаем, что для любых $g, h \in H$ произведение gh принадлежит H , т. е. H – полугруппа. Для любого $h \in H$ отображение $\rho_h|_H$ – биекция H на H . Отсюда, в частности, следует, что $ge = g$ для любого $g \in H$. В силу симметричных рассуждений $eg = g$ для любого $g \in H$, т. е. e – единица в H . Наконец, из того, что $\rho_h|_H$ – биекция H на H , следует, что для любого $h \in H$ существует элемент h' , такой, что $h'h = e$. Следовательно H – группа. \square

Заметим, что если H – группа, то H – максимальная подгруппа. Действительно, если G – какая-то подгруппа полугруппы S , то любые два элемента $g, h \in G$ делят друг друга и справа, и слева: $g = h \cdot h^{-1}g$, $h = g \cdot g^{-1}h$ и аналогично слева. Поэтому G содержится в некотором \mathcal{H} -классе H . Поскольку H

содержит идемпотент (а именно, единицу подгруппы G), по только что доказанному следствию H есть подгруппа. Итак, каждая подгруппа полугруппы содержится ровно в одной максимальной подгруппе, а именно, в \mathcal{H} -классе единицы этой подгруппы.

Предложение 2.4.3. *Любые две максимальные подгруппы внутри одного \mathcal{D} -класса изоморфны.*

Доказательство. Пусть H_1 и H_2 – две такие подгруппы. По следствию из теоремы Миллера-Клиффорда существуют идемпотенты e и f такие, что $H_1 = H_e$ и $H_2 = H_f$. Поскольку все происходит внутри одного \mathcal{D} -класса, имеем $e \mathcal{D} f$. Таким образом, $e \mathcal{R} a \mathcal{L} f$ для некоторого $a \in S$. Из того, что $a \mathcal{L} f$, получаем, что существует элемент $a' \in S^1$, для которого $f = a'a$.

На H_e рассмотрим отображение, определенное правилом $x \mapsto a'xa$. Из леммы Грина и утверждения, двойственного к ней, следует, что это отображение есть биекция H_e на H_f . Осталось проверить, что это отображение является гомоморфизмом.

Заметим, что $aa'a = af = a$. Отсюда $(aa')(aa') = (aa'a)a' = aa'$, т.е. aa' — идемпотент из R_a .

Для произвольных $x, y \in H_e$, поскольку $(aa')y = y$, получаем

$$(a'xa)(a'ya) = a'x(aa'y)a = a'xya,$$

что и показывает, что отображение $x \mapsto a'xa$ есть гомоморфизм. \square

Элемент $a \in S$ называется *регулярным*, если существует такой $x \in S$, что $axa = a$. Класс отношения Грина называется *регулярным*, если все его элементы регулярны.

Предложение 2.4.4. *Пусть D – некоторый \mathcal{D} -класс. Следующие условия эквивалентны:*

- (1) D – регулярный \mathcal{D} -класс;
- (2) в D есть регулярный элемент;
- (3) каждый \mathcal{R} -класс внутри D содержит идемпотент;
- (4) каждый \mathcal{L} -класс внутри D содержит идемпотент;
- (5) в D есть идемпотент;
- (6) существуют такие $x, y \in D$, что $xy \in D$.

Доказательство. Эквивалентность условий (1)–(5) вытекает из следующей леммы и двойственного ей утверждения:

Лемма 2.4.2. *\mathcal{R} -класс регулярен тогда и только тогда, когда он содержит идемпотент.*

Доказательство. Пусть $a \mathcal{R} e$, где e — идемпотент. Тогда существует такой элемент $u \in S^1$, что $e = au$. Имеем следующую цепочку равенств: $a = ea = e^2a = (au)ea = a(ue)a$. Поскольку $ue \in S$, видим, что элемент a регулярен.

Обратно, если $axa = a$ для некоторого $x \in S$, то ax — идемпотент, лежащий в R_a . \square

Очевидно, что (5) \Rightarrow (6), а импликация (6) \Rightarrow (5) следует из теоремы Миллера-Клиффорда. \square

2.5 Алгоритм вычисления регулярных \mathcal{D} -классов в конечных полугруппах преобразований

Предложение 2.5.1. *Пусть S — подполугруппа в T_X и $\alpha, \beta \in S$. Тогда:*

- (1) *Если $\alpha \leq_{\mathcal{R}} \beta$, то $\ker \alpha \supseteq \ker \beta$ и если $\alpha \mathcal{R} \beta$, то $\ker \alpha = \ker \beta$.*
- (2) *Если $\alpha \leq_{\mathcal{L}} \beta$, то $\text{Im } \alpha \subseteq \text{Im } \beta$ и если $\alpha \mathcal{L} \beta$, то $\text{Im } \alpha = \text{Im } \beta$.*
- (3) *Если $\alpha \leq_{\mathcal{J}} \beta$, то $|\text{Im } \alpha| \leq |\text{Im } \beta|$ и если $\alpha \mathcal{J} \beta$, то $|\text{Im } \alpha| = |\text{Im } \beta|$.*

Это предложение является простым следствием описания отношений Грина в T_X . Отметим, что обратные импликации в общем случае (т.е. для произвольной подполугруппы S) неверны, хотя они верны для T_X .

Пусть Y — подмножество множества X , а π — разбиение X . Говорят, что Y — *трансверсаль* разбиения π , если каждый π -класс содержит ровно один элемент из Y .

Предложение 2.5.2. *Пусть X — конечное множество и S — подполугруппа в T_X . Элемент $\alpha \in S$ принадлежит некоторой подгруппе в S тогда и только тогда, когда $\text{Im } \alpha$ есть трансверсаль разбиения $\ker \alpha$.*

Доказательство. Необходимость. Пусть $\alpha \in S$ лежит в некоторой подгруппе, тогда $\alpha^n = \alpha$ для некоторого n . Поэтому $\alpha|_{\text{Im } \alpha}$ — биекция (перестановка).

Пусть K — произвольный класс разбиения $\ker \alpha$. Если $|K \cap \text{Im } \alpha| \geq 2$, то по крайней мере два элемента из $\text{Im } \alpha$ склеиваются под действием α , что невозможно, поскольку α — биекция. Значит, $|K \cap \text{Im } \alpha| \leq 1$ для любого K . Если предположить, что для некоторого K выполняется $K \cap \text{Im } \alpha = \emptyset$, то

$$|\text{Im } \alpha| = \sum_{K \in \ker \alpha} |K \cap \text{Im } \alpha| < |\ker \alpha|,$$

что также невозможно, поскольку $|\text{Im } \alpha| = |\ker \alpha|$.

Достаточность. Если $\text{Im } \alpha$ – трансверсаль в $\ker \alpha$, то $\alpha|_{\text{Im } \alpha}$ – перестановка, тогда существует n такое, что $\alpha^n = \alpha$. Отсюда следует, в частности, что $\alpha^2 \mathcal{H} \alpha$, а значит, \mathcal{H} -класс элемента α является подгруппой, поскольку содержит идемпотент. \square

Изложим теперь алгоритм построения регулярных \mathcal{D} -классов конечной полугруппы преобразований.

0. Находим групповой элемент $x \in S$.

1. Вычисляем образы $\text{Im } xr$ для всех $r \in S^1$ такие, что $|\text{Im } xr| = |\text{Im } x|$. Для каждого такого образа I сохраним такое r , что $I = \text{Im } xr$.

2. Параллельно вычисляем все такие преобразования xr ($r \in S^1$), что $\text{Im } xr = \text{Im } x$. Из этих преобразований состоит \mathcal{H} -класс H_x .

3. Вычисляем все разбиения вида $\ker sx$ ($s \in S^1$), такие, что $|\ker sx| = |\ker x|$. Для каждого такого разбиения сохраняем значение s , при котором оно получается.

4. Среди образов, построенных на шаге 1, сохраняем только те, которые служат трансверсальными для каких-то из разбиений, построенных на шаге 3, а среди разбиений, построенных на шаге 3, сохраняем только те, для которых хотя бы одно из множеств, построенных на шаге 1, является трансверсалью. Получим набор множеств $I_1 (= \text{Im } x), \dots, I_k$ с соответствующими элементами $r_1 (= 1), \dots, r_k \in S^1$ и набор разбиений $\pi_1 (= \ker x), \dots, \pi_\ell$ с соответствующими элементами $s_1 (= 1), \dots, s_\ell \in S^1$. Тогда \mathcal{D} -класс элемента x состоит в точности из элементов вида $s_i h r_j$, где h пробегает H_x .

	$\text{Im } x$	\dots	$\text{Im } x r_j$	\dots	$\text{Im } x r_k$
$\ker x$	H_x				
\dots					
$\ker s_i x$			H_{ij}		
\dots					
$\ker s_\ell x$					

Для обоснования алгоритма нужна следующая лемма. В ее формулировке участвуют отношения Грина \mathcal{R} и \mathcal{L} в полугруппе T и ее подполугруппе S . Будем с помощью верхних индексов T или S указывать, в какой полугруппе рассматривается соответствующее отношение. Аналогичное соглашение используется для классов отношений Грина.

Лемма 2.5.1 (о четвертом угле). Пусть S – подполугруппа конечной полугруппы T , $x \in S$, $a, b \in S^1$, $e = e^2 \in T$. Если

$$e \mathcal{R}^T b x \mathcal{L}^T x \mathcal{R}^T x a \mathcal{L}^T e,$$

то $e \in S$ и

$$e \mathcal{R}^S b x \mathcal{L}^S x \mathcal{R}^S x a \mathcal{L}^S e.$$

Доказательство. Пересечение $L_{xa}^T \cap R_{bx}^T$ содержит идемпотент (а именно, e). По теореме Миллера-Клиффорда имеем

$$xabx \in L_{bx}^T \cap R_{xa}^T = H_x^T,$$

следовательно, по лемме Грина $\rho_{abx}|_{H_x^T}$ – биекция, а значит, существует k такое, что ρ_{abx}^k – тождественная перестановка. Отсюда $x(abx)^k = x$, а потому $xa \mathcal{R}^S x \mathcal{L}^S bx$. Так как $xabx \in L_{bx}^S \cap R_{xa}^S$, пересечение $L_{xa}^S \cap R_{bx}^S$ содержит идемпотент по теореме Миллера-Клиффорда. Ясно, что $L_{xa}^S \cap R_{bx}^S \subseteq L_{xa}^T \cap R_{bx}^T$, а e – единственный идемпотент в $L_{xa}^T \cap R_{bx}^T$. Итак, $e \in L_{xa}^S \cap R_{bx}^S$. \square

Займемся обоснованием алгоритма, т.е. докажем утверждения, сформулированные в его описании (они выделены курсивом).

Пусть h – произвольный элемент из H_x . Рассмотрим элемент hr такой, что $\text{Im } hr \in \{I_1(=\text{Im } x), \dots, I_k\}$. Тогда среди разбиений $\pi_1(=\ker x), \dots, \pi_\ell$ найдется такое разбиение $\pi = \ker sh$, для которого $\text{Im } hr$ является трансверсалью. Рассмотрим преобразование $e \in T_X$, которое переводит каждый класс K разбиения $\pi = \ker sh$ в единственный элемент множества $K \cap \text{Im } hr$. Тогда e – идемпотент в $T = T_X$ такой, что $\ker e = \ker sh$ и $\text{Im } e = \text{Im } hr$, откуда $e \mathcal{R}^T hr$ и $e \mathcal{L}^T sh$. Тогда по лемме о четвертом угле $e \in S$ и

$$e \mathcal{R}^S sh \mathcal{L}^S h \mathcal{R}^S hr \mathcal{L}^S e. \quad (2.1)$$

Возьмем сначала в качестве h исходный элемент x и пусть $r \in S^1$ таково, что $\text{Im } xr = \text{Im } x$. Тогда в роли s можно взять 1, а идемпотент e – это не то иное как единица подгруппы H_x . Из (2.1) заключаем, что $xr \in H_x$. Так как очевидно, что любой элемент из H_x можно представить в виде xr для некоторого $r \in S^1$ такого, что $\text{Im } xr = \text{Im } x$, мы доказали утверждение, сформулированное на шаге 2 алгоритма.

Теперь снова возьмем произвольный элемент $h \in H_x$ и рассмотрим произвольный элемент вида $s_i hr_j$. По построению, существуют такое p , что $\text{Im } hr_j$ является трансверсалью для $\ker s_p h$, и такое q , что $\text{Im } hr_q$ является трансверсалью для $\ker s_i h$. Применяя (2.1) с $r = r_j$ и $s = s_p$ заключаем, что $h \mathcal{R}^S hr_j$, а тот же аргумент, примененный к $r = r_p$ и $s = s_i$, дает $h \mathcal{L}^S s_i h$, откуда $hr_j \mathcal{L}^S s_i hr_j$ (напомним, что отношение \mathcal{L} стабильно справа). Итак, $h \mathcal{R}^S hr_j \mathcal{L}^S s_i hr_j$, т.е. $s_i hr_j$ принадлежит \mathcal{D} -классу элемента x . Обратно, очевидно, что любой элемент из этого \mathcal{D} -класса можно представить в виде $s_i hr_j$ для подходящего $h \in H_x$. Мы доказали утверждение, сформулированное на шаге 4 алгоритма.

	$\text{Im } x$	\dots	$\text{Im } xr_j$	\dots	$\text{Im } xr_q$
$\ker x$	h		hr_j		
\dots					
$\ker s_i x$	$s_i h$		$s_i hr_j$		*
\dots					
$\ker s_p x$			*		

Глава 3

Теорема Саймона

Напомним определение кусочно тестируемого языка.

Определение 3.0.1. Язык над данным конечным алфавитом Σ называется *кусочно тестируемым*, если он может быть получен с помощью конечного числа операций объединения, пересечения и дополнения из языков вида $\Sigma^* a_1 \Sigma^* a_2 \Sigma^* \dots \Sigma^* a_k \Sigma^*$, где $a_i \in \Sigma$.

Данное определение не позволяет эффективно проверять кусочную тестируемость данного регулярного языка (заданного, например, автоматом). Эффективная характеристика класса кусочно тестируемых языков была получена Саймоном. Он доказал, что язык является кусочно тестируемым тогда и только тогда, когда его синтаксический моноид \mathcal{J} -тривиален. Необходимость этого условия доказывается довольно просто. Вся сложность заключается в доказательстве достаточности этого условия. Существуют различные доказательства достаточности, использующие разные техники: оригинальное комбинаторное доказательство Саймона, доказательство Страубинга и Терьена, использующее свойства упорядоченных моноидов, доказательство Альмейды, основывающееся на сложной проконечной топологии, доказательство Хиггинса через полугруппы переходов. В данной главе мы изложим доказательство Климы, основывающееся на комбинаторике слов. Дадим необходимые определения.

Определение 3.0.2. Слово $u = a_1 a_2 \dots a_k \in \Sigma^*$, где $a_1, a_2, \dots, a_k \in \Sigma$, называется *подсловом* слова $v \in \Sigma^*$, если существуют слова $v_0, v_1, \dots, v_k \in \Sigma^*$ такие, что $v = v_0 a_1 v_1 a_2 \dots a_k v_k$.

Например, слово *date* является подсловом слова *derivative*. Легко видеть, что отношение «быть подсловом» на множестве всех слов является отношением частичного порядка. Для обозначения этого отношения будем использовать символ \sqsubseteq : $u \sqsubseteq v$. Для слова $u \in \Sigma^*$ через L_u обозначим язык всех слов, содержащих в качестве подслова слово u : $L_u = \{v \in \Sigma^* \mid u \sqsubseteq v\}$. Если $u = a_1 a_2 \dots a_\ell$, где $a_1, a_2, \dots, a_\ell \in \Sigma$, то

$$L_u = \Sigma^* a_1 \Sigma^* a_2 \Sigma^* \dots \Sigma^* a_\ell \Sigma^*.$$

Для $v \in \Sigma^*$ через $\text{Sub}_k(v)$ обозначим множество всех подслов слова v длины не более k :

$$\text{Sub}_k(v) = \{u \in \Sigma^* \mid u \preceq v, |u| \leq k\}.$$

На множестве всех слов Σ^* зададим отношение *равноподсловности* \sim_k по правилу $u \sim_k v \Leftrightarrow \text{Sub}_k(u) = \text{Sub}_k(v)$. Например, $abbac \sim_1 cba$, поскольку оба этих слова содержат одинаковые буквы, и $ababab \sim_3 bababa$, поскольку оба слова содержат все подслова длины не более 3. Очевидно, \sim_k является *конгруэнцией* на Σ^* , т.е. отношением эквивалентности, для которого справедлива импликация $u \sim_k v \Rightarrow wu \sim_k wv$, $uw \sim_k vw$ для любых слов $u, v, w \in \Sigma^*$.

Для регулярного языка $L \subseteq \Sigma^*$ определим отношение \sim_L : для любых слов $u, v \in \Sigma^*$

$$u \sim_L v \Leftrightarrow (\forall x, y \in \Sigma^*)(xuy \in L \Leftrightarrow xvy \in L).$$

Легко видеть, что отношение \sim_L является конгруэнцией на Σ^* . Это отношение называется *синтаксической конгруэнцией* языка L , а соответствующий фактор-моноид Σ^* / \sim_L называется *синтаксическим моноидом* языка L . Одним из базовых утверждений алгебраической теории рациональных языков является утверждение о том, что моноид Σ^* / \sim_L изоморфен моноиду переходов минимального автомата языка L . В частности, моноид Σ^* / \sim_L конечен, а значит, конгруэнция \sim_L имеет конечный индекс. Кроме того, как легко заметить, язык L является объединением некоторых классов разбиения, заданного эквивалентностью \sim_L .

Определение 3.0.3. Конгруэнция \sim на Σ^* называется \mathcal{J} -тривиальной, если фактор-моноид Σ^* / \sim \mathcal{J} -тривиален.

Упражнение 3.0.1. Доказать, что \mathcal{J} -тривиальность конгруэнции \sim на Σ^* эквивалентна следующему условию:

$$w_1 w_2 u w_3 w_4 \sim u \Rightarrow w_2 u w_3 \sim u$$

для любых слов $u, w_1, w_2, w_3, w_4 \in \Sigma^*$.

В рассматриваемом в этой главе доказательстве теоремы Саймона удобно пользоваться эквивалентным определением кусочно тестируемого языка. Это определение можно дать, благодаря следующей лемме.

Лемма 3.0.2. Пусть L – регулярный язык над алфавитом Σ . Следующие условия эквивалентны.

- (1) Существует натуральное число k такое, что $\sim_k \subseteq \sim_L$.
- (2) Язык L кусочно тестируем.

Доказательство. Если $\sim_k \subseteq \sim_L$ для некоторого натурального k , то каждый класс разбиения Σ^*/\sim_L является объединением классов разбиения Σ^*/\sim_k . Поскольку L является объединением классов разбиения Σ^*/\sim_L , достаточно показать, что каждый класс разбиения Σ^*/\sim_k может быть получен из языков вида L_u при помощи конечного числа операций объединения, пересечения и дополнения. Зафиксируем $v \in \Sigma^*$. Обозначим через $x \sim_k$ класс эквивалентности слова v , т.е. $v \sim_k = \{w \in \Sigma^* \mid w \sim_k v\}$. Непосредственно проверяется, что

$$v \sim_k = \bigcap_{u \in \text{Sub}_k(v)} L_u \cap \bigcap_{u \notin \text{Sub}_k(v), |u| \leq k} \overline{L}_u.$$

В обратную сторону, пусть язык L кусочно тестируем, т.е. представляется в виде конечного объединения конечных пересечений языков вида L_u и их дополнений. Пусть k – такое натуральное число, что $|u| \leq k$ для всех слов u , использованных в представлении языка L . Докажем, что $\sim_k \subseteq \sim_L$. Итак, пусть $v, w \in \Sigma^*$ и $v \sim_k w$, т.е. $\text{Sub}_k(v) = \text{Sub}_k(w)$. Рассмотрим произвольные слова $x, y \in \Sigma^*$ такие, что $xvy \in L$. Докажем, что $xwy \in L$. Без ограничения общности можно считать, что

$$xvy \in K = L_{u_1} \cap L_{u_2} \cap \dots \cap L_{u_m} \cap \overline{L}_{v_1} \cap \overline{L}_{v_2} \cap \dots \cap \overline{L}_{v_n},$$

где K – один из членов объединения в представлении языка L . Длина каждого из слов $u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, v_2, \dots, v_n$ меньше k . Для каждого $i = 1, \dots, m$ имеем $xvy \in L_{u_i}$, а для каждого $j = 1, \dots, n$ слово $xvy \notin L_{v_j}$. Для каждого $i = 1, \dots, m$ по определению языка L_{u_i} имеем $u_i \trianglelefteq xvy$. Поскольку $\text{Sub}_k(v) = \text{Sub}_k(w)$, получаем $u_i \trianglelefteq xwy$ для каждого $i = 1, \dots, m$. Следовательно, $xwy \in L_{u_i}$ для каждого $i = 1, \dots, m$. Далее $xwy \notin L_{v_j}$ для каждого $j = 1, \dots, n$, поскольку $xwy \in L_{v_j}$ влечет $xvy \in L_{v_j}$, что неверно. В итоге получаем, что слово $xwy \in K$, а следовательно, и $xwy \in L$. Поменяв местами слова v и w , мы получим доказательство обратной импликации $xwy \in L \Rightarrow xvy \in L$. \square

Теорема 3.0.1 (Саймон). Пусть Σ – конечный алфавит. Регулярный язык L над алфавитом Σ кусочно тестируем тогда и только тогда, когда конгруэнция \sim_L на Σ^* \mathcal{J} -тривиальна.

Доказательство. Необходимость. Пусть язык L кусочно тестируем. По лемме 3.0.2 это означает, что $\sim_k \subseteq \sim_L$ для некоторого k . Рассмотрим слова $u, w_1, w_2, w_3, w_4 \in \Sigma^*$ такие, что $w_1 w_2 u w_3 w_4 \sim_L u$. Поскольку \sim_L – конгруэнция на Σ^* , выполняется

$$(w_1 w_2)^2 u (w_3 w_4)^2 \sim_L w_1 w_2 u w_3 w_4 \sim_L u.$$

Обозначим $u_n = (w_1 w_2)^n u (w_3 w_4)^n$. Индукцией по n легко доказать, что $u_n \sim_L u$ для любого натурального n . Ясно, что $u \trianglelefteq u_1 \trianglelefteq u_2 \trianglelefteq \dots$, следовательно, $\text{Sub}_k(u) \subseteq \text{Sub}_k(u_1) \subseteq \text{Sub}_k(u_2) \subseteq \dots$. Поскольку существует

лишь конечное число различных множеств вида $\text{Sub}_k(v)$, $v \in \Sigma^*$, мы видим, что $\text{Sub}_k(u_n) = \text{Sub}_k(u_{n'})$ для некоторых $n < n'$. Тогда включения $\text{Sub}_k(u_n) \subseteq \text{Sub}_k(w_2 u_n w_3) \subseteq \text{Sub}_k(u_{n'})$ превращаются в равенства. Таким образом, $\text{Sub}_k(u_n) = \text{Sub}_k(w_2 u_n w_3)$, а это означает, что $u_n \sim_k w_2 u_n w_3$. Поскольку $u_n \sim_L u$ и $\sim_k \subseteq \sim_L$, получаем, что $u \sim_L w_2 u w_3$. Следовательно, по упражнению 3.0.1 конгруэнция \sim_L \mathcal{J} -тривиальна.

Достаточность. Предположим, что регулярный язык $L \subseteq \Sigma^*$ таков, что конгруэнция \sim_L \mathcal{J} -тривиальна. Пусть m – индекс этой конгруэнции. Мы докажем, что $\sim_k \subseteq \sim_L$ для $k = 2m - 2$.

Рассмотрим слова $u = a_1 a_2 \cdots a_p$ и $v = b_1 b_2 \cdots b_q$, где $p, q \geq 0$, $a_1, a_2, \dots, a_p, b_1, b_2, \dots, b_q \in \Sigma$, такие, что $u \sim_k v$. Через u_i обозначим префикс слова u длины i , а именно $u_i = a_1 a_2 \cdots a_i$ для каждого $i = 0, 1, \dots, p$ (отметим, что $u_0 = \varepsilon$). Из \mathcal{J} -тривиальности конгруэнции \sim_L мы получаем, что условие $u_i \sim_L u_j$ для некоторых $i < j$ влечет $u_i \sim_L u_{i'}$ для всех $i' = i, i+1, \dots, j$. Назовем индекс $i \in \{1, \dots, p\}$ *синим*, если $u_{i-1} \sim_L u_{i-1} a_i$. Поскольку число классов в разбиении Σ^* / \sim_L равно m , существует не более $m - 1$ синего индекса $i_1 < i_2 < \dots < i_r$ в u , $r \leq m - 1$. Для не синего индекса i выполняется $u_{i-1} \sim_L u_{i-1} a_i$. Таким образом, для синего индекса i_t и произвольного индекса $i \in \{i_t + 1, \dots, i_{t+1} - 1\}$ мы имеем

$$u_{i_t} \sim_L u_{i_t} a_{i_t+1} \sim_L \cdots \sim_L u_{i_t} a_{i_t+1} \cdots a_{i-2} \sim_L u_{i-1} \sim_L u_i.$$

Поскольку \sim_L – конгруэнция и $u_{i_t} \sim_L u_{i-1}$, мы получаем $u_{i_t} a_i \sim_L u_i \sim_L u_{i_t}$. Таким образом, мы можем утверждать следующее.

Факт 1: Пусть u' – подслово слова u , содержащее все вхождения букв на синих позициях (и возможно на других). Тогда $u' \sim_L a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_r} \sim_L u$. \square

Глава 4

Синтаксический моноид и минимальный автомат

4.1 Моноид переходов автомата

Предметный указатель

- автомат-гидра, 5
- итерация, 3
- конгруэнция, 22
 - синтаксическая, 22
- моноид
 - синтаксический, 22
- подслово, 21
- полугруппа, 9
- теорема
 - Клини, 3
- язык
 - беззвездный, 4
 - кусочно тестируемый, 5, 21
 - рациональный, 3

Указатель имен

Саймон (I. Simon), 7

Шютценберже (M. P. Schützenberger), 4