

Datensatzbeschreibung des standortübergreifenden "NUM-Dashboard" der Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) und der Medizininformatik-Initiative (MII) (ehemals Covid-19-Dashboard)

Version: 0.5.6

Inhaltsverzeichnis

Versionsverzeichnis.....	3
Allgemeine Festlegungen	7
Datenlieferungen	8
Implementationshinweise	9
Allgemeine Parameter und Wertebereiche für Datenitems	10
Öffentliche Datenitems	11
Rubrik "Covid-19"	11
Besondere Festlegungen.....	11
Berechnungsmodelle	11
Parameter und Wertebereiche für Datenitems.....	12
Definition öffentlicher Datenitems	13
JSON-Beispiele öffentliche Datenitems	28
Definition nicht-öffentlicher Datenitems	37
JSON-Beispiele nicht-öffentliche Datenitems	38
Rubrik "Influenza"	39
Besondere Festlegungen.....	39
Parameter und Wertebereiche für Datenitems.....	39
Definition öffentlicher Datenitems	40
JSON-Beispiele "Influenza"	48
Rubrik "KinderRadar"	54
Übergreifende Festlegungen "KinderRadar"	54
"Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP)"	54
Fallmanagement und Zielgrößen	54
Parameter und Wertebereiche für Datenitems	56
Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates	59
"Pädiatrie (PÄD)"	71
Parameter und Wertebereiche für Datenitems	71
"Pädiatrie (Fallzahlen)"	71
Parameter und Wertebereiche für Datenitems	71
Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates	72
"Pädiatrie (RSV)"	75
Parameter und Wertebereiche für Datenitems	75
Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates	75
"Pädiatrie (Influenza)"	83
Parameter und Wertebereiche für Datenitems	83
Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates	83
"Pädiatrie (Covid)"	86
Parameter und Wertebereiche für Datenitems	86
Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates	86
"Pädiatrie (Keuchhusten)"	89

Kaufmännische Direktion

**Kaufmännischer Direktor/
Stellv. Vorstandsvorsitzender
Clemens Platzköster**

Tel: +49 (0) 228 287-14040
Fax: +49 (0) 228 287-90 14040
Clemens.Platzkoester@ukbonn.de

**Stabsstelle Medizinisch-
Wissenschaftliche Technologie-
entwicklung und -koordination
(MWTEK)**

**Prof. Dr. med. Sven Zenker
Ärztlicher Leiter**

Tel: +49 (0) 228 287-15126
Fax: +49 (0) 228 287-14115
Sven.Zenker@ukbonn.de

Teamassistentz

Nina Zagel
Tel: +49 (0) 228 287-15586
Fax: +49 (0) 228 287-90 14115
Nina.Zagel@ukbonn.de

Universitätsklinikum Bonn
Venusberg-Campus 1
53127 Bonn

Ihr Weg zu uns
auf dem UKB-Gelände:



8NMVUM

Parameter und Wertebereiche für Datenitems.....	89
Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates	89
Rubrik "Projekt-Dashboards".....	92
Besondere Festlegungen.....	92
Projekt ACRIBIS (ACR).....	92
Parameter und Wertebereiche für Datenitems	92
Definition Datenitems.....	95
JSON-Beispiele	97
Projekt Fachnetzwerk Infektionen (SNID).....	99
Parameter und Wertebereiche für Datenitems	99
Definition Datenitems.....	100
JSON-Beispiele	103
Projekt MII-BC-Erfassung (BCT).....	106
Parameter und Wertebereiche für Datenitems	106
Definition Datenitems.....	106
JSON-Beispiele	108
Templates	110
JSON-Templates öffentliche Dataitems "Covid-19"	110
JSON-Templates nicht-öffentliche Dataitems "Covid-19"	118
JSON-Templates "Influenza"	119
JSON-Templates "KinderRadar".....	125
JSON-Templates "Projekte-Dashboard".....	133

Ersteller: NUM-Dashboard-Team MWTek (UKB)

Versionsverzeichnis

Version	Datum	Änderung
0.1	01.04.2020	Initialer Vorschlag
0.1.1	02.04.2020	Redaktionelle Anpassungen; Fehlerkorrektur: timeline.maxtreatmentlevel um Feld "date" erweitert
0.1.2	07.04.2020	Redaktionelle Anpassungen; Verbesserung der Verständlichkeit der Beschreibungen anhand der intrakonsortiiellen Rückmeldungen, Konkretisierung einiger Beschreibungen durch Beispiele. Zur Verbesserung der Lesbarkeit wurden "SARS-CoV-2-positive Patient*Innen" in "SARS-CoV-2-Patient*Innen" umbenannt. Die Definition wurde um gesetzte lokale Dokumentationsmerkmale ergänzt. cumulative.age, cumulative.inpatient.age, cumulative.outpatient.age: Kohortierung nach Altersgruppen aufgrund konkreter Datenschutzanforderungen.
0.1.3	09.04.2020	Alterskohortierung korrigiert. Diagramme cumulative.maxtreatmentlevel und timeline.maxtreatmentlevel um Parameter "ambulant" ergänzt. Diagramme für die Liegedauer hinzugefügt: cumulative.lengthofstay.hospital und cumulative.lengthofstay.icu Bitte beachten: Aufenthaltsdauer Krankenhaus in Tagen, Aufenthaltsdauer in Stunden!
0.1.4	08.05.2020	- Konkretisierung des für jeden Plot zugrundeliegenden Kollektivs hinzugefügt. - Zusätzlich zum leeren Template ein ausgefülltes Beispiel hinzugefügt - Implementationshinweise ergänzt - neue Plots: cumulative.lengthofstay.hospital.alive, cumulative.lengthofstay.hospital.dead, cumulative.lengthofstay.icu.alive, cumulative.lengthofstay.icu.dead - Spezifikation zur REST-API konkretisiert - Optionale Unterscheidung der Beatmungart nach invasiv und nicht-invasiv Hinweis: Diese Version ist vollständig abwärtskompatibel zu Version 0.1.3 Wenn die vier hinzudefinierten Diagramme und/oder die weitere Ausspezifizierung der Beatmungsart nicht geliefert werden, muss nach

		Ansicht der Autoren keine erneute Freigabe bei den zuständigen Stellen eingeholt werden.
0.1.4a	12.05.2020	• Kleinere redaktionelle Änderungen
0.2	24.08.2021	• Kleinere redaktionelle Änderungen • Angleichung des Versionierungsschemas an die technische Beschreibung des NUM Dashboard Backends • Angaben zum REST-Zugang für Datenlieferungen erweitert und präzisiert.
0.2.1	29.10.2021	• Kleinere redaktionelle Änderungen • Handling vorstationärer Fälle präzisiert • Referenzzeitpunkt Patient*Innen-Alter präzisiert • Handling Verweildauer bei multiplen SARS-CoV-2-Fällen pro Patient*In präzisiert
0.3	07.03.2022	• Neue Parameter und Wertebereiche: - immunestatus - varianttestresults • Neue öffentliche Dataitems zum Immunisierungsstatus: - cumulative.immunestatus.ambulant - timeline.immunestatus.ambulant (neben "ambulant" für alle Versorgungsniveaus definiert) • Neue öffentliche Dataitems: - cumulative.varianttestresults - timeline.varianttestresults • Textliche Umformulierungen in - timeline.tests - timeline.test.positive - timeline.maxtreatmentlevel - timeline.deaths • Gendern von "Patient" • JSON Validierung der Beispiele • Konsolidierung auf englische Schreibweise aller Werte: <i>ambulant</i> > <i>Outpatient</i> <i>Normalstation</i> > <i>Normal_ward</i> <i>ICU_undifferenziert</i> > <i>ICU_undifferentiated</i> <i>ICU_mit_Beatmung</i> > <i>ICU_with_ventilation</i> <i>ICU_mit_ecmo</i> > <i>ICU_with_ecmo</i> <i>Vollständig</i> > <i>Complete</i> <i>Unvollständig</i> > <i>Incomplete</i> <i>Keine</i> > <i>None</i> <i>Unbekannt</i> > <i>Unknown</i> <i>positiv</i> > <i>Positive</i> <i>grenzwertig_Verdacht</i> > <i>Borderline_suspected</i> <i>negativ</i> > <i>Negative</i> <i>maennlich</i> > <i>Male</i> <i>weiblich</i> > <i>Female</i>

		<i>divers > Diverse</i> • Non/invasive Beatmung gestrichen • Update Partner Codex+ • Neue Datenitems zum max. Versorgungsniveau: - <i>current.age.maxtreatmentlevel.outpatient</i> - <i>cumulative.age.maxtreatmentlevel.outpatient</i> und entsprechend für weitere Versorgungsniveaus • "data/treatmentlevels" umbenannt zu "treatmentlevels" • "data/gender" umbenannt zu "gender" • Die Beschreibungen der Parameter, Wertebereiche und Datenitems wurden durchgängig überarbeitet und einander angeglichen • Zwei Hinweise zur datenschutzrechtlichen Überprüfung 1.) aggregierte Daten 2.) weitere WHO Varianten • Einführung nicht-öffentlicher Datenitems - Kreuztabelle "<i>current.treatmentlevel.crosstab</i>",
0.3.1	23.03.22	Richtigstellung im Text des Versionsverzeichnis zur engl. Übersetzung: <i>"ICU_ohne_Beatmung > ICU_with_ventilation"</i> soll heißen <i>"ICU_mit_Beatmung > ICU_with_ventilation"</i>
0.4	11.11.22	• Erweiterung der Provider (UKOWL, Praxen*) • Erweiterung folgender öffentlicher Datenitems um Datensätze aus Hausarztambulanzen einschl. deren Beschreibungen ○ <i>treatmentlevels - outpatientgp</i> ○ <i>cumulative.gp.gender</i> – Kollektiv <i>cumulative.gp</i> ○ <i>cumulative.gp.age</i> – Kollektiv <i>cumulative.gp</i> ○ <i>cumulative.zipcode, timeline.test</i>^{red}, <i>timeline.test.positive</i>: Erweiterung der Beschreibung um hausärztliche, ambulante Fälle ○ <i>cumulative.outpatientgp.age</i> – Kollektiv <i>cumulative.outpatientgp</i> ○ <i>cumulative.outpatientgp.gender</i> – Kollektiv <i>cumulative.outpatientgp</i> ○ <i>cumulative.immunestatus.outpatientgp</i> – Kollektiv <i>cumulative.immunestatus.outpatientgp</i> ○ <i>timeline.immunestatus.outpatientgp</i> – Kollektiv <i>immunestatus.outpatientgp</i> • Überarbeitung der JSON-Templates unter Berücksichtigung der hausärztlichen Dataitems • Datensätze ohne Abhängigkeit zur Hausarztmedizin: ○ „gender“, „immunestatus“
0.5	12.12.22	Einführung neuer Überschriften: Transmission Parameters (wöchentliches update)

		Transmission parameter (weekly update) Parameter zu Behandlungsursachen (de) Parameter related to Causes of Treatment (en) • Neue Parameter und Wertebereiche - current.wardsvisited - current.patientpossiblenosocomialcases - current.patientnosocomialcases - current.predictivediseases - timeline.predictivediseases - current.causehospitalization - timeline.causehospitalization -current.rbmortalityrisk - timeline.rbmortalityrisk - cumulative.rbmortalityrisk.roc - renalreplacementrisk - timeline.renalreplacementrisk - cumulative.renalreplacementrisk.roc - timeline.icubedoccupancy
0.5.1	06.12.2023	Briefkopf angepasst
0.5.2	05.03.2024	Dokumenttitel angepasst auf "NUM-Dashboard" TUM als Standort entfernt Item "current.age.maxtreatmentlevel.outpatient" entfernt Reorganisation des Dokuments „NUM-Dashboard“. Die Unterrubriken „Covid-19-Dashboard“, „KinderRadar“ und „Influenza-Dashboard“ wurden eingeführt. Umstellung auf Kleinschreibungen aller Bezeichner in der Datensatzbeschreibung. In Datenlieferungen kann beliebig Groß/Kleinschreibung verwendet werden. Finale Überarbeitung Rubrik Influenza Finale Formatierungen / Rechtschreibung für Rease-Version Anpassung in Bezug auf Datenitems der Hausarztpraxen Streichung cumulative.gp.gender und cumulative.gp.age Kennzeichnung der nur für Hausarztpraxen relevanten Datenitems
0.5.3	16.04.2024	Die Beschreibung des Datenlieferungsprozesses wurde ergänzt, um die Umsetzung zu erleichtern COT als Standort umbenannt in CTK Kommentierung der Json-Beispiele für öffentliche Datenitems „Covid-19“ und „Influenza“ Kleine redaktionelle Änderungen

0.5.4	22.04.2024	redaktionelle Änderungen
0.5.4	07.05.2024	Angaben zu Versionen harmonisiert item "dashboard_dataset_version"
0.5.4	08.05.2024	Hinzugefügt in Datenitem infl.subtypetestresults für "AB_nosub" (Linie nicht bestimmt/lineage not subtyped)
0.5.4	17.05.2024	Itemname timeline.kiradar.diags.icdcodes renamed to kira.timeline.diags.icdcodes
0.5.4	13.06.2024	Ergänzende Parameterdefinitionen "dashboard_dataset_version", "exporttimestamp", "author"
0.5.4	13.06.2024	Rubrik INFLUENZA: Die Auswertung beginnt ab dem Stichtag 01.09.2022.
0.5.4	21.06.2024	Definition Aufenthaltsdauer genauer spezifiziert für Datenitem kira.cumulative.lengthofstay.disorders
0.5.4	14.09.2024	Re-implementation der KinderRadar Dataitems für Kinder-/Jugendpsychiatrie (KJP) und Paediatric (RSV) Erläuterungen zu LOINC Codes bzgl. Influenza
0.5.4	28.10.2024	Vervollständigung/Restrukturierung Partnerliste (provider)
0.5.4	13.11.2024	Aufbau der Rubrik "Projekt-Dashboards" inkl. "Projekt ACRIbIS"
0.5.4	20.01.2024	Korrektur "Influenza-Tests" in item infl.cumulative.results Korrektur Beispiel/Template kira.rsv.cumulative.diags.lengthofstay
0.5.5	28.01.2026	Einfügen der pre-finalen Rubrik KinderRadar-Dataitems für Kinder-/Jugendpsychiatrie (KJP) und Paediatric (RSV) mit Entwicklungsstand 26.11.2025
0.5.5	04.02.2026	Projekt SNID und MII-BC-Erfassung eingefügt
0.5.6	09.04.2026	Beschreibung der PLZ-Gebietsaggregation in öffentlicher Darstellung ergänzt. Darstellungsbeschreibung in der Datenitembeschreibung in der Rubrik KinderRadar gestrichen.

* Die Datenbereitstellung für Hausarztpraxennetzwerke erfolgt in der Regel auf dem Wege der Voraggregation der praxisbeziehbaren Daten und gesammelt durch das Institut für Hausarztmedizin des UKB

Die vorliegende Datensatzbeschreibung wurde im Hinblick auf eine schnelle und pragmatische Realisierbarkeit erstellt. Optimierungen im Hinblick u.a. auf Standardkonformität sollten im Verlauf erfolgen.

Allgemeine Festlegungen

- Die Datensatzbeschreibung ist versioniert. Einzelitems werden eindeutig durch das Tupel {dashboard_dataset_version, itemname} identifiziert, analoges gilt für die zu

einem itemname gehörigen Wertebereiche, die ebenfalls von Version zu Version veränderlich sein können.

- Aus Datenschutzgründen sollen alle nicht voraggregierten Teildatensätze (z.B. Liste des Alters in Jahren der Patient*Innen) beim Export in eine aufsteigende Reihenfolge gebracht werden, um ein Matching der Teildatensätze über die Exportreihenfolge wirksam zu verhindern.
- Missings (z.B. wenn nicht lieferbar) werden mit "null" gekennzeichnet.
- Zeit- und Datumsangaben werden als "unix time" UTC angegeben (UTC-Sekunden seit 01.01.1970).
- Vorstationäre Fälle sind wie ambulante Fälle zu behandeln
- Es werden ausschließlich Testergebnisse zu Krankheitserregern berücksichtigt, die einen Fallbezug aufweisen, um eine einheitliche Datenbasis zu gewährleisten.
- Die Verweildauer-Berechnung erfolgt gemäß der Definition in §1 Abs.7 der Verordnung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser (KFPV)
- Aus den in diesem Dokument spezifizierten Datenlieferungen können zusätzliche höher aggregierte Darstellungen berechnet, gespeichert und an der Benutzeroberfläche dargestellt werden.
- Die Verwendung der Groß/Kleinschreibung in dieser Datensatzbeschreibung in Bezug auf definierte Parameter, Parameter-Werte, Dataitem-Bezeichner oder in Dataitem verwendete Wertebezeichner erfolgte allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit. Für eine Übergabe der Daten ist die verwendete Groß/Kleinschreibung unerheblich.

Datenlieferungen

- Zu Beginn können die ersten Datenlieferungen per Mail an ddp-support@ukbonn.de erfolgen, sodass die Bedienung der REST-API nicht unmittelbar erfolgen muss und die JSON-Datei in einem manuellen Validierungsschritt auf Konformität mit dieser Datensatzbeschreibung überprüft werden kann.
- Für die Validierung von Datenlieferungen werden im ersten Schritt Datendateien an den Test-Server <https://numdashboard-test.ukbonn.de> geliefert. Nach Validierung durch die Standorte und Abnahme durch das Dashboard-Team erfolgen regelmäßige Datenlieferungen an den öffentlichen Server <https://numdashboard.ukbonn.de>.
- Der Standardweg zur Übertragung der Daten ist eine REST-API, die unter der URL [https://coronadashboard.ukbonn.de/backend/\[Klinik Kürzel\]/put](https://coronadashboard.ukbonn.de/backend/[Klinik Kürzel]/put) (POST) erreichbar ist. Der Username entspricht ebenfalls dem Kürzel der Klinik, wobei beachtet werden muss, dass das Kürzel in der URL komplett in Großbuchstaben geschrieben, der Benutzername hingegen vollständig klein geschrieben werden muss. Die Authentifizierungsart ist "basic", der "content type" "application/json". Die Zugangsdaten werden zentral vergeben und müssen angefragt werden.
- Jede Datenübertragung definiert für den Standort (gemäß Header) den aktuellen Datenbestand vollständig. Alle durch vorgegangene Übertragungen übermittelten Daten werden gelöscht, bzw. für die aus der Datenübertragung resultierende

aktualisierten Darstellungen des Dashboards nicht mehr verwendet. Insofern für den Standort Daten für mehrere Rubriken (Covid, Influenza oder KinderRadar) im Dashboard dargestellt werden sollen, müssen alle diesbezüglichen Daten mit der aktuellen Datenübertragung übergeben werden.

- Für alle Datenlieferungen, die kumulierte Werte übermitteln ("cumulativ") oder Werte in Zeitverläufen übermitteln ("timeline"), ist zu beachten, dass kumulierte Werte auf der Basis aller Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) ermittelt werden bzw. dass Zeitreihen für alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) Werte beinhalten. Der Auswertungsbeginn der Untersuchungen in den Rubriken "Covid-19", "Influenza" und "KinderRadar" differiert und ist siehe unten jeweils für die Rubrik als explizites Datum angegeben.
- Die Gültigkeit der übertragenen Daten ist für jeden Standort insgesamt über alle Rubriken und deren Datenitems hinweg auf eine Zeitspanne von 48 Stunden festgelegt. Die Zeitspanne beginnt mit dem Zeitpunkt der Datenübergabe und endet nach Ablauf von 48 Stunden. Nach Ablauf der Zeitspanne, und falls zwischenzeitlich keine weitere aktualisierende Datenlieferung erfolgte, werden die übergebenen Daten weder in den Drilldown-Ansichten des Standorts angezeigt, noch werden die Daten für Datenvisualisierungen herangezogen, die auf Basis von Daten mehrerer Standorte berechnet werden. In begründeten Ausnahmen können für ausgewählte Datenitems die Zeitspannen angepasst werden.

Implementationshinweise

- Die hier beschriebenen Plots können sämtlich unter <https://numdashboard.ukbonn.de/> angesehen werden.
- Viele Programme haben die Möglichkeit die JSONs auf Validität zu überprüfen. Von dieser Möglichkeit sollte Gebrauch gemacht werden. Ein Online-Validator ist z.B. <https://jsonlint.com/>
- Diagramme, die keinerlei Daten enthalten, sollen in der JSON-Datei nicht modelliert werden, da dies eine unnötige, zusätzliche Fehlerquelle ist.
- Mit einem Programm wie z.B. "Postman" (<https://www.postman.com/>) oder dem Open-Source-Tool "SoapUI" (<https://www.soapui.org/>) kann die REST-API direkt angesprochen und getestet werden.

Allgemeine Parameter und Wertebereiche für Datenitems

Parameter	Wertebereich und Beschreibung
provider	Charité Universitätsmedizin Berlin LMU Klinikum München Medizinische Hochschule Hannover Medizinische Universität Lausitz-Carl Thiem Uniklinik RWTH Aachen Universitätsklinikum Augsburg Universitätsklinikum Bielefeld mit Medizinischer Fakultät und UK OWL Universitätsklinikum Bonn Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum Universitätsklinikum des Saarlandes Universitätsklinikum Düsseldorf Universitätsklinikum Erlangen Universitätsklinikum Essen Universitätsklinikum Frankfurt Universitätsklinikum Freiburg Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Marburg Universitätsklinikum Halle Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Universitätsklinikum Heidelberg Universitätsklinikum Jena Universitätsklinikum Köln Universitätsklinikum Leipzig Universitätsklinikum Magdeburg Universitätsklinikum Mannheim Universitätsklinikum Münster Universitätsklinikum Regensburg Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Universitätsklinikum Technische Universität München Universitätsklinikum Tübingen Universitätsklinikum Ulm Universitätsklinikum Würzburg Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Universitätsmedizin Göttingen Universitätsmedizin Greifswald Universitätsmedizin Oldenburg Universitätsmedizin Rostock Hausarztpraxen Allgemeinmedizin
dashboard_dataset_version	Version der Datensatzbeschreibung auf der die Lieferung basiert im Format 0.x.x, z.B. aktuell 0.5.3
exporttimestamp	Zeitpunkt des Exports der Daten aus den Quellsystemen (unix time gemäß UTC)
author	Verantwortlicher Standort für die Datenlieferung, Freitext z.B. siehe oben Parameter "provider" die Bezeichnung
treatmentlevels	„Outpatientgp“- general Practitioner/family medicine (gp), hausärztlicher Patient*in (nicht für Diagramme der Gruppe "current.") "Outpatient" – ambulanter Patient*In, (nicht für Diagramme der Gruppe "current.") "Normal_ward" – stationärer, nicht intensivpflichtiger Patient*In

	"ICU" – Intensivpatient*in ohne Beatmung "ICU_with_ventilation" – Intensivpatient*in mit Beatmung ohne ECMO "ICU_with_ecmo" – Intensivpatient*in mit Beatmung und ECMO "ICU_undifferentiated" – nur falls zwischen Intensivaufenthalten mit/ohne Beatmung bzw. ECMO nicht unterschieden werden kann.
gender	"Male" – männliche Patient*innen "Female" – weibliche Patient*innen "Diverse" – diverse Patient*Innen

Öffentliche Datenitems

Sämtliche öffentliche Datenitems werden in der öffentlichen Ansicht des Dashboards (d.h., ohne Standort-Anmeldung im Frontend) nur in über alle Standorte hinweg aggregierter Form dargestellt. Sämtliche öffentliche Datenitems werden für datenliefernde Standorte nach Anmeldung zusätzlich mit Drilldown-Möglichkeit dargestellt. D.h., dass jeder Standort sämtliche öffentliche Diagramme auch in einer standortbezogenen Fassung für alle beteiligten Standorte einsehen kann.

Postleitzahlen-bezogene Daten werden in der öffentlichen Ansicht vergrößert auf (Land-)Kreise und kreisfreie Städte dargestellt.

Rubrik "Covid-19"

Besondere Festlegungen

- Die Auswertung beginnt ab dem Stichtag 27.01.2020 (Datum des ersten bestätigten Corona-Falls in Deutschland).

Berechnungsmodelle

- „Berliner“ Modell:
Das "Berliner Modell" berechnet auf Grundlage tagesaktueller Kennzahlen des RKI (Anzahl gesichert infizierten SARS-CoV-2 Patient*innen der Intensivstationen) und des DIVI (Intensivbettenbelegung durch SARS-CoV-2 Patient*innen) sowie klinischen Kennzahlen am Standort eine Vorhersage für die Bettenbelegung der Intensivstation für die nächsten sieben Tage.
Modellbeschreibung mathematisch nach Angaben von Herrn Prof. Dr. med. Mario Menk u. Dr. Sebastian Boie, Ph.D., Institut für Medizinische Informatik, Geschäftsbereich IT | Medical Data Science, Charité - Universitätsmedizin Berlin | Campus Charité Mitte:

Datenquelle RKI: tagesaktuelle Anzahl der gesichert infizierten SARS-CoV-2 Patient*innen

Datenquelle DIVI: tagesaktuelle Intensivbettenbelegung durch SARS-CoV-2 Patient*innen.

Datenquellen liefern aktuelle Daten mit einem Tag Verzögerung.

Y(t): SARS-CoV-2-Patient*innen (Erwachsene und Kinder), die sich auf einer Intensivstation befinden und ein Intensivbett belegen zum Tag t

I(t): Anzahl der gesichert infizierten Patient*innen zum Tag t

E(t): Anzahl der Erstaufnahmen auf einer Intensivstation zum Tag t

Das Vorhersage-Modell ist mathematisch beschrieben:

$$Y(t) = Y(t-1) + p_icu_rate * I(t - 8) - p_discharge * E(t - 18)$$

p_discharge = 1 (Annahme: alle vor 18 Tagen erstmalig Intensivpflichtigen Patient*innen werden wieder entlassen)

p_icu_rate: Schätzung aus **E(t)** und **I(t - 8)**, dabei wird für jeden Tag die **p_icu_rate** bestimmt.

Es wird der Median über 30 Tage ermittelt und in die obige Y(t)-Formel eingesetzt. Die obere und untere Grenze der Vorhersage werden ermittelt, indem der Median durch das 1. und 99. Perzentil ersetzt wird.

Für Folgetage wird jeweils t + 1, t + 2, ... t + 7 in die Formel eingesetzt.

Dadurch gibt es jeden Tag (mit neuen Daten vom RKI und vom DIVI) eine neue Vorhersage für die nächsten 7 Tage.

Vereinfachte Beschreibung: Zahl der IntensivPatient*innen heute = Zahl der IntensivPatient*innen gestern plus ein geschätzter Prozentsatz der Infizierten vor 8 Tagen minus aller Intensivverstaufnahmen vor 18 Tagen.

- **“Bonner” Modell:**

Das "Bonner Modell" errechnet aus in der Routineversorgung regelmäßig verfügbaren Parametern täglich einen Score, der für die zukünftige Notwendigkeit des Einsatzes eines extrakorporalen Nierenersatzverfahrens prädiktiv ist. Ziel ist es u.a., durch das Dashboard eine Abschätzung der zukünftigen Ressourcenauslastung durch solche Maßnahmen zu unterstützen.

Erdfelder F, Grigutsch D, Hoefft A, Reider E, Matot I, Zenker S. Dynamic prediction of the need for renal replacement therapy in intensive care unit patients using a simple and robust model. J Clin Monit Comput. 2017;31(1):195-204. doi:10.1007/s10877-015-9814-4

- **“Regensburger” Modell:**

Der dem "Regensburger Modell" zugrundeliegende Algorithmus bestimmt das Mortalitätsrisiko von COVID-19-IntensivPatient*innen des Universitätsklinikum Regensburg. Das Datenset beinhaltete 589 Patient*innen ohne SARS-CoV-2 Infektion aus dem Jahr 2019 und 51 Patient*innen mit SARSCoV-2 Infektion aus dem Jahr 2020. Der Algorithmus besteht aus einem Gradient Boosting Model für die Verarbeitung von punktuellen und niedrig-frequenten Daten und einen Neural Network Autoencoder für die Integration von hochfrequenten Daten.

Stratifizierung des Mortalitätsrisiko von COVID-19 Patient*innen mittels Machine-Learning-Algorithmen.

Reuther J; Fomenko V; Gülow K; Reuther S; Spreiter L; Schmid S; Müller-Schilling M. *Internist* **62** (Suppl 2), 147–202 (2021). <https://doi.org/10.1007/s00108-021-01036-7>

Java Implementierung: <https://github.com/unetiq/codex-ukr-mortality-java>

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

Parameter "Covid-19"	Wertebereich und Beschreibung
infectionstatus	"Positive" - Als SARS-COV-2-Patient*In gilt, wer mindestens • eine dokumentierte Corona-Diagnose ICD-10 U07.1! oder • einen positiven Labornachweis des "SARS-CoV-2"-Virus (aktuell in der Regel RT-PCR) hat oder • ein gesetztes lokales Dokumentationsmerkmal "COVID positiv" (o.ä) hat oder hatte

	"Borderline_suspected" - Als Patient*In mit Verdacht auf SARS-COV-2-Infektion gilt, bei wem eine Corona Diagnose U07.1! V (ambulant) oder U07.2! in ICD-10 codiert wurde und/oder wer ein uneindeutiges/grenzwertiges Labortestergebnis aufweist. "Negative" - Als SARS-COV-2-negativ-Patient*Innen gilt, wer ausschließlich negative Labornachweise oder eine der ICD-10 Diagnosen U07.1A oder U07.2A (ambulant) codiert hat.
immunestatus	Der Immunstatus gemäß der zum Erhebungs- bzw. Dokumentationszeitpunkt aktuell gültigen Definition des Robert-Koch-Institutes, d.h. der Immunstatus kann sich ggf. aus einer Kombination von Genesenen- und Impfstatus ergeben. "Complete" - Vollständige Immunisierung "Incomplete" - Unvollständige Immunisierung "None" - Keine Impfung oder zurückliegende Infektion soweit bekannt "Unknown" - Information zur Immunisierung unbekannt, nicht vorliegend
varianttestresults	Angaben zu Testergebnissen gemäß der übergreifend gültigen WHO Definitionen siehe "Anwendung der SARS-CoV-2 Varianten Nomenklatur der WHO durch das RKI" online auf https://www.rki.de/ . Anzahl positiven Testergebnisse für die WHO-Varianten * "Alpha", "Beta", "Gamma", "Delta", "Omikron", "OtherVOC" (andere VOC-Variante), "NonVOC" (nicht VOC-Variante) * Hinweis für die datenschutzrechtliche Prüfung: Mit der Festlegung neuer Varianten im Verlauf der weiteren Pandemieentwicklung kann die Datensatzbeschreibung und Datenerfassung in Bezug auf dieses Datenitem ohne erneute datenschutzrechtliche Prüfung entsprechend erweitert werden.

Definition öffentlicher Datenitems

Datenitems "Covid-19"	Beschreibung
current.treatmentlevel	Kollektiv: Derzeit in stationärer Behandlung befindliche SARS-CoV-2-Patient*Innen.

	<u>Aktuelles</u> Versorgungsniveau SARS-COV-2-Patient*Innen: Anzahl SARS-COV-2-positiver Patient*Innen auf den in "treatmentlevels" definierten Versorgungsniveaus zum Zeitpunkt des Datenexports. Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl ≥ 0) pro Versorgungsniveau. Beispiel: Patient*In, dessen Beatmung beendet werden konnte, der aber noch auf der Intensivstation liegt, wird hier als "ICU" geführt.
current.maxtreatmentlevel	Kollektiv: Derzeit in stationärer Behandlung befindliche SARS-CoV-2-Patient*Innen. Höchstes bisheriges Versorgungsniveau der <u>aktuell</u> stationären SARS-COV-2-Patient*Innen: Anzahl der zum Exportzeitpunkt aktuell stationären Patient*Innen mit dem bislang am höchsten beanspruchten Versorgungsniveau wie in "treatmentlevels" definiert. Die Rangfolge der Versorgungsniveaus: "Outpatient", "Normal_ward", "ICU_undifferentiated", "ICU", "ICU_with_ventilation", "ICU_with_ecmo" Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl ≥ 0) pro Versorgungsniveau. Beispiel: Ein Patient, der auf der Intensivstation beatmet wurde, nun aber auf Normalstation liegt, wird hier als "ICU_with_ventilation" geführt.
cumulative.results	Kollektiv: SARS-CoV-2-Tests aller Patient*Innen, für die ein mit dem Test zusammenhängender ambulanter, vor-, nach-, teil- oder vollstationärer Behandlungsfall existiert (keine Testergebnisse von externen Auftraggebern, wie z.B. Hausärzten, Gesundheitsämtern etc.). Anzahl SARS-CoV-2-Tests gemäß Einstufung der Testergebnisse in die Kategorien "Positive", "Borderline_suspected", "Negative" Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl ≥ 0)

cumulative.gender	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Anzahlen der SARS-CoV-2-Patient*Innen nach Geschlecht Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl ≥ 0) pro Geschlecht.
cumulative.age	Kollektiv cumulative.age: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Referenzzeitpunkt ist das Alter zum Aufnahmezeitpunkt des ersten SARS-CoV2-Falles eines Patient*In. Lebensalter aller SARS-COV-2-positiver Patient*Innen als aufsteigend sortierte Liste. Die Lebensalter in Altersgruppen wie folgt: 0 falls <20, 20 für 20-24, 25 für 25-29, 30 für 30-34,..., 85 für 85-89, 90 falls ≥ 90, also jeweils das niedrigste Alter der Gruppe. Beispiel: [0, 20, 20, 35, 40, 40, 85, 90]
cumulative.maxtreatmentlevel	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem <u>abgeschlossenen</u> ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Für alle Versorgungsniveaus gemäß "treatmentlevels" werden die Anzahlen aller SARS-COV-2-Patient*Innen angegeben, die auf dem Versorgungsniveau behandelt wurden. Patient*Innen zählen nur einmal in dem maximal genutztem Versorgungsniveau. Die Rangfolge der Versorgungsniveaus: "Outpatient", "Normal_ward", "ICU_undifferentiated", "ICU", "ICU_with_ventilation", "ICU_with_ecmo" Geliefert wird also eine Anzahl (Ganzzahl ≥ 0) pro Versorgungsniveau. Beispiel: Falls der Behandlungsverlauf "Outpatient" -> "Normal_ward" -> "ICU" -> "ICU_with_ventilation" -> "ICU" -> "Normal_ward" ist, dann zählt der Patient in "ICU_with_ventilation"

cumulative.zipcode	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem hausärztlichen, ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Postleitzahlen für alle SARS-COV-2-positive Patient*Innen, an denen diese ansässig sind, als aufsteigend sortierte Liste. Postleitzahlen können demnach mehrfach auftreten. Hinweis: Postleitzahlen wegen einer ggf. führend enthaltenen "0" nicht als Zahlenwert sondern als String (in Anführungszeichen) geführt. Patient*Innen aus dem Ausland werden als Missing("null") geführt.
timeline.tests	Kollektiv: SARS-CoV-2-PCR-Tests aller Patient*Innen, für die ein mit dem Test zusammenhängender hausärztlicher, ambulanter, vor-, nach-, teil- oder vollstationärer Behandlungsfall existiert. (Keine Testergebnisse von externen Auftraggebern, wie z.B. Hausärzten, Gesundheitsämtern etc. für ambulant, vor-, nach-, teil oder vollstationären Behandlungsfall) Es werden die Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) aller PCR-Test gelistet, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr durchgeführt wurden. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.
timeline.test.positive	Kollektiv: SARS-CoV-2-PCR-Tests aller Patient*Innen, für die ein mit dem Test zusammenhängender hausärztlicher, ambulanter, vor-, nach-, teil- oder vollstationärer Behandlungsfall existiert. (Keine Testergebnisse von externen Auftraggebern, wie z.B. Hausärzten, Gesundheitsämtern etc. für ambulant, vor-, nach-, teil oder vollstationären Behandlungsfall) Es werden die Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) der positiven PCR-Tests gelistet, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr durchgeführt wurden.

	Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.
timeline.maxtreatmentlevel	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall Für alle Versorgungsniveaus gemäß "treatmentlevels" werden jeweils Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) von SARS-COV-2-Patient*Innen angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr entsprechend versorgt wurden. Patient*innen werden in dem höchsten an dem jeweiligen Tag genutzten Versorgungsniveau gezählt. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.
current.age.maxtreatmentlevel.normal_ward analog current.age.maxtreatmentlevel.icu_undifferentiated current.age.maxtreatmentlevel.icu current.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ventilation current.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ecmo	Kollektiv: Derzeit in Behandlung befindliche SARS-CoV-2-Patient*Innen. Lebensalter derzeitiger SARS-CoV-2-Patient*Innen Normalstation als höchstes Versorgungsniveau als aufsteigend sortierte Liste. Die Lebensalter in Altersgruppen wie folgt anzugeben: 0 falls <20, 20 für 20-24, 25 für 25-29, 30 für 30-34,..., 85 für 85-89, 90 falls ≥ 90, also jeweils das niedrigste Alter der Gruppe. Beispiel: [0, 20, 20, 35, 40, 40, 85, 90]
cumulative.age.maxtreatmentlevel.outpatient analog: cumulative.age.maxtreatmentlevel.normal_ward cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_undifferentiated cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ventilation cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ecmo	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem <u>abgeschlossenen</u> ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Referenzzeitpunkt ist das Alter zum Aufnahmezeitpunkt des ersten SARS-CoV2-Falles eines Patient*Innen. Lebensalter aller SARS-COV-2- Patient*Innen mit Ambulant als höchstes Versorgungsniveau als aufsteigend sortierte Liste. Die Lebensalter in Altersgruppen wie folgt anzugeben: 0 falls <20, 20 für 20-24, 25 für 25-29, 30 für 30-34,..., 85 für 85-89, 90 falls ≥ 90,

	also jeweils das niedrigste Alter der Gruppe. Beispiel: [0, 20, 20, 35, 40, 40, 85, 90]
cumulative.inpatient.gender	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit mind. einem nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Anzahl stationärer SARS-COV-2-Patient*Innen nach Geschlecht. Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl >= 0) pro Geschlecht.
cumulative.outpatient.age analog: cumulative.outpatientgp.age	Kollektiv cumulative.outpatient: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit mind. einem ambulanten oder vorstationären Behandlungsfall. Referenzzeitpunkt ist das Alter zum Aufnahmezeitpunkt des ersten SARS-CoV2-Falles eines Patient*In. Kollektiv cumulative.outpatientgp: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit mind. einem hausärztlichen Behandlungsfall. Analog: Behandlungsfall Lebensalter aller ambulant versorgter SARS-COV-2-positiver Patient*Innen bis zum Exportzeitpunkt als aufsteigend sortierte Liste. Die Lebensalter in Altersgruppen wie folgt: 0 falls <20, 20 für 20-24, 25 für 25-29, 30 für 30-34,..., 85 für 85-89 , 90 falls >= 90, also jeweils das niedrigste Alter der Gruppe. Beispiel: [0, 20, 20, 35, 40, 40, 85, 90]
cumulative.outpatient.gender analog: cumulative.outpatientgp.gender * *Lieferung nur Hausarztpraxen	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit mind. einem ambulanten oder vorstationären Behandlungsfall. Kollektiv Hausarztpraxen: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit mind. einem hausärztlichen Behandlungsfall. Anzahl für alle ambulant versorgten SARS-COV-2-Patient*Innen nach Geschlecht. Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl >= 0) pro Geschlecht.
cumulative.inpatient.age	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit mind. einem nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Referenzzeitpunkt ist das Alter zum Aufnahmezeitpunkt des ersten SARS-CoV2-Falles eines Patient*In.

	Lebensalter stationärer versorgter SARS-COV-2-positiver Patient*Innen bis zum Exportzeitpunkt als aufsteigend sortierte Liste. Die Lebensalter in Altersgruppen wie folgt: 0 falls <20, 20 für 20-24, 25 für 25-29, 30 für 30-34,..., 85 für 85-89 , 90 falls >= 90, also jeweils das niedrigste Alter der Gruppe. Beispiel: [0, 20, 20, 35, 40, 40, 85, 90]
timeline.deaths	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Es werden die Anzahlen (Ganzzahlen >= 0) von SARS-COV-2-Patient*Innen angegeben, die an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr in stationärer Behandlung verstorben sind. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.
cumulative.lengthofstay.hospital	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit mind. einem <u>abgeschlossenen</u> vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Verweildauer in Tagen im Krankenhaus für alle SARS-CoV-2-Patient*Innen. Sollte Patient*In mehrere SARS-CoV-2-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
cumulative.lengthofstay.hospital.alive	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Verweildauer im Krankenhaus in Tagen für alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einer anderen Entlassart als "Tod". Sollte Patient*In mehrere SARS-CoV-2-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
cumulative.lengthofstay.hospital.dead	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall, die im Krankenhaus verstorben sind. Verweildauer im Krankenhaus in Tagen für alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit der Entlassart

	"Tod" . Sollte Patient*In mehrere SARS-CoV-2-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
cumulative.lengthofstay.icu	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem <u>abgeschlossenen</u> vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Verweildauer auf ICU in Stunden für alle SARS-CoV-2-Patient*Innen (ggf. als Summe aller ICU-Aufenthalte innerhalb des Falls). Sollte Patient*In mehrere SARS-CoV-2-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
cumulative.lengthofstay.icu.alive	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Verweildauer auf ICU in Stunden für alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einer anderen Entlassart als "Tod" haben (ggf. als Summe aller ICU-Aufenthalte innerhalb des Falls). Sollte Patient*In mehrere SARS-CoV-2-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
cumulative.lengthofstay.icu.dead	Kollektiv: Alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall, die im Krankenhaus verstorben sind. Verweildauer auf ICU in Stunden für alle SARS-CoV-2-Patient*Innen mit der Entlassart "Tod" (ggf. als Summe aller ICU-Aufenthalte innerhalb des Falls). Sollte Patient*In mehrere SARS-CoV-2-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
cumulative.immunestatus.outpatient analog: cumulative.immunestatus.outpatientgp * cumulative.immunestatus.normal_ward cumulative.immunestatus.icu_undifferentiated cumulative.immunestatus.icu cumulative.immunestatus.icu_with_ventilation cumulative.immunestatus.icu_with_ecmo * Lieferung nur Hausarztpraxen	Kollektiv: alle Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Kollektiv Hausarztpraxen: alle Patient*Innen mit mind. einem hausärztlichen Behandlungsfall. Für alle Kategorien gemäß "immunestatus" (Immunisierungsstatus) wird jeweils die Anzahl (Ganzzahl >= 0) der SARS-COV-2-Patient*Innen angegeben, die insgesamt ambulant versorgt wurden, seit Aufzeichnungsbeginn bis inklusive zum Vortag der Datenlieferung.

	Analoge Dataitems für auf Normalstation, auf ICU etc. versorgte Patient*innen, siehe "treatmentlevels".
timeline.immunestatus.outpatient analog: timeline.immunestatus.outpatientgp * timeline.immunestatus.normal_ward timeline.immunestatus.icu_undifferentiated timeline.immunestatus.icu timeline.immunestatus.icu_with_ventilation timeline.immunestatus.icu_with_ecmo * Lieferung nur Hausarztpraxen	Kollektiv: alle Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Kollektiv Hausarztpraxen: alle Patient*Innen mit mind. einem hausärztlichen Behandlungsfall. Für alle Kategorien gemäß "immunestatus" (Immunisierungsstatus) wird jeweils die Anzahl (Ganzzahlen ≥ 0) von SARS-COV-2-Patient*Innen angegeben, die an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr insgesamt ambulant versorgt wurden. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen. Analoge Dataitems für auf Normalstation, auf ICU etc. versorgte Patient*innen, siehe "treatmentlevels".
cumulative.varianttestresults	Kollektiv: alle Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Für alle Kategorien gemäß "varianttestresults" (Varianten) wird die Anzahl der Testergebnisse angegeben, so wie insgesamt seit Aufzeichnungsbeginn bis zum Vortag der Datenlieferung (inklusive) dokumentiert.
timeline.varianttestresults	Kollektiv: alle Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Für alle Kategorien gemäß "varianttestresults" werden jeweils Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) von Testergebnissen angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr erhoben wurden. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

current.wardsvisited	Kollektiv: Derzeit in stationärer Behandlung befindliche SARS-CoV-2 Patient*innen Anzahl der Stationen, auf denen ein/e Patient*in während des aktuellen stationären Aufenthaltes gelegen hat. Berücksichtigt wird der Zeitraum des Aufenthaltes, in dem der/die Patient*in positiv getestet wird. Sobald der Patient 2 aufeinanderfolgende negative Nachweise hat, endet der berechnete Zeitraum. Falls der/die Patient*in während seines/ihrer Aufenthaltes ≥ 2 Zeiträume positiv wird, so gelten diese als ≥ 2 verschiedene Berechnungen. Beispiel 1: Patient*in wechselt während des Aufenthaltes von der Normalstation auf die Intensivstation und zurück (3 Stationen). (Mehrfachzählung bei Wiederverlegung) Kurzaufenthalte z.B. in der Radiologie zur Diagnostik werden mitgezählt (Wechsel innerhalb eines Tages zählt) Geliefert werden "Mean": Mittelwert (Rationale Zahl in Punktnotation) "Standard_dev": Standardabweichung (Rationale Zahl in Punktnotation) "Sample_size": Stichprobengröße (Ganzzahl) <u>Aggregierte Darstellung:</u> In der öffentlichen Ansicht wird der Mittelwert der Anzahl der besuchten Stationen aller Standorte (inkl. Standardabweichung) berechnet und angezeigt. Im Drilldown werden die Daten der einzelnen Standorte
current.nosocomialcases.possible analog current.nosocomialcases.probable	Kollektiv: alle SARS-CoV-2-Patient*innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall Zur Gruppe "nosocomialcases.possible" Patient*innen, zählen solche Personen, die nach Aufnahme negativ und frühestens am 4. Tag positiv getestet wurden, sowie gängige Symptome (z.B. Fieber, Husten) aufweisen, und nicht in Kontakt zu einer positivem Patient*in standen. Zur Gruppe "nosocomialcases.probable" zählen solche Patient*Innen, die die Kriterien für

	"nosocomialcases.possible " erfüllen und vor dem ersten positiven Test in Kontakt zu einer positivem Patient*in standen Anzahl der Patient*innen mit einer im Krankenhaus erworbenen SARS-CoV2-Infektion, "Mean": Mittelwert Anzahl Fälle nosocomiale Infektion möglich (positiv ab Tag 4 + Symptome) "Standard_dev": Standardabweichung (Rationale Zahl in Punktnotation) "Sample_size": Stichprobengröße (Ganzzahl) analog: "Mean": Mittelwert Anzahl Fälle nosocomiale Infektion wahrscheinlich (positiv ab Tag 4/Symptome + Kontakt mit positivem Patient*in) "Standard_dev": Standardabweichung (Rationale Zahl in Punktnotation) "Sample_size": Stichprobengröße (Ganzzahl) Berücksichtigt wird der Zeitraum des Aufenthaltes, in dem der/die Patient*in positiv getestet wird. Falls der/ die Patient*in während seines/ihres Aufenthaltes in mehr als einem Zeitraum positiv wird, so wird er/sie auch mehrfach gezählt. <u>Aggregierte Darstellung:</u> In der öffentlichen Ansicht wird der Mittelwert der Anzahl der besuchten Stationen aller Standorte (inkl. Standardabweichung) berechnet und angezeigt. Im Drilldown werden die Daten der einzelnen Standorte.
current.predictivediseases	Kollektiv: Aktuelle Patient*innen (stationär, ICU). Anzahl der Patient*innen mit positiven SARS-CoV2 Test differenziert nach Anzahl der Befunde für Erkrankungen gemäß A08, B34, B99, I26, J06, J12, J18, J80, J96, J98, R05, R06, R50, R53, R56, Z22 Kategorie 1: "No_finding" (kein Befund) Kategorie 2: "Single_finding" (ein Befund) Kategorie 3: "Multiple_findings" (>= 2 Befunde) zum Zeitpunkt des Datenexports.

	In Aufnahmediagnose Geliefert wird pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl$\geq$0) pro Kategorie
timeline.predictivediseases	Kollektiv: Alle Patient*innen (ambulant, stationär, ICU). Anzahl der Patient*innen mit positiven SARS-CoV2 Test und einer der folgenden Erkrankungen nach A08, B34, B99, I26, J06, J12, J18, J80, J96, J98, R05, R06, R50, R53, R56, Z22 differenziert nach Kategorie 1: "No_finding" (kein Befund) Kategorie 2: "Single_finding" (ein Befund) Kategorie 3: "Multiple_findings" ($\geq$ 2 Befunde) Für alle Kategorien werden jeweils Anzahlen von Patient*innen (Ganzzahlen $\geq$ 0) angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr erhoben wurden. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.
current.causehospitalization	Kollektiv: Aktuelle Patient*innen (stationär, ICU). Anzahl der Patient*innen deren SARS-CoV2 Erkrankung bzgl. der Einweisung ins Krankenhaus eingestuft wurde als: Kategorie 1: "Comorbidity" (Begleitend) Kategorie 2: "Unclear" (Unklarer Bezug) Kategorie 3: "Causative" (Ursächlich) zum Zeitpunkt des Datenexports Geliefert wird pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl$\geq$0) pro Kategorie
timeline.causehospitalization	Kollektiv: Alle Patient*innen (stationär, ICU). Anzahl der Patient*innen deren SARS-CoV2 Erkrankung bzgl. der Einweisung ins Krankenhaus eingestuft wurde als: Kategorie 1: "Comorbidity" (Begleitend) Kategorie 2: "Unclear" (Unklarer Bezug) Kategorie 3: "Causative" (Ursächlich)

	Für alle Kategorien gemäß "current.causehospitalization" werden jeweils Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) von Patient*innen angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr erhoben wurden. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.
current.rbmortalityrisk	Kollektiv: Alle aktuell auf der Intensivstation betreuten Patient*innen mit einer Mindestaufenthaltsdauer von 24h auf der Intensivstation zum Zeitpunkt der Datenübergabe. Geliefert werden für die Patient*innen des Kollektivs: "Mortality_risk": die auf Basis des Regensburger-Modells (s. Berechnungsmodelle oben) berechneten und in aufsteigender Reihenfolge sortierte Mortalitätsrisiko-Scores der Patient*innen. <u>Aggregierte Darstellung:</u> Die Ergebnisse werden in als Histogramm dargestellt.
timeline.rbmortalityrisk	Kollektiv: Alle Patient*innen mit einer Mindestaufenthaltsdauer von 24h auf der Intensivstation, die sich jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr auf der Intensivstation befunden haben. Geliefert werden für die Patient*innen des Kollektivs für alle in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertage ein Tupel bestehend aus: "Mortality_risk": der auf Basis des Regensburger-Modells (s. Berechnungsmodelle oben) berechnete und in aufsteigender Reihenfolge sortierte Mortalitätsrisiko-Scores der Patient*innen, "Patient_deceased": Anzahl der am jeweiligen Kalendertag verstorbenen Patient*innen. <u>Aggregierte Darstellung:</u> Auf Basis der gelieferten Daten aller Standorte

	werden für alle in den zusammengefassten Datums-Folgen "date" enthaltenen Kalendertagen und jeweilige Patient*innen die Mediane für die Mortalitätsrisiko-Scores und Interquartilabstände über das gesamte Mortalitätsrisiko-Intervall berechnet und im Zeitverlauf gemäß der Datums-Folge "date" aufgetragen. Im Drilldown werden die Verläufe einzelner Standorte angezeigt.
cumulative.rbmortalityrisk.roc	Kollektiv: Alle seit dem Referenzdatum/ Anfangsdatum entlassenen ICU-Patient*innen Geliefert werden die Daten für eine ROC-Kurve für die Intrahospital-Mortalität. Geliefert werden für jeden Patient*innen des Gesamtkollektivs "Rbmortalityrisk_roc": ein Tupel bestehend aus einem Risikoscore und einem Boolwert, der anzeigt, ob der/die Patient*in im Verlauf des aktuellen Krankenhausaufenthalts verstorben ist. <u>Aggregierte Darstellung:</u> Öffentlich wird eine gemeinsame ROC-Kurve für alle Standorte und im Drill-Down eine ROC-Kurve pro Standort angezeigt.
current.renalreplacementrisk	Kollektiv: Alle aktuell auf der Intensivstation betreuten Patient*innen mit einer Mindestaufenthaltsdauer von 24h auf der Intensivstation zum Zeitpunkt der Datenübergabe, die während des aktuellen Intensivaufenthalts kein Nierenersatzverfahren erhalten haben oder erhalten. Geliefert werden für die Patient*innen des Kollektivs: "Renalreplacement_risk": die auf Basis des Bonner-Modells (s. Berechnungsmodelle oben) berechneten Nierenersatzrisiko-Scores in aufsteigender Reihenfolge sortiert. <u>Aggregierte Darstellung:</u> Die Ergebnisse werden in als Histogramm dargestellt.
timeline.renalreplacementrisk	Kollektiv: Alle während des relevanten Zeitintervalls auf der Intensivstation befindlichen Patient*innen,

	die während des aktuellen Intensivaufenthalts kein Nierenersatzverfahren erhalten haben oder erhalten. Geliefert werden für die Patient*innen des Kollektivs, die sich jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr auf der Intensivstation befunden haben.: "Renalreplacement_risk": Nierenersatzrisiko-Scores berechnet auf Basis des Bonner-Modells (s. Berechnungsmodelle oben) "Renalreplacement_therapy": Anzahl Pat*innen, die in diesem Zeitintervall ein extrakorporales Nierenersatzverfahren erhalten haben Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen. <u>Aggregierte Darstellung:</u> Auf Basis der gelieferten Daten aller Standorte werden für alle in den zusammengefassten Datums-Folgen "date" enthaltenen Kalendertagen und jeweilige Patient*innen die Mediane für die Renalreplacement-Scores inkl. Interquartilabstände berechnet und im Zeitverlauf gemäß der Datums-Folge "date" aufgetragen.
cumulative.renalreplacementrisk.roc	Kollektiv: Alle seit dem Referenzdatum/ Anfangsdatum entlassenen ICU-Patient*innen Geliefert werden die Daten für die ROC-Kurve für ein 72h Prädiktionsintervall Geliefert werden für jeden Behandlungstag auf der Intensivstation für alle Patient*innen des Gesamtkollektivs ein Tupel bestehend aus einem Risikoscore und einem Boolwert, Nach dem Nierenersatzrisiko-Scores sortierte Tupel bestehend aus: "Renalreplacement_risk": Nierenersatzrisiko-Scores berechnet auf Basis des Bonner-

	Modells (s. Berechnungsmodelle oben) und in aufsteigender Reihenfolge sortiert. "Renalreplacement_performed": Boolwert der anzeigt, ob im Prädiktionsintervall von 72h ein Nierenersatzverfahren zur Anwendung kam (Details s. Erdfelder et al. 2017). <u>Aggregierte Darstellung:</u> Öffentlich wird eine gemeinsame ROC-Kurve für alle Standorte und im Drill-Down eine ROC-Kurve pro Standort angezeigt.
timeline.icubedoccupancy	Kollektiv: Alle SARS-COV-2-positive Personen in Berlin, bei denen eine labordiagnostische Bestätigung unabhängig vom klinischen Bild vorliegt. Datenquelle: Robert-Koch-Institut Geliefert werden die Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) von SARS-COV-2-Patient*Innen (Erwachsene + Kinder), die auf einer Berliner Intensivstation (ICU) ein Intensivbett belegen. Dabei wird für die Vergangenheit das real an das DIVI Intensivregister gemeldete Ergebnis gezeigt, d.h. die Anzahlen, die an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr ein Intensivbett belegt haben. Die Anzahlen für den aktuellen Tag (heute) und die nächsten 6 Tage entstammen einer Modellvorhersage (s. Berliner-Modell in Berechnungsmodelle oben). Die Vorhersage mit Ober- und Untergrenzen wird für den aktuellen Tag und die folgenden 6 Tage mitgeliefert. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

JSON-Beispiele öffentliche Datenitems

Die Werte folgender Beispiele für **Rubrik " Covid-19"** sind willkürlich. Es werden generische itemtypes benutzt, nur die **farblich hinterlegten Abschnitte** sind mit den aktuellen Daten zu füllen.

```
{
  "provider": "UKB",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 1588929963,
  "author": "Universitätsklinikum Bonn",
```

```
"dataitems": [
  {
    "itemname": "current.treatmentlevel",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {"Outpatient": 275,
      "Normal_ward": 75,
      "ICU": 24,
      "ICU_with_ventilation": 13,
      "ICU_with_ecmo": 2,
      "ICU_undifferentiated": 5}
  },
  {
    "itemname": "current.maxtreatmentlevel",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {"Outpatient": 256,
      "Normal_ward": 145,
      "ICU": 103,
      "ICU_with_ventilation": 25,
      "ICU_with_ecmo": 8,
      "ICU_undifferentiated": 0}
  },
  {
    "itemname": "cumulative.results",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {"Positive": 765,
      "Borderline_suspected": 34,
      "Negative": 567}
  },
  {
    "itemname": "cumulative.gender",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {"Male": 1234,
      "Female": 1243,
      "Diverse": 2}
  },
  {
    "itemname": "cumulative.age",
    "itemtype": "list",
    "data": [0,0,0,20,20,25,25,30,35,40,50,55,60,60,65,70,80,85,90,90]
  },
  {
    "itemname": "cumulative.maxtreatmentlevel",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {"Outpatient": 1234,
      "Normal_ward": 245,
```

```

        "ICU": 365,
        "ICU_with_ventilation": 254,
        "ICU_with_ecmo": 23,
        "ICU_undifferentiated": 0}
    },
    {
        "itemname": "cumulative.zipcode",
        "itemtype": "list",
        "data": ["53111", "53113", "53113", "53115", "53117", "53121", "53125",
        "53127", "53177", "53177", "53177"]
    },
    {
        "itemname": "timeline.tests",
        "itemtype": "list",
        "data": {"date": [1588291200, 1588377600, 1588464000, 1588567000],
        "value": [158, 161, 120, 115]}
    },
    {
        "itemname": "timeline.test.positive",
        "itemtype": "list",
        "data": {"date": [1588291200, 1588377600, 1588464000, 1588567000],
        "value": [15, 12, 18, 15]}
    },
    {
        "itemname": "timeline.maxtreatmentlevel",
        "itemtype": "list",
        "data": {"Outpatient": [12, 23, 34, 45],
        "Normal_ward": [1, 2, 3, 4],
        "ICU": [5, 4, 3, 2],
        "ICU_with_ventilation": [9, 8, 7, 6],
        "ICU_with_ecmo": [5, 6, 7, 8],
        "ICU_undifferentiated ": [1, 2, 3, 4],
        "date": [1588291200, 1588377600, 1588464000, 1588567000]}
    },
    { "comment": "Die Templates zur Erfassung der Lebensalter current und cumulative
von Patient*innen mit maximalem Versorgungsniveau outpatient, normal_ward,
icu_undifferentiated, icu, icu_with_ventilation ,icu_with_ecmo sind alle analog wie
folgt aufgebaut:"},
    {
        "itemname": "cumulative.age.maxtreatmentlevel.outpatient",
        "itemtype": "list",
        "data": [0, 0, 0, 20, 25, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 85, 90, 90]
    },

```

```
{
  "itemname": "cumulative.inpatient.gender",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {"Male": 1,
           "Female": 2,
           "Diverse": 3}
},
{
  "itemname": "cumulative.outpatient.age",
  "itemtype": "list",
  "data": [0,0,0,20,25,25,30,40,50,55,60,65,70,85,90,90]
},
{
  "itemname": "cumulative.outpatientgp.age",
  "itemtype": "list",
  "data": [0,0,0,20,25,25,30,40,50,55,60,65,70,85,90,90]
},
{
  "itemname": "cumulative.outpatient.gender",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {"Male": 123,
           "Female": 135,
           "Diverse": 2}
},
{
  "itemname": "cumulative.outpatientgp.gender",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {"Male": 123,
           "Female": 135,
           "Diverse": 2}
},
{
  "itemname": "cumulative.inpatient.age",
  "itemtype": "list",
  "data": [0,0,20,25,25,35,50,55,60,70,80,85,90,90]
},
{
  "itemname": "timeline.deaths",
  "itemtype": "list",
  "data": {"date": [1588291200,1588377600,1588464000, 1588567000],
           "value": [0,1,0,1]}
},
{
  "itemname": "cumulative.lengthofstay.hospital",
```

```

        "itemtype": "list",
        "data": [2,4,15,17,20,22,25,25,30]
    },
    {
        "itemname": "cumulative.lengthofstay.hospital.alive",
        "itemtype": "list",
        "data": [2,15,17,20,25,30]
    },
    {
        "itemname": "cumulative.lengthofstay.hospital.dead",
        "itemtype": "list",
        "data": [4,22,25]
    },
    {
        "itemname": "cumulative.lengthofstay.icu",
        "itemtype": "list",
        "data": [14,22,28,48,72,96,98,105,110]
    },
    {
        "itemname": "cumulative.lengthofstay.icu.alive",
        "itemtype": "list",
        "data": [14,22,48,72,98,105]
    },
    {
        "itemname": "cumulative.lengthofstay.icu.dead",
        "itemtype": "list",
        "data": [28,96,110]
    },
    {
        "comment": "Die Templates zur Erfassung des Immunstatus cumulative und timeline von Patient*innen mit maximalem Versorgungsniveau outpatient, outpatientgp, normal_ward, icu_undifferentiated, icu, icu_with_ventilation, icu_with_ecmo sind alle analog wie folgt aufgebaut:",
        {
            "itemname": "cumulative.immunestatus.outpatient",
            "itemtype": "aggregated",
            "data": {
                "Complete": 456,
                "Incomplete": 876,
                "None": 346,
                "Unknown": 2568
            }
        },
        {
            "itemname": "timeline.immunestatus.outpatient",

```

```

    "itemtype": "list",
    "data": {
      "Complete": [12, 68, 76],
      "Incomplete": [34, 56, 12, 34],
      "None": [56, 45, 32, 27],
      "Unknown": [167, 245, 341, 156],
      "date": [1588291200, 1588377600, 1588464000, 1588567000]}
  },
  {
    "itemname": "cumulative.varianttestresults",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {
      "Alpha": 378,
      "Beta": 451,
      "Gamma": 239,
      "Delta": 345,
      "Omikron": 689,
      "OtherVOC": 0,
      "NonVOC": 12,
      "Unknown": 1,
      "Negative": 5679}
  },
  {
    "itemname": "timeline.varianttestresults",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "Alpha": [16, 8, 5, 0],
      "Beta": [0, 8, 15, 0],
      "Gamma": [0, 2, 6, 3],
      "Delta": [0, 0, 0, 12],
      "Omikron": [0, 0, 0, 3],
      "OtherVOC": [0, 0, 0, 0],
      "NonVOC": [12, 2, 5, 0],
      "Unknown": [10, 8, 5, 7],
      "Negative": [124, 203, 89, 136],
      "date": [1588291200, 1588377600, 1588464000, 1588567000]}
  },
  {
    "itemname": "current.wardsvisited",
    "itemtype": "statsmean",
    "data": {
      "Mean": 2.3,
      "Standard_dev": 1.1,
      "Sample_size": 45
    }
  }
}

```

```

},
{
  "itemname": "current.nosocomialcases.possible",
  "itemtype": "statsmean",
  "data": {
    "Mean": 13,
    "Standard_dev": 1.1,
    "Sample_size": 45
  }
},
{
  "itemname": "current.nosocomialcases.probable",
  "itemtype": "statsmean",
  "data": {
    "Mean": 7,
    "Standard_dev": 1.3,
    "Sample_size": 34
  }
},
{
  "itemname": "current.predictivediseases",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {
    "No_finding": 20,
    "Single_finding": 33,
    "Multiple_findings": 14
  }
},
{
  "itemname": "timeline.predictivediseases",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "No_finding": [16,8,5,0],
    "Single_finding": [0,8,15,0],
    "Multiple_findings": [0,2,6,3],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000]}
},
{
  "itemname": "current.causehospitalization",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {
    "Comorbidity": 87,
    "Unclear": 50,
    "Causative": 205
  }
}

```

```

},
{
  "itemname": "timeline.causehospitalization",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "Comorbidity": [16,8,5,0],
    "Unclear": [0,8,15,0],
    "Causative": [0,2,6,3],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000]}
},
{
  "itemname": "current.rbmortalityrisk",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "Mortality_risk": [0.12,0.51,0.87, "...", 0.92]
  }
},
{
  "itemname": "timeline.rbmortalityrisk",
  "itemtype": "listnestedarrays",
  "data": {"date": [1588291200, "...", 1588567000],
    "Mortality_risk": [[0.34, "...", 0.50], "...", [0.20, "...", 0.34]],
    "Patient_deceased": [[0, "...", 0], "...", [0, "...", 1]]
  }
},
{
  "itemname": "cumulative.rbmortalityrisk.roc",
  "itemtype": "listtupel",
  "data": {
    "Rbmortalityrisk_roc": [ [12,35], "...", [67,90] ]
  }
},
{
  "itemname": "current.renalreplacementrisk",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "Renalreplacement_risk": [0.12,0.50,0.87, "...", 0.92]
  }
},
{
  "itemname": "timeline.renalreplacementrisk",
  "itemtype": "listnestedarrays",
  "data": {"date": [1588291200, "...", 1588464000],
    "Renalreplacement_risk": [[0.34, "...", 0.50], "...", [0.20, "...", 0.34]],
    "Renalreplacement_therapy": [34, "...", 11]
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "itemname": "cumulative.renalreplacementrisk.roc",
    "itemtype": "listtupel",
    "data": {
      "Renalreplacementrisk_roc": [ [12,35], "...", [67,90] ]
    }
  },
  {
    "itemname": "timeline.icubedoccupancy",
    "itemtype": "listprediction",
    "data": {
      "date": [1588291200, "...", 1588636800],
      "ICU_beds_occupancy": [16, "...", 20],
      "Last_lower": [15, "...", 21],
      "Last_upper": [25, "...", 31]
    }
  }
]
}

```

Definition nicht-öffentlicher Datenitems

Nachfolgend definierte Dataitems bilden die Datengrundlage für Darstellungen an der Benutzeroberfläche des Dashboards, die allein den anliefernden Standorten, s.o. "**provider**", nach Authentifizierung angezeigt werden.

Zusätzlich zu der Drilldown-Version der öffentlichen Datenitems werden folgende nicht-öffentliche Datenitems optional angeboten. Diese haben sich zur lokalen Bedienung von Reporting-Anforderungen z.B. der Kommune bewährt.

Nicht-öffentliche Datenitems "Covid-19"	Beschreibung
current.treatmentlevel.crosstab	Kollektiv: Derzeit in stationärer Behandlung befindliche SARS-CoV-2-Patient*Innen. <u>Aktuelles</u> Versorgungsniveau SARS-COV-2-Patient*Innen: Anzahl SARS-COV-2-positiver-Patient*Innen auf den in "treatmentlevels" definierten Versorgungsniveau zum Zeitpunkt des Datenexports, mit zusätzlicher Separierung der aktuellen Versorgungsniveaus nach Wohnort der Patient*Innen. Grundlage für die Wohnortbestimmung ist der jeweilige Postleitzahlenbereich der Stadt, in welcher die datenliefernde Uniklinik ansässig ist.

Die Abbildung zeigt beispielhaft eine Kreuztabelle zum Datenitem "current.treatmentlevel.crosstab":

Kreuztabelle				
Bonn	ICU	Beatmet	Ecmo	Wert
				46
	X			7
	X	X		4
	X	X	X	1
X				17
X	X			1
X	X	X		2
X	X	X	X	0

JSON-Beispiele nicht-öffentliche Datenitems

Die Werte folgender Beispiele für **Rubrik "Covid-19"** sind willkürlich. Es werden generische itemtypes benutzt, nur die **farblich hinterlegten Abschnitte** sind mit den aktuellen Daten zu füllen.

Zur Verdeutlichung des Datenitems "current.treatmentlevel.crosstab":

Über die binäre Codierung in "state" wird festgelegt, welchen Kategorien gemäß "columnname" die in "value" angegebenen Werte zuzuordnen sind.

Soll z.B. angegeben werden, dass zwei innerorts wohnhafte Patient*innen auf dem Versorgungsniveau "ICU_with_ventilation" behandelt werden, so entspricht dies der Codierung "1110", und die Zahl "2" ist an die siebte Stelle in das "value"-Array einzutragen (die "1110" ist in "state" an siebter Stelle angeführt). In der Codierung "1110" bedeutet die erste Eins, dass diese Patient*innen in der in "columnname" angegebenen Stadt innerorts wohnhaft sind, wobei die zweite und dritte Eins besagen, dass die Patient*innen auf Intensivstation liegen und beatmet werden, und die Null besagt, dass diese Patient*innen nicht mit ECMO versorgt werden. Siehe bitte auch das nachfolgende Beispiel. Werte der Beispiele sind willkürlich.

```
{
  "provider": "UKB",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 1588929963,
  "author": "Universitätsklinikum Bonn",
  "dataitems": [
    {
      "itemname": "current.treatmentlevel.crosstab",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {
        "state": [
          "0000",
          "0100",
          "0110",
          "0111",
          "1000",
          "1100",
          "1110",
          "1111"
        ],
        "columnname": [
          "Bonn",
          "ICU",
          "ICU_with_ventilation",
          "ICU_with_ECMO"
        ],
        "value": [
          46, 4, 7, 1, 17, 1, 2, 0
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Rubrik "Influenza"

Besondere Festlegungen

- Die Auswertung beginnt ab dem Stichtag **01.09.2022**.

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

Parameter "Influenza"	Wertebereich und Beschreibung
infl.infectionstatus	"Positive" - Als INFLUENZA-Patient*In gilt, wer mindestens - eine dokumentierte Influenza-Diagnose ICD-10 J10.0, J10.1, J10.8, J09 oder - einen positiven Labornachweis* von "Influenza-Viren" (RT-PCR) hat oder - ein gesetztes lokales Dokumentationsmerkmal "Influenza positiv" (o.ä) hat oder hatte. "Suspected" - Als Patient*In mit Verdacht auf INFLUENZA-Infektion gilt, bei wem eine Influenza Diagnose ICD-10 J10.0, J10.1, J10.8, J09 V vorliegt oder eine der ICD-10 Diagnosen J11.0, J11.1, J11.8 codiert hat und/oder wer ein uneindeutiges/grenzwertiges Labortestergebnis* aufweist. "Negative" - Als INFLUENZA-negativ-Patient*Innen gilt, wer ausschließlich negative Labornachweise aufweist. * s. https://loinc.org/LG32757-3 genutzte LOINC codes in observations: 34487-9, 60416-5, 49521-8, 49531-7, 61365-3, 48509-4, 29909-9, 40982-1
infl.immunestatus	Der Immunstatus gemäß des zum Erhebungs-bzw. Dokumentationszeitpunktes bestehenden Impfstatus bezogen auf die aktuelle Influenzasaison zwischen der 40. Kalenderwoche (Anfang Oktober) und der 20. Kalenderwoche (Mitte Mai) . "Complete" - Impfung "None" - Keine Impfung "Unknown" - Information zur Impfung unbekannt, nicht vorliegend

infl.subtypetestresults	Angaben zu Testergebnissen für die Influenza (Basis-) Subtypen und Sublinien laut WHO (https://www.who.int/tools/flunet/flunet-summary); (siehe auch https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/IPV/IPV_Node.html) Anzahl der positiven Testergebnisse für die Influenza-Subtypen bzw. Linien* "A_H1N1", "A_H3", "A_H5",, "A_nosub" (ohne Subgruppenbestimmung/not subtyped), "B_Victoria", "B_Yamagata", "B_nosub" (Linie nicht bestimmt/lineage not subtyped) "AB_nosub" (Linie nicht bestimmt/lineage not subtyped) * Hinweis für die datenschutzrechtliche Prüfung: Mit der Festlegung neuer bzw. weiter ausdifferenzierter Influenza Subtypen oder –Linien im Verlauf der jährlich wiederkehrenden saisonalen Influenza kann die Datensatzbeschreibung und Datenerfassung in Bezug auf dieses Datenitem ohne erneute datenschutzrechtliche Prüfung entsprechend erweitert werden.
-------------------------	--

Definition öffentlicher Datenitems

Datenitems "Influenza"	Beschreibung
infl.current.treatmentlevel	Kollektiv: Derzeit in stationärer Behandlung befindliche INFLUENZA-Patient*Innen. <u>Aktuelles</u> Versorgungsniveau INFLUENZA-Patient*Innen: Anzahl INFLUENZA-positiver Patient*Innen auf den in "treatmentlevels" definierten Versorgungsniveaus zum Zeitpunkt des Datenexports. Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl >= 0) pro Versorgungsniveau. Beispiel: Patient*In, dessen Beatmung beendet werden konnte, der aber noch auf der Intensivstation liegt, wird hier als "ICU" geführt.
infl.current.maxtreatmentlevel	Kollektiv: Derzeit in stationärer Behandlung befindliche INFLUENZA-Patient*Innen. Höchstes bisheriges Versorgungsniveau der <u>aktuell</u> stationären INFLUENZA-Patient*Innen: Anzahl der zum Exportzeitpunkt aktuell stationären

	Patient*Innen mit dem bislang am höchsten beanspruchten Versorgungsniveau wie in "treatmentlevels" definiert. Die Rangfolge der Versorgungsniveaus: "Outpatient", "Normal_ward", "ICU_undifferentiated", "ICU", "ICU_with_ventilation", "ICU_with_ecmo" Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl ≥ 0) pro Versorgungsniveau. Beispiel: Ein Patient, der auf der Intensivstation beatmet wurde, nun aber auf Normalstation liegt, wird hier als "ICU_with_ventilation" geführt.
infl.cumulative.results	Kollektiv: INFLUENZA-Tests aller Patient*Innen, für die ein mit dem Test zusammenhängender ambulanter, vor-, nach-, teil- oder vollstationärer Behandlungsfall existiert (keine Testergebnisse von externen Auftraggebern, wie z.B. Hausärzten, Gesundheitsämtern etc.). Anzahl INFLUENZA-Tests gemäß Einstufung der Testergebnisse in die Kategorien "Positive", "Suspected", "Negative" Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl ≥ 0)
infl.cumulative.gender	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Anzahlen der INFLUENZA-Patient*Innen nach Geschlecht Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl ≥ 0) pro Geschlecht.
infl.cumulative.age	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Beginn der Datenerfassung ist 01.10.2023. Lebensalter aller INFLUENZA-positiver Patient*Innen als aufsteigend sortierte Liste. Die Lebensalter in Altersgruppen wie folgt: 0 falls <20, 20 für 20-24, 25 für 25-29, 30 für 30-34,..., 85 für 85-89 , 90 falls ≥ 90, also jeweils das

	niedrigste Alter der Gruppe. Beispiel: [0, 20, 20, 35, 40, 40, 85, 90]
infl.cumulative.maxtreatmentlevel	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem <u>abgeschlossenen</u> ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Für alle Versorgungsniveaus gemäß "infl.treatmentlevels" werden die Anzahlen aller INFLUENZA-Patient*Innen angegeben, die auf dem Versorgungsniveau behandelt wurden. Patient*Innen zählen nur einmal in dem maximal genutztem Versorgungsniveau. Die Rangfolge der Versorgungsniveaus: "Outpatient", "Normal_ward", "ICU_undifferentiated", "ICU", "ICU_with_ventilation", "ICU_with_ecmo" Geliefert wird also eine Anzahl (Ganzzahl >= 0) pro Versorgungsniveau. Beispiel: Falls der Behandlungsverlauf "Outpatient" -> "Normal_ward" -> "ICU" -> "ICU_with_ventilation" -> "ICU" -> "Normal_ward" ist, dann zählt der Patient in "ICU_with_ventilation"
infl.cumulative.zipcode	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem hausärztlichen, ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Postleitzahlen für alle INFLUENZA-positive Patient*Innen, an denen diese ansässig sind, als aufsteigend sortierte Liste. Postleitzahlen können demnach mehrfach auftreten. Hinweis: Postleitzahlen wegen einer ggf. führend enthaltenen "0" nicht als Zahlenwert sondern als String (in Anführungszeichen) geführt. Patient*Innen aus dem Ausland werden als Missing("null") geführt.
infl.timeline.tests	Kollektiv: INFLUENZA-PCR-Tests aller Patient*Innen, für die ein mit dem Test zusammenhängender hausärztlicher, ambulanter, vor-, nach-, teil- oder vollstationärer Behandlungsfall existiert. (Keine Testergebnisse von externen Auftraggebern, wie z.B. Hausärzten, Gesundheitsämtern etc. für ambulant, vor-, nach-, teil oder vollstationären Behandlungsfall)

	Es werden die Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) aller PCR-Test gelistet, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr durchgeführt wurden. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.
infl.timeline.test.positive	Kollektiv: INFLUENZA-PCR-Tests aller Patient*Innen, für die ein mit dem Test zusammenhängender hausärztlicher, ambulanter, vor-, nach-, teil- oder vollstationärer Behandlungsfall existiert. (Keine Testergebnisse von externen Auftraggebern, wie z.B. Hausärzten, Gesundheitsämtern etc. für ambulant, vor-, nach-, teil oder vollstationären Behandlungsfall) Es werden die Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) der positiven PCR-Tests gelistet, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr durchgeführt wurden. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.
infl.timeline.maxtreatmentlevel	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall Für alle Versorgungsniveaus gemäß "treatmentlevels" werden jeweils Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) von INFLUENZA-Patient*Innen angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr entsprechend versorgt wurden. Patient*innen werden in dem höchsten an dem jeweiligen Tag genutzten Versorgungsniveau gezählt. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.
infl.current.age.maxtreatmentlevel.outpatient analog:	Kollektiv: Derzeit in Behandlung befindliche INFLUENZA-Patient*Innen.

infl.current.age.maxtreatmentlevel.normal_ward infl.current.age.maxtreatmentlevel.icu_undifferentiated infl.current.age.maxtreatmentlevel.icu infl.current.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ventilation infl.current.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ecmo	Lebensalter derzeitiger INFLUENZA-Patient*Innen Ambulant als höchstes Versorgungsniveau als aufsteigend sortierte Liste. Die Lebensalter in Altersgruppen wie folgt anzugeben: 0 falls <20, 20 für 20-24, 25 für 25-29, 30 für 30-34,..., 85 für 85-89 , 90 falls >= 90, also jeweils das niedrigste Alter der Gruppe. Beispiel: [0, 20, 20, 35, 40, 40, 85, 90]
infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.outpatient analog: infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.normal_ward infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_undifferentiated infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ventilation infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ecmo	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem <u>abgeschlossenen</u> ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Beginn der Datenerfassung ist 01.10.2023. Lebensalter aller INFLUENZA- Patient*Innen mit Ambulant als höchstes Versorgungsniveau als aufsteigend sortierte Liste. Die Lebensalter in Altersgruppen wie folgt anzugeben: 0 falls <20, 20 für 20-24, 25 für 25-29, 30 für 30-34,..., 85 für 85-89 , 90 falls >= 90, also jeweils das niedrigste Alter der Gruppe. Beispiel: [0, 20, 20, 35, 40, 40, 85, 90]
infl.cumulative.inpatient.gender	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit mind. einem nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Anzahl stationärer INFLUENZA-Patient*Innen nach Geschlecht. Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl >= 0) pro Geschlecht.
infl.cumulative.outpatient.age analog: infl.cumulative.outpatientgp.age * * nur Hausarztpraxen	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit mind. einem, ambulanten oder vorstationären Behandlungsfall. Beginn der Datenerfassung ist 01.10.2023. Kollektiv Hausarztpraxen: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit mind. einem hausärztlichen Behandlungsfall. Analog: Behandlungsfall Lebensalter aller ambulant versorgter INFLUENZA-positiver Patient*Innen bis zum Exportzeitpunkt als aufsteigend sortierte Liste. Die Lebensalter in Altersgruppen wie folgt: 0 falls <20, 20 für 20-24, 25 für 25-29, 30 für 30-34,..., 85 für 85-89 , 90 falls >= 90, also jeweils das

	niedrigste Alter der Gruppe. Beispiel: [0, 20, 20, 35, 40, 40, 85, 90]
infl.cumulative.outpatient.gender analog: infl.cumulative.outpatientgp.gender* * nur Hausarztpraxen	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit mind. einem ambulanten oder vorstationären Behandlungsfall. Kollektiv Hausarztpraxen: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit mind. einem hausärztlichen Behandlungsfall. Anzahl für alle ambulant versorgten INFLUENZA-Patient*Innen nach Geschlecht . Geliefert wird also pro Datenlieferung eine Anzahl (Ganzzahl >= 0) pro Geschlecht.
infl.cumulative.inpatient.age	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit mind. einem nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Beginn der Datenerfassung ist 01.10.2023. Lebensalter aller stationärer versorgter INFLUENZA-positiver Patient*Innen bis zum Exportzeitpunkt als aufsteigend sortierte Liste. Die Lebensalter in Altersgruppen wie folgt: 0 falls <20, 20 für 20-24, 25 für 25-29, 30 für 30-34, ..., 85 für 85-89, 90 falls >= 90, also jeweils das niedrigste Alter der Gruppe. Beispiel: [0, 20, 20, 35, 40, 40, 85, 90]
infl.timeline.deaths	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Es werden die Anzahlen (Ganzzahlen >= 0) von INFLUENZA-Patient*Innen angegeben, die an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr in stationärer Behandlung verstorben sind. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.
infl.cumulative.lengthofstay.hospital	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit mind. einem <u>abgeschlossenen</u> vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Verweildauer in Tagen im Krankenhaus für alle INFLUENZA-Patient*Innen. Sollte Patient*In

	mehrere INFLUENZA-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
infl.cumulative.lengthofstay.hospital.alive	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Verweildauer im Krankenhaus in Tagen für alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einer anderen Entlassart als "Tod". Sollte Patient*In mehrere INFLUENZA-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
infl.cumulative.lengthofstay.hospital.dead	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall, die im Krankenhaus verstorben sind. Verweildauer im Krankenhaus in Tagen für alle INFLUENZA-Patient*Innen mit der Entlassart "Tod". Sollte Patient*In mehrere INFLUENZA-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
infl.cumulative.lengthofstay.icu	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem <u>abgeschlossenen</u> vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Verweildauer auf ICU in Stunden für alle INFLUENZA-Patient*Innen (ggf. als Summe aller ICU-Aufenthalte innerhalb des Falls). Sollte Patient*In mehrere INFLUENZA-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
infl.cumulative.lengthofstay.icu.alive	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Verweildauer auf ICU in Stunden für alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einer anderen Entlassart als "Tod" haben (ggf. als Summe aller ICU-Aufenthalte innerhalb des Falls). Sollte Patient*In mehrere INFLUENZA-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
infl.cumulative.lengthofstay.icu.dead	Kollektiv: Alle INFLUENZA-Patient*Innen mit einem vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall, die im Krankenhaus verstorben sind. Verweildauer auf ICU in Stunden für alle INFLUENZA-Patient*Innen mit der Entlassart

	"Tod" (ggf. als Summe aller ICU-Aufenthalte innerhalb des Falls). Sollte Patient*In mehrere INFLUENZA-Fälle haben, wird deren Verweildauer addiert.
infl.cumulative.immunestatus.outpatient analog: infl.cumulative.immunestatus.outpatientgp * infl.cumulative.immunestatus.normal_ward infl.cumulative.immunestatus.icu_undifferentiated infl.cumulative.immunestatus.icu infl.cumulative.immunestatus.icu_with_ventilation infl.cumulative.immunestatus.icu_with_ecmo * nur Hausarztpraxen	Kollektiv: alle Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Kollektiv Hausarztpraxen: alle Patient*Innen mit mind. einem hausärztlichen Behandlungsfall. Für alle Kategorien gemäß "infl.immunestatus" (Immunisierungsstatus) wird jeweils die Anzahl (Ganzzahl ≥ 0) der INFLUENZA-Patient*Innen angegeben, die insgesamt ambulant versorgt wurden, seit Aufzeichnungsbeginn bis inklusive zum Vortag der Datenlieferung. Analoge Dataitems für auf Normalstation, auf ICU etc. versorgte Patient*innen, siehe "infl.treatmentlevels".
infl.timeline.immunestatus.outpatient analog: infl.timeline.immunestatus.outpatientgp * infl.timeline.immunestatus.normal_ward infl.timeline.immunestatus.icu_undifferentiated infl.timeline.immunestatus.icu infl.timeline.immunestatus.icu_with_ventilation infl.timeline.immunestatus.icu_with_ecmo * nur Hausarztpraxen	Kollektiv: alle Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Kollektiv Hausarztpraxen: alle Patient*Innen mit mind. einem hausärztlichen Behandlungsfall. Für alle Kategorien gemäß "infl.immunestatus" (Immunisierungsstatus) wird jeweils die Anzahl (Ganzzahlen ≥ 0) von INFLUENZA-Patient*Innen angegeben, die an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr insgesamt ambulant versorgt wurden. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen. Analoge Dataitems für auf Normalstation, auf ICU etc. versorgte Patient*innen, siehe "treatmentlevels".
infl.cumulative.subtypetestresults	Kollektiv: alle Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Für alle Kategorien gemäß "infl.subtypetestresults" (Subtypen bzw. Linien) wird die Anzahl der

	Testergebnisse angegeben, so wie insgesamt seit Aufzeichnungsbeginn bis zum Vortag der Datenlieferung (inklusive) dokumentiert.
infl.timeline.subtypetestresults	Kollektiv: alle Patient*Innen mit einem ambulanten, vor-, nach-, teil- oder vollstationären Behandlungsfall. Für alle Kategorien gemäß "infl.subtypetestresults" werden jeweils Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) von Testergebnissen angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr erhoben wurden. Die Datums-Folge "date" sollte möglichst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

JSON-Beispiele "Influenza"

Die Werte folgender Beispiele für **Rubrik "Influenza"** sind willkürlich. Es werden generische itemtypes benutzt, nur die **farblich hinterlegten Abschnitte** sind mit den aktuellen Daten zu füllen.

```
{
  "provider": "UKB",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 1588929963,
  "author": "Universitätsklinikum Bonn",
  "dataitems": [
    {
      "itemname": "infl.current.treatmentlevel",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {"Outpatient": 275,
        "Normal_ward": 75,
        "ICU": 24,
        "ICU_with_ventilation": 13,
        "ICU_with_ecmo": 2,
        "ICU_undifferentiated": 5}
    },
    {
      "itemname": "infl.current.maxtreatmentlevel",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {"Outpatient": 256,
        "Normal_ward": 145,
        "ICU": 103,
        "ICU_with_ventilation": 25,
        "ICU_with_ecmo": 8,
        "ICU_undifferentiated": 0}
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "itemname": "infl.cumulative.results",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {"Positive": 765,
           "Suspected": 34,
           "Negative": 567}
},
{
  "itemname": "infl.cumulative.gender",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {"Male": 1234,
           "Female": 1243,
           "Diverse": 2}
},
{
  "itemname": "infl.cumulative.age",
  "itemtype": "list",
  "data": [0,0,0,20,20,25,25,30,35,40,50,55,60,60,65,70,80,85,90,90]
},
{
  "itemname": "infl.cumulative.maxtreatmentlevel",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {"Outpatient": 1234,
           "Normal_ward": 245,
           "ICU": 365,
           "ICU_with_ventilation": 254,
           "ICU_with_ecmo": 23,
           "ICU_undifferentiated": 0}
},
{
  "itemname": "infl.cumulative.zipcode",
  "itemtype": "list",
  "data": ["53111","53113","53113","53115","53117","53121","53125",
           "53127","53177","53177","53177"]
},
{
  "itemname": "infl.timeline.tests",
  "itemtype": "list",
  "data": {"date": [1588291200,1588377600,1588464000,1020470400],
           "value": [158,161,120,115,120]}
},
{
  "itemname": "infl.timeline.test.positive",
  "itemtype": "list",

```

```

    "data": {"date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000],
              "value": [15,12,18,15]}
  },
  {
    "itemname": "infl.timeline.maxtreatmentlevel",
    "itemtype": "list",
    "data": {"Outpatient": [12,23,34,45],
              "Normal_ward": [1,2,3,4],
              "ICU": [5,4,3,2],
              "ICU_with_ventilation": [9,8,7,6],
              "ICU_with_ecmo": [5,6,7,8],
              "ICU_undifferentiated ": [1,2,3,4],
              "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000]}
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.inpatient.gender",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {"Male": 1,
              "Female": 2,
              "Diverse": 3}
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.outpatient.age",
    "itemtype": "list",
    "data": [0,0,0,20,25,25,30,40,50,55,60,65,70,85,90,90]
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.outpatientgp.age",
    "itemtype": "list",
    "data": [0,0,0,20,25,25,30,40,50,55,60,65,70,85,90,90]
  },
  {
    "comment": "Die Templates zur Erfassung der Lebensalter current und cumulative
von Patient*innen mit maximalem Versorgungsniveau outpatient, normal_ward,
icu_undifferentiated, icu, icu_with_ventilation ,icu_with_ecmo sind alle analog wie
folgt aufgebaut:"},
    {
      "itemname": "infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.outpatient",
      "itemtype": "list",
      "data": [0,0,0,20,25,25,30,40,50,55,60,65,70,85,90,90]
    },
    {
      "itemname": "infl.cumulative.outpatient.gender",
      "itemtype": "aggregated",

```

```

    "data": {"Male": 123,
             "Female": 135,
             "Diverse": 2}
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.outpatientgp.gender",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {"Male": 123,
             "Female": 135,
             "Diverse": 2}
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.inpatient.age",
    "itemtype": "list",
    "data": [0,0,20,25,25,35,50,55,60,70,80,85,90,90]
  },
  {
    "itemname": "infl.timeline.deaths",
    "itemtype": "list",
    "data": {"date": [1588291200,1588377600,1588464000, 1588567000],
             "value": [0,1,0,1]}
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.hospital",
    "itemtype": "list",
    "data": [2,4,15,17,20,22,25,25,30]
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.hospital.alive",
    "itemtype": "list",
    "data": [2,15,17,20,25,30]
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.hospital.dead",
    "itemtype": "list",
    "data": [4,22,25]
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.icu",
    "itemtype": "list",
    "data": [14,22,28,48,72,96,98,105,110]
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.icu.alive",
    "itemtype": "list",

```

```

    "data": [14,22,48,72,98,105]
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.icu.dead",
    "itemtype": "list",
    "data": [28,96,110]
  },
  { "comment": "Die Templates zur Erfassung des Immunstatus cumulative und timeline
von Patient*innen mit maximalem Versorgungsniveau outpatient, outpatientgp,
normal_ward, icu_undifferentiated, icu, icu_with_ventilation, icu_with_ecmo sind
alle analog wie folgt aufgebaut:"},
  {
    "itemname": "infl.cumulative.immunestatus.outpatientgp",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {
      "Complete": 456,
      "None": 346,
      "Unknown": 2568
    }
  },
  {
    "itemname": "infl.timeline.immunestatus.outpatient",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "Complete": [12,68,76],
      "None": [56,45,32,27],
      "Unknown": [167,245,341,156],
      "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000]}
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.subtypetestresults",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {
      "A_H1N1": 378,
      "A_H3": 451,
      "A_H5": 239,
      "A_nosub": 459,
      "B_Victoria": 345,
      "B_Yamagata": 215,
      "B_nosub": 689,
      "Unknown": 12,
      "Negative": 5679
    }
  },
  {
    "itemname": "infl.timeline.subtypetestresults",

```

```
"itemtype": "list",  
"data": {  
  "A_H1N1": [16,8,5,0],  
  "A_H3": [0,8,15,0],  
  "A_H5": [0,2,6,3],  
  "A_nosub": [2,7,4,12],  
  "B_Victoria": [2,1,3,3],  
  "B_Yamagata": [4,7,3,5],  
  "B_nosub": [12,2,5,0],  
  "Unknown": [10,8,5,7],  
  "Negative": [124,203,89,136],  
  "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000]}  
}  
]
```

```
}
```

Rubrik "KinderRadar"

Übergreifende Festlegungen "KinderRadar"

- Die Auswertung beginnt ab dem Stichtag **01.01.2020**

Parameter	Wertebereich und Beschreibung
Zeitangaben	
"yyyy", "yyyy-mm", "yyyy-mm-dd"	Jahre, Monate oder Tage

Die Rubrik "KinderRadar" gliedert sich in die beiden Sub-Rubriken "Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP)" und "Pädiatrie (PÄD)".

"Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP)"

("Kinder- und Jugendpsychiatrie" / "Child and adolescent psychiatry")

Fallmanagement und Zielgrößen

Step 1 Auswahl:

Die initiale Fallmenge umfasst alle stationären Fälle aller Patient:innen, deren Startdatum innerhalb der ersten 20 Lebensjahre (ausschließlich Tag des 20. Geburtstags) liegt, und bei denen mindestens eine F* Diagnose gemäß "Diagnosen_KJP" vorkommt.

Step 2 Zusammenlegung von Fällen zu Behandlungsepisoden:

Im KJP-Kontext erfolgt die Berechnung von Zielgrößen basierend auf Behandlungsepisoden, die aus der Zusammenlegung von Fällen resultieren. Aufeinander folgende Fälle eines/r Patient:in werden zu einer Behandlungsepisode zusammengelegt, insoweit in deren zeitlicher Abfolge jeweils zwischen Entlassdatum und Aufnahmedatum weniger oder genau 21 Tage liegen. Auch verbleibende (nicht zusammengelegte) Fälle bilden für sich eine Behandlungsepisode. Behandlungsepisoden können somit aus 1-n Ursprungsfällen bestehen und werden im Folgenden kurz als "Episode" bezeichnet. Es ist zu beachten:

- Für jede Episode wird das Aufnahmedatum auf das Aufnahmedatum des frühesten Ursprungsfalles gesetzt und das Entlassdatum auf das Entlassdatum des spätesten Ursprungsfalles gesetzt. Die Dauer der Episode ist die Anzahl der Tage zwischen (erstem) Aufnahmedatum (inklusive) und (letztem) Entlassdatum (inklusive).
- Die Aufenthaltsdauer (length of stay) einer Episode ergibt sich als Summe der Aufenthaltsdauern der eingehenden Ursprungsfälle. Die Aufenthaltsdauer ist somit kürzer als die Dauer der Episode, wenn mehrere Ursprungsfälle eingehen.
- Falls Episoden aus der Zusammenlegung mehrere Fälle resultieren, enthalten sie somit "nicht betreute Tage", die zwar innerhalb der Episode liegen, an denen der/die Patient:in jedoch nicht in der Klinik betreut wurde (Lückentage zwischen Ursprungsfällen). Diese Tage werden in späteren Auswertungen nicht als betreute Tage gezählt.
- Die Diagnosen der Ursprungsfälle werden innerhalb der Episode zusammengeführt, wobei jede Diagnose nur einmal gelistet wird (unique union).
- Daten von Patient:innen, die in den Ursprungsfällen variieren, wie z.B. PLZ bei Umzug oder Geschlecht bei Gendertransition, werden aus dem letzten Ursprungsfall in die Episode übernommen.

Step 3 Filtern:

Nach Abschluss aller Fallzusammenlegungen werden alle Episoden, bei denen der Patient zum Startdatum der Episode 18 Jahre oder älter ist, aus der Gesamtheit der Episoden entfernt und in die Auswertungen nicht einbezogen.

Step 4 Zuordnung zu Diagnoseklassen:

Gemäß "Diagnosen_KJP" (s. unten) werden jeder verbliebenen Episode auf Basis der mit ihr dokumentierten Diagnosen eine oder mehrere Diagnoseklassen zugeordnet.

Step 5 Klassifizierung als Neu- oder Wiederaufnahme:

Jeder verbliebenen Episode wird der Status Wiederaufnahme("status_readmission") oder der Status Neuaufnahme ("status_newadmission") zugeordnet. Eine Episode erhält den Status Wiederaufnahme, wenn eine vorangegangene Episode für diese/n Patient:in existiert, deren Entlassdatum höchstens 182 Tage (6 Monate) vor dem Aufnahmedatum der jeweiligen Episode liegt. Andernfalls erhält sie den Status Neuaufnahme.

Step 6 Ermittlung von Kennzahlen zur Betreuung (siehe Datenitems kira.kjp.*.psychintensivecare*):

Step 6.1: Auf der Basis aller verbliebenen Episoden werden für jeden Kalendertag vom Stichtag bis zum aktuellen Datum folgende **Tages-basierten Kennzahlen** ermittelt:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) die Anzahl der an diesem Tag <u>insgesamt</u> betreuten Patient:innen: | "total_care_days", |
| b) die Anzahl der an diesem Tag <u>intensiv</u> betreuten Patient:innen: | "psychintensive_care_days", |
| c) die Anzahl der an diesem Tag <u>normal</u> betreuten Patient:innen: | "normal_care_days". |
- (durch Differenzbildung "total_care_days" – "psychintensive_care_days").

Für die Ermittlung dieser Kennzahlen gilt:

- Jede Episode erhöht für alle Tage vom Aufnahmedatum der Episode (inklusive) bis zum Entlassdatum der Episode (inklusive) die Kennzahl "total_care_days" des jeweiligen Kalendertag um einen Zählwert, sofern der jeweilige Tag kein "nicht betreuter Tag" ist.
- Jede Episode erhöht für alle Tage vom Aufnahmedatum der Episode (inklusive) bis zum Entlassdatum der Episode (inklusive) die Kennzahl "psychintensive_care_days" des jeweiligen Kalendertages um einen Zählwert, falls für diese Episode am Kalendertag ein OPS-Code (9-67) für intensive (kinder-) psychiatrische Betreuung hinterlegt ist.

Step 6.2: Auf Basis der Kalendertag-basierten Kennzahlen für alle Monate beginnend mit dem Monat des Stichtags bis zum Monat des aktuellen Datums folgende **Kalendermonat-basierten Kennzahlen** aggregiert:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a) die Summe der Kennzahlen "total_care_days" über alle Tage des jeweiligen Monats: | "total_care_days_by_month", |
| b) die Summe der Kennzahlen "psychintensive_care_days" über alle Tage des jeweiligen Monats: | "psychintensive_care_days_by_month", |
| c) die Summe der Kennzahlen "normal_care_days" über alle Tage des jeweiligen Monats: | "normal_care_days_by_month", |

Step 7 Generierung der Datenitems:

Auf Basis der nachfolgend gelisteten "Beschreibungen KJP" werden für jeden "Itemnamen KJP" die entsprechenden Datenstrukturen erstellt.

Step 8 Übermittlung Thresholdlimitierter Items:

Im letzten Schritt vor der Datenübermittlung werden selektierte Items mittels einer Schwellenwert-Abgrenzung modifiziert. Hierbei werden in den zu übermittelnden Datenstrukturen (siehe JSON-Beispiele) alle Zellen / Listenelemente, deren Wert **kleiner oder gleich 3 (inklusive 0)** ist, durch die Textmarkierung "**<= 3**" ersetzt. Solche Items sind in der Definition der Datenitems mit "Thresholded" markiert.

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

Parameter KJP	Wertebereich und Beschreibung
Patient:innen_KJP	
kjp_patient	Patient:in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit mindestens einer diagnostizierten Störung gemäß "Diagnosen_KJP" im Rahmen eines Falls, zu dessen Aufnahmezeitpunkt das Alter des/der Patient:in in eine der "Alterklassen KJP" (s.u.) fällt.
Mittlere_Aufenthaltsdauer_KJP	
kjp_mean_length_of_stay	Die mittlere Aufenthaltsdauer eines/r Patient:in gemäß "Patient:innen_KJP" errechnet als arithmetisches Mittel der Aufenthaltsdauern aller Episoden innerhalb der jeweiligen Episodenmenge im Kontext . Die Aufenthaltsdauer einer Episode ist die Summe der Anzahlen der Tage zwischen Aufnahmedatum (inklusive) und Entlassdatum (inklusive) aller in die Episode eingehenden Ursprungsfälle (s. Fallmanagement und Zielgrößen Step 2).
Diagnosen_KJP_Alle	
kjp_diagnoses_all	"Alle Kinder- und Jugendpsychiatrischen Erkrankungen" / "All child and adolescent psychiatric disorders" gemäß aller "Diagnosen_KJP".
Diagnosen_KJP	
disorders-due-to-substance-use	"Substanzbezogene Störungen" / "Disorders due to substance use" - 'F1: Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen' ICD-Codes: F10.0, F10.1, F10.2, F10.3, F10.4, F10.5, F10.6, F10.7, F10.8, F10.9, F11.0, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, F11.6, F11.7, F11.8, F11.9, F12.0, F12.1, F12.2, F12.3, F12.4, F12.5, F12.6, F12.7, F12.8, F12.9, F13.0, F13.1, F13.2, F13.3, F13.4, F13.5, F13.6, F13.7, F13.8, F13.9, F14.0, F14.1, F14.2, F14.3, F14.4, F14.5, F14.6, F14.7, F14.8, F14.9, F15.0, F15.1, F15.2, F15.3, F15.4, F15.5, F15.6, F15.7, F15.8, F15.9, F16.0, F16.1, F16.2, F16.3, F16.4, F16.5, F16.6, F16.7, F16.8, F16.9, F17.0, F17.1, F17.2, F17.3, F17.4, F17.5, F17.6, F17.7, F17.8, F17.9, F18.0, F18.1, F18.2, F18.3, F18.4, F18.5, F18.6, F18.7, F18.8, F18.9, F19.0, F19.1, F19.2, F19.3, F19.4, F19.5, F19.6, F19.7, F19.8, F19.9
psychotic-disorders	"Psychotische Störungen" / "Psychotic disorders " - 'F2: Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen' ICD-Codes: F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F20.9, F21, F22.0, F22.8, F22.9, F23.0, F23.1, F23.2, F23.3, F23.8, F23.9, F24, F25.0, F25.1, F25.2, F25.8, F25.9, F28, F29
mood-disorders-periodic	"Affektive Störungen (phasisch)" / "Mood disorders (periodic)" - 'F31: Bipolare affektive Störung' - 'F33: Rezidivierende depressive Störung' ICD-Codes: F31.0, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F31.8, F31.9, F33.0, F33.1, F33.2, F33.3, F33.4, F33.8, F33.9
mood-disorders-non-periodic	"Affektive Störungen (nicht-phasisch)" / "Mood disorders (non-periodic)" - 'F30: Manische Episode' - 'F32: Depressive Episode' - 'F34: Anhaltende affektive Störungen' - 'F38: Andere affektive Störungen' - 'F39: Nicht näher bezeichnete affektive Störung'

	- 'F92.0: Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung' ICD-Codes: F30.0, F30.1, F30.2, F30.8, F30.9, F32.0, F32.1, F32.2, F32.3, F32.8, F32.9, F34.0, F34.1, F34.8, F34.9, F38.0, F38.1, F38.8, F39, F92.0
anxiety-disorders	"Angststörungen" / "Anxiety disorders" - 'F40: Phobische Störungen' - 'F41: Andere Angststörungen' - 'F93: Emotionale Störungen des Kindesalters' - 'F94.0: Elektiver Mutismus' ICD-Codes: F40.0, F40.00, F40.01, F40.1, F40.2, F40.8, F40.9, F41.0, F41.1, F41.2, F41.3, F41.8, F41.9, F93.0, F93.1, F93.2, F93.3, F93.8, F93.9, F94.0
obsessive-compulsive-disorder	"Zwangserkrankung" / "Obsessive compulsive disorder" - 'F42: Zwangsstörung' ICD-Codes: F42.0, F42.1, F42.2, F42.8, F42.9
stress-related-disorders	"Stress-assoziierte Erkrankungen" / "Stress related disorders" - 'F43: Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen' - 'F44: Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]' - 'F94.1: Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters' - 'F94.2: Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung' ICD-Codes: F43.0, F43.1, F43.2, F43.8, F43.9, F44.0, F44.1, F44.2, F44.3, F44.4, F44.5, F44.6, F44.6+, F44.7, F44.8, F44.80, F44.81, F44.82, F44.88, F44.88+, F44.9, F94.1, F94.2
eating-disorders	"Essstörungen" / "Eating disorders" - 'F50: Essstörungen' ICD-Codes: F50.0, F50.00, F50.01, F50.08, F50.1, F50.2, F50.3, F50.4, F50.5, F50.8, F50.9
intellectual-developmental-disorders	"Intelligenzminderungen" / "Intellectual developmental disorders" - 'F7: Intelligenzstörung' ICD-Codes: F70.0, F70.1, F70.8, F70.9, F71.0, F71.1, F71.8, F71.9, F72.0, F72.1, F72.8, F72.9, F73.0, F73.1, F73.8, F73.9, F74.0, F74.1, F74.8, F74.9, F78.0, F78.1, F78.8, F78.9, F79.0, F79.1, F79.8, F79.9
specific-developmental-disorders	"Umschriebene Entwicklungsstörungen" / "Specific developmental disorders" - 'F80: Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache' - 'F81: Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten' - 'F82: Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen' - 'F83: Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen' - 'F88: Andere Entwicklungsstörungen' - 'F89: Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung' - 'F98.5: Stottern [Stammeln]' - 'F98.6: Poltern' ICD-Codes: F80.0, F80.1, F80.2, F80.20, F80.28, F80.3, F80.8, F80.9, F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F81.8, F81.9, F82.0, F82.1, F82.2, F82.9, F83, F88, F89, F98.5, F98.6
autism-spectrum	"Autismus-Spektrum" / "Autism spectrum" - 'F84: Tief greifende Entwicklungsstörungen' - 'F94.8: Sonstige Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit' - 'F94.9: Störung sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit, nicht näher bezeichnet' ICD-Codes: F84.0, F84.1, F84.2, F84.3, F84.4, F84.5, F84.8, F84.9, F94.8, F94.9
attention-deficit-hyperactivity-disorder	"Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen" / "Attention deficit hyperactivity disorder" - 'F90: Hyperkinetische Störungen' ICD-Codes: F90.0, F90.1, F90.8, F90.9
conduct-disorders	"Disruptive Verhaltensstörungen" / "Conduct disorders" - 'F90.1: Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens' - 'F91: Störungen des Sozialverhaltens' - 'F92: Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen' ICD-Codes: F90.1, F91.0, F91.1, F91.2, F91.3, F91.8, F91.9, F92.0, F92.8, F92.9

other-psychological-disorders	"Andere psychische Störungen" / "Other psychological disorders" - 'F0: Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen' - 'F45: Somatoforme Störungen' - 'F48: Andere neurotische Störungen' - 'F51: Nichtorganische Schlafstörungen' - 'F52: Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit' - 'F53: Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert' - 'F54: Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten' - 'F55: Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen' - 'F59: Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren' - 'F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen' - 'F95: Ticstörungen' - 'F98.0: Nichtorganische Enuresis' - 'F98.1: Nichtorganische Enkopresis' - 'F98.2: Fütterstörung im frühen Kindesalter' - 'F98.3: Pica im Kindesalter' - 'F98.4: Stereotype Bewegungsstörungen' - 'F98.8: Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend' - 'F98.9: Nicht näher bezeichnete Verhaltens- oder emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend' - 'F99: Psychische Störung ohne nähere Angabe' ICD-Codes: F00.0, F00.1, F00.2, F00.9, F01.0, F01.1, F01.2, F01.3, F01.8, F01.9, F02.0, F02.1, F02.2, F02.3, F02.4, F02.8, F03, F04, F05.0, F05.1, F05.8, F05.9, F06.0, F06.1, F06.2, F06.3, F06.4, F06.5, F06.6, F06.7, F06.8, F06.9, F07.0, F07.1, F07.2, F07.8, F07.9, F09, F45.0, F45.1, F45.2, F45.3, F45.30, F45.31, F45.32, F45.33, F45.34, F45.37, F45.38, F45.39, F45.4, F45.40, F45.41, F45.8, F45.9, F48.0, F48.1, F48.8, F48.9, F51.0, F51.1, F51.2, F51.3, F51.4, F51.5, F51.8, F51.9, F52.0, F52.1, F52.2, F52.3, F52.4, F52.5, F52.6, F52.7, F52.8, F52.9, F53.0, F53.1, F53.8, F53.9, F54, F55.0, F55.1, F55.2, F55.3, F55.4, F55.5, F55.6, F55.8, F55.9, F59, F60.0, F60.1, F60.2, F60.3, F60.30, F60.31, F60.4, F60.5, F60.6, F60.7, F60.8, F60.9, F61, F62.0, F62.1, F62.8, F62.80, F62.88, F62.9, F63.0, F63.1, F63.2, F63.3, F63.8, F63.9, F64.0, F64.1, F64.2, F64.8, F64.9, F65.0, F65.1, F65.2, F65.3, F65.4, F65.5, F65.6, F65.8, F65.9, F66.0, F66.1, F66.2, F66.8, F66.9, F68.0, F68.1, F68.8, F69, F95.0, F95.1, F95.2, F95.8, F95.9, F98.0, F98.00, F98.01, F98.02, F98.08, F98.1, F98.2, F98.3, F98.4, F98.40, F98.41, F98.49, F98.8, F98.80, F98.88, F98.9, F99
Altersklassen KJP	"Alterklassen Kinder- und Jugendpsychiatrie" / "Age groups child and youth psychiatry"
age_kjp_0-5y	"Alter <=5 Jahre" / "Age <=5 years"
age_kjp_6-13y	"Alter 6<=13 Jahre" / "Age 6<=13 years"
age_kjp_14-17y	"Alter 14<=17 Jahre" / "Age 14<=17 years"

Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates

Die im folgenden angeführten Definitionen von Datenitems der **Sub-Rubrik "Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP)"** enthalten in den Item-Templates willkürliche Beispiel-Werte. Es werden generische Daten-Items benutzt, und nur die **farblich hinterlegten Abschnitte** sind mit den aktuellen Daten des Standorts zu füllen.

Die im folgenden angeführten Datenitems (siehe Abschnitte unter "Item-Template / Beispiel") werden in der Lieferdatei umrandet von folgenden Meta-Header-Information eingebettet:

```
{
  "provider": "UKB",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 1588929963,
  "author": "Universitätsklinikum Bonn",
  "dataitems": [
    <Datenitem>,
    <Datenitem>,
    ...
    <Datenitem>
  ]
}
```

kira.kjp.cumulative.diags.age

Beschreibung:

Kollektiv: Alle **Patient:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie** gemäß "Patient:innen_KJP".

Generiert für jeweils eine vom Benutzer ausgewählte Diagnosegruppe gemäß "**Diagnosen_KJP**"* ("**charts**") ein Säulendiagramm, welches die Altersverteilung gemäß "**Altersklassen KJP**" ("**bars**") darstellt. Jede Säule zeigt zwei gestapelte Werte ("**stacks**"), die **Anzahl der Episoden mit** mindestens einer Diagnose aus der Diagnosegruppe ("**in_group**") und die Anzahl der Episoden, die **keine** Diagnose aus der Diagnosegruppe aufweisen ("**out_group**"), jeweils kumuliert über den gesamten Erhebungszeitraum beginnend am Stichtag bis zum Vortag des aktuellen Datums.

*(oder der Gesamtheit aller Diagnosen)

Achsen: y-Achse: Anzahl Episoden, x-Achse: Altersklassen

Geliefert werden für alle Diagnosegruppen ("**charts**") jeweils für alle Alterklassen ("**bars**") die kumulierte Anzahl der Episoden mit und kumulierte Anzahl der Episoden ohne Diagnose in der jeweiligen Diagnosegruppe ("**stacks**").

Thresholding: Ermittelte Anzahlen ≤ 3 werden maskiert als „ ≤ 3 “ angegeben.

Hinweis: Für die Zuordnung von Episoden zu Altergruppen ist das Alter zum Startdatum der Episode bestimmend, bei zusammengeführten Fällen ist das Startdatum des ersten Falls bestimmend. Eine Episode, die mehrere Diagnosen derselben Diagnosegruppe trägt, wird nur einmal gezählt.

Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme

„charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 14 Diagramme für alle Diagnosegruppen, bitte nicht ändern

"bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier jeweils die 6 Altersklassen, bitte nicht ändern

"stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier die 2 Gruppierungen "in_group", "out_group", bitte nicht ändern.

"values": Listet auf erster Ebene ein Array für jede Diagnosegruppe gemäß "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (2 für die Anzahl Episoden mit bzw. ohne eine Diagnose innerhalb der Diagnosegruppe). **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

[illegible]

kira.kjp.cumulative.diags.gender

Beschreibung:

Kollektiv: Alle **Patient:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie** gemäß "Patient:innen_KJP".

Generiert für die Gesamtheit aller Diagnosegruppen gemäß "**Diagnosen_KJP**" ("**bars**") ein zusammenfassendes Säulendiagramm ("**charts**"), in welchem jede Säule innerhalb der jeweiligen Diagnosegruppen die Geschlechterverteilung gemäß "**gender**" darstellt ("**stacks**"), jeweils kumuliert über den gesamten Erhebungszeitraum beginnend am Stichtag bis bis zum letzten Tag des vollständigen Monats vor dem aktuellen Datum.

Achsen: y-Achse: Anzahl Patient:innen, x-Achse: Diagnosegruppen

Geliefert werden für alle Diagnosegruppen ("**bars**") die Anzahl Patient:innen pro Geschlecht ("**stacks**").

Thresholding: Ermittelte Anzahlen ≤ 3 werden maskiert als „ ≤ 3 “ angegeben.

Hinweis: Pro Diagnosegruppe wird ein Patient maximal einmal gezählt.

Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme

„charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle Diagnosegruppen, bitte nicht ändern

"bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier 14 Diagnoseklassen, bitte nicht ändern

"stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 3 Werte für die Geschlechter, bitte nicht ändern

"values": Listet auf erster Ebene ein Array für jede Diagnosegruppe gemäß "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (3 für die Geschlechter). **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.kjp.cumulative.diags.gender",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["kjp_diagnoses_all"],
    "bars": ["disorders-due-to-substance-use", "psychotic-disorders", "mood-disorders-periodic", "mood-disorders-non-periodic", "anxiety-disorders", "obsessive-compulsive-disorder", "stress-related-disorders", "eating-disorders", "intellectual-developmental-disorders", "specific-developmental-disorders", "autism-spectrum", "attention-deficit-hyperactivity-disorder", "conduct-disorders", "other-psychological-disorders"],
    "stacks": ["male", "female", "diverse"],
    "values": [
      [
        [130,150,10], [160,190,9], [170,160,8], [110,100,"<=3"], [180,140,7], [150,190,6], [150,160,9],
        [170,160,"<=3"], [100,110,6], [180,170,4], [150,190,7], [150,160,"<=3"], [120,110,9],
        [130,140,5]
      ]
    ]
  }
}
```

kira.kjp.cumulative.diags.lengthofstay

Beschreibung:

Kollektiv: Alle **Patient:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie** gemäß "Patient:innen_KJP".

Generiert ein Diagramm ("**charts**") zur Darstellung der **durchschnittlichen Aufenthaltsdauer** der Patient:innen kumuliert über den gesamten Erhebungszeitraum beginnend am Stichtag bis zum Vortag des aktuellen Kalenderdatums. Jede Säule zeigt die Aufenthaltsdauer für die jeweilige Diagnosegruppe ("**bars**") gemäß "**Diagnosen_KJP**".

Achsen: y-Achse: Tage, x-Achse: Diagnosegruppen

Geliefert werden für alle Diagnosegruppen ("**bars**") jeweilige durchschnittliche Aufenthaltsdauern gemäß "Mittlere_Aufenthaltsdauer_KJP" ("**stacks**").

Thresholding: Ohne Thresholding.

Hinweis: Aufenthaltsdauern werden jeweils als **arithmetisches Mittel** unter Ausschluss 1-tägiger Aufenthalte als Dezimalzahl gerundet auf eine Nachkommastelle berechnet

```

.# Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme
# „charts“:      Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle Diagnosegruppen, bitte nicht ändern
# "bars":        Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier 14 Diagnoseklassen, bitte nicht ändern
# "stacks":      Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 1 Werte für die Angabe
                  der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer, bitte nicht ändern
# "values":      Listet auf erster Ebene ein Array für jede Diagnosegruppe gemäß "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag
                  gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (1). Bitte die Datenstrukturen in "values"
                  gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.

```

Item-Template / Beispiel:

```

{
  "itemname": "kira.kjp.cumulative.diags.lengthofstay",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["kjp_diagnoses_all"],
    "bars": [
      ["disorders-due-to-substance-use", "psychotic-disorders", "mood-disorders-periodic", "mood-disorders-non-periodic", "anxiety-disorders", "obsessive-compulsive-disorder", "stress-related-disorders", "eating-disorders", "intellectual-developmental-disorders", "specific-developmental-disorders", "autism-spectrum", "attention-deficit-hyperactivity-disorder", "conduct-disorders", "other-psychological-disorders"]
    ],
    "stacks": ["kjp_mean_length_of_stay"],
    "values": [
      [
        [50.0], [69.1], [77.2], [72.3], [70.4], [64.5], [41.6], [50.7], [69.8], [77.9], [72.0], [70.1], [64.2], [41.3]
      ]
    ]
  }
}

```


kira.kjp.timeline.age

Beschreibung:

Kollektiv: Alle **Patient:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie** gemäß "Patient:innen_KJP".

Generiert eine Zeitverlaufgraphik („charts“), die beginnend am Monat des Stichtags bis zum letzten vollständigen Monat vor dem aktuellen Kalenderdatum jeweils **pro Monat** („bars“) die **Verteilung der Episoden über die Altersklassen** gemäß "Altersklassen KJP" als gestapelte Säulen („stacks“) darstellt.

Achsen: y-Achse: Anzahl Episoden, x-Achse: Monate

Geliefert werden für den jeweiligen Monat („bars“) und für alle Alterklassen die **Anzahl der in diesem Monat startenden Episoden**, bei denen das Alter des/der Patient:in zum Zeitpunkt des Episodenstarts in die **jeweilige Alterklasse** fällt („stacks“).

Thresholding: Ermittelte Anzahlen ≤ 3 werden maskiert als „ ≤ 3 “ angegeben.

Hinweis: Für die Zuordnung von Episoden zu Altergruppen ist das Alter zum Startdatum der Episode bestimmend.

```
# Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme (bilden einen Zeitverlauf ab)
# „charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle KJP-Patienten, bitte nicht ändern
# „bars“: Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, bitte hier alle Monate in der Notation yyyy-mm
beginnend im Monat des Stichtags bis zum letzten vollständigen Monat vor dem aktuellen Kalenderdatum .
# "stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 3 Altersklassen, bitte
nicht ändern
# "values": Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars"
die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (3 Altersklassen). Bitte die Datenstrukturen in "values"
gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.
```

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.kjp.timeline.age",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["kjp_patient"],
    "bars": [{"2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06"}],
    "stacks": ["age_kjp_0-5y", "age_kjp_6-13y", "age_kjp_14-17y"],
    "values": [
      [ [25, 41, 12], [27, 46, 10], [26, 40, 11], [31, 38, 16], [22, 42, 14], [25, 43, 14] ]
    ]
  }
}
```

kira.kjp.timeline.psychintensivecare

Beschreibung:

Kollektiv: Alle **Patient:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie** gemäß "Patient:innen_KJP".

Generiert eine Zeitverlaufgraphik, die beginnend am **Monat** des Stichtags bis zum letzten vollständigen Monat vor dem aktuellen Kalenderdatum jeweils **pro Monat** ("bars") innerhalb einer Säule gestapelt zwei Werte ("stacks") darstellt, die **Summe der intensiv betreuten Tage** ("psychintensive_care_days_by_month"), und die **Summe der normal betreuten Tage** ("normal_care_days_by_month").

Achsen: y-Achse: Anzahl Tage, x-Achse: Monate

Geliefert werden für alle **Monate** ("bars") beginnend am Monat des Stichtags bis zum Monat des aktuellen Kalendertags jeweils pro Monat ein Tupel ("stacks") bestehend jeweils aus den Kennzahlen "psychintensive_care_days_by_month" und "normal_care_days_by_month" des jeweiligen Monats.

Thresholding: Ermittelte Anzahlen ≤ 3 werden maskiert als „ ≤ 3 “ angegeben.

Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme (bilden einen Zeitverlauf ab)
 # „charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle KJP-Patienten, bitte nicht ändern
 # "bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, **bitte hier alle Monate in der Notation yyyy-mm beginnend im Monat des Stichtags bis zum letzten vollständigen Monat vor dem aktuellen Kalenderdatum**.
 # "stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 2 Angaben zu Versorgungsleistungen, bitte nicht ändern
 # "values": Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (2 Angaben zu Versorgungsleistungen). **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen**.

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.kjp.timeline.psychintensivecare",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["kjp_patient"],
    "bars": [["2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06"]],
    "stacks": [["psychintensive_care_days_by_month", "normal_care_days_by_month"]],
    "values": [
      [ [5, 4], [5, 4], [5, 4], [5, 4], [5, 4], [5, 4] ]
    ]
  }
}
```

kira.kjp.timeline.psychintensivecare_ratio

Beschreibung:

Kollektiv: Alle **Patient:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie** gemäß "Patient:innen_KJP".

Generiert eine Zeitverlaufgraphik („charts“), die beginnend mit dem Monat des Stichtags bis zum letzten vollständigen Monat vor dem aktuellen Kalenderdatum jeweils pro Monat („bars“) den **Anteil intensiv betreuter Tage** in der Menge **insgesamt betreuter Tage** prozentual (0% bis 100%) in einer Säule („stacks“) darstellt.

Achsen: y-Achse: relativer Anteil in Prozent, x-Achse: Monate

Geliefert werden für alle vollständigen Monate beginnend mit dem Monat des Stichtags bis zum letzten vollständigen Monat („bars“) vor dem aktuellen Kalenderdatum ein Tupel bestehend aus "psychintensive_care_days_by_month" und "normal_care_days_by_month" des jeweiligen Monats („stacks“). Für die Darstellung wird ein Quotient berechnet, welcher "psychintensive_care_days_by_month" im Zähler und die Summe aus "psychintensive_care_days_by_month" und "normal_care_days_by_month" im Nenner berücksichtigt.

Thresholding: Ermittelte Anzahlen <=3 werden maskiert als „<=3“ angegeben.

```
# Generischer Datentyp für gruppierte Säulendiagramme mit Berechnungsformel (bilden einen Zeitverlauf ab)
# „charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle KJP-Patienten, bitte nicht ändern
# "bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, bitte hier alle Monate in der Notation yyyy-mm beginnend im Monat des Stichtags bis zum letzten vollständigen Monat vor dem aktuellen Kalenderdatum.
# "groups": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" die pro "bar" gruppiert darzustellenden Säulenwerte, hier ein Säulenwert, bitte nicht ändern
# "calculations": Definiert die Formel zur Berechnung der in "groups" darzustellenden Säulenwerte, hier eine Formel zur Berechnung eines Verhältniswerts, bitte nicht ändern. Für alle in "bars" gelisteten Monat wird jeweils das Verhältnis der Anzahl intensiv betreuter Tage des aktuellen Monats zu der Anzahl insgesamt betreuter Tagen des aktuellen Monats berechnet.
# "params": Definiert die Parameter, die in Berechnung gemäß "formular" eingehen, bitte nicht ändern (die Parameterwerte bestimmen sich gemäß "values").
# "values": Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die Parameterwerte, die in die Berechnung gemäß "calculations" der gruppiert anzuzeigenden Säulenwerte gemäß "groups" Werte eingehen. Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.
```

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.kjp.timeline.psychintensivecare_ratio",
  "itemtype": "groupedbarcharts_calc",
  "data": {
    "charts": ["kjp_patient"],
    "bars": [ "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06" ],
    "groups": ["ratio_psychintensive_total_care_days_by_month"],
    "calculations":
      ["$ratio_psychintensive_total_care_days_by_month=100*($psychintensive_care_days_by_month/($psychintensive_care_days_by_month+$normal_care_days_by_month))"],
    "params": [
      ["psychintensive_care_days_by_month", "normal_care_days_by_month"]
    ],
    "values": [
      [ [120, 240]],
      [ [180, 250]],
      [ [220, 290]],
      [ [210, 270]],
      [ [190, 280]],
      [ [205, 260]]
    ]
  ]
}
```

```
}
}
```

kira.kjp.timeline.psychintensivecare_change

Beschreibung:

Kollektiv: Alle **Patient:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie** gemäß "Patient:innen_KJP".

Generiert eine Zeitverlaufgraphik („charts“), für alle 12 vollständigen Monate vor dem aktuellen Kalenderdatum („bars“), welche die **Abweichung** der **intensiv betreuten Tage** des jeweiligen Monats von **der durchschnittlichen Anzahl intensiv betreuter Tage** gebildet über die jeweils vorangehenden 12 Monate darstellt.

Achsen: y-Achse: Abweichung in absoluten Zahlen, x-Achse: Monat (letzte 12 Monate)

Geliefert werden für alle 12 vollständigen Monate vor dem aktuellen Kalenderdatum („bars“) die **Differenz** zwischen der **Kennzahl** "psychintensive_care_days_by_month" des jeweiligen Monats und dem auf ganze Zahlen gerundeten **Mittelwert aller Kennzahlen** "psychintensive_care_days_by_month" aus allen 12 Monaten, die dem jeweiligen Monat vorausgehen („stacks“).

Thresholding: Ohne Thresholding.

Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme (bilden einen Zeitverlauf ab)

„charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle KJP-Patienten, bitte nicht ändern

"bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier 6 Diagnoseklassen, bitte hier alle Monate in der Notation yyyy-mm für den Zeitraum beginnend 12 Monate vor dem letzten vollständigen Monat vor dem aktuellen Kalenderdatum bis zum letzten vollständigen Monat vor dem aktuellen Kalenderdatum.

"stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier ein Wert, bitte nicht ändern

"values": Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" den gestapelt in der Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Wert. Bitte hier für alle Monate gemäß "bars" den berechneten Differenzwert angeben (Differenz zwischen der Anzahl intensiv betreuter Tage und dem Mittelwert der Anzahl intensiv betreuter Tage über die vorhergehenden 12 Monate)..

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.kjp.timeline.psychintensivecare_change",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["kjp_patient"],
    "bars": ["2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12",
             "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06"],
    "stacks": ["diff_intensive_meanpsychintensive_care_days_by_month"],
    "values": [
      [ [-1], [5], [2], [-2], [4], [3], [-1], [5], [2], [-2], [4], [3] ]
    ]
  }
}
```

kira.kjp.cumulative.psychintensivecare_3months

Beschreibung:

Kollektiv: Alle **Patient:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie** gemäß "Patient:innen_KJP".

Generiert eine Graphik, die zwei gruppierte Säulen anzeigt. Die erste Säule zeigt den prozentualen **Anteil intensiv betreuter Tage** in der Menge **insgesamt betreuter Tage** auf Basis aller Betreuungstage im **Zeitraum**, der **die letzten drei vollständigen Monate** vor dem aktuellem Datum umfasst. Die zweite Säule zeigt den gleichen Anteil berechnet auf Basis der gleichen **drei Monate des Vorjahres**.

Achsen: y-Achse: Anteil in Prozent, x-Achse: 3-Monats-Zeitraum Vorjahr und 3-Monats-Zeitraum zum aktuellen Datum

Geliefert werden für zwei dreimonatige Zeiträume („bars“) jeweils zwei Tupel bestehend aus erstens der Summe der intensiv betreuten Tage („psychintensive_care_days_3m“) und der Summe der insgesamt betreuten Tage („total_care_days_3m“) und zweitens den entsprechenden Summen aus dem gleichen Zeitraum im Vorjahr (*_py im Item-Beispiel). Die beiden in („bars“) anzugebenden Zeitspannen sind so festzulegen, dass die zweite dreimonatige Zeitspanne mit dem letzten vollständigen Monat vor dem aktuellen Kalendardatum endet und die erste dreimonatige Zeitspanne äquivalent für das Vorjahr festzulegen ist.

Thresholding: Ermittelte Anzahlen <=3 werden maskiert als „<=3“ angegeben.

Generischer Datentyp für gruppierte Säulendiagramme mit Berechnungsformel (bilden einen Zeitverlauf ab)

„charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle KJP-Patienten, bitte nicht ändern

„bars“: Listet für jedes Diagramm gemäß „charts“ Benennungen der Säulen. **Bitte zwei dreimonatige Zeitspannen angeben. Die zweite Zeitspanne bitte mit dem letzten vollständigen Monat vor dem aktuellen Kalendardatum enden lassen und die erste Zeitspanne bitte äquivalent für das Vorjahr angeben**

„groups“: Listet für jedes Diagramm gemäß „charts“ die pro „bar“ gruppiert darzustellenden Säulenwerte, hier ein Säulenwert, bitte nicht ändern

„calculations“: Definiert die Formel zur Berechnung der in „groups“ darzustellenden Säulenwerte, hier eine Formel zur Berechnung eines Verhältniswerts, bitte nicht ändern. **Für alle in „bars“ gelisteten Tage werden jeweils gemäß „groups“ zwei Säulenwerte berechnet, erstens das Verhältnis der Anzahl intensiv betreuter Tage zu der Anzahl insgesamt betreuter Tage jeweils in den letzten drei vollständigen Monaten vor dem aktuellem Datum, und zweitens werden die gleichen Säulenwerte basierend auf den selben Zeiträume im vorausgegangenen Jahr berechnet.**

„params“: Definiert die Parameter, die in Berechnung gemäß „formular“ eingehen, bitte nicht ändern (die Parameterwerte bestimmen sich gemäß „values“).

„values“: Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm „charts“, und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß „bars“ die Parameterwerte, die in die Berechnung gemäß „formular“ der gruppiert anzuzeigenden Säulenwerte gemäß „groups“ Werte eingehen. **Bitte die Datenstrukturen in „values“ gemäß „params“ mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.kjp.cumulative.psychintensivecare_3months",
  "itemtype": "groupedbarcharts_calc",
  "data": {
    "charts": ["kjp_patient"],
    "bars": [ "2024-09 to 2024-11 / 2025-09 to 2025-11" ],
    "groups": ["ratio_psychintensive_total_care_days_3m_py",
               "ratio_psychintensive_total_care_days_3m"],
    "calculations":
      ["$ratio_psychintensive_total_care_days_3m_py=100*($psychintensive_care_days_3m_py/$total_care_days_3m_py)",
       "$ratio_psychintensive_total_care_days_3m=100*($psychintensive_care_days_3m/ $total_care_days_3m)"],
    "params": [
      ["psychintensive_care_days_3m_py", "total_care_days_3m_py"],
      ["psychintensive_care_days_3m", "total_care_days_3m"]
    ],
    "values": [
      [ [210,450], [310,540] ]
    ]
  }
}
```

```
}
}
```

kira.kjp.timeline.admission

Beschreibung:

Kollektiv: Alle **Patient:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie** gemäß "Patient:innen_KJP".

Generiert eine Zeitverlaufgraphik („charts“) beginnend in dem Jahres-Quartal, welches dem Jahres-Quartal des Stichtags folgt, bis zum letzten vollständigen Jahres-Quartal vor dem aktuellen Kalenderdatum, die für das jeweilige **Jahres-Quartal** („bars“) die **Anzahl aller wiederaufgenommenen** und die **Anzahl aller neu aufgenommenen Episoden** in einer **gestapelten Säule** („groups“) dargestellt.

Achsen: y-Achse: Anzahl Episoden, x-Achse: Jahresquartale

Geliefert werden pro Quartal („bars“) jeweils ein Tupel („groups“) bestehend aus erstens der Anzahl aller Episoden mit Status „status_readmission“ und zweitens der Anzahl aller Episoden mit Status „status_newadmission“.

Thresholding: Ermittelte Anzahlen <=3 werden maskiert als „<=3“ angegeben.

Generischer Datentyp für gruppierte Säulendiagramme (bilden einen Zeitverlauf ab)

„charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle KJP-Patienten, bitte nicht ändern

„bars“: Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier Jahres-Quartal. **Bitte hier alle Quartale in der Notation yyyy-qq beginnend mit dem zweiten Quartal 2020 bis zum Quartal des aktuellen Kalenderdatums listen**.

"stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 2 Angaben, bitte nicht ändern:

ncs_readmission = Anzahl Episoden im Status Wiederaufnahme ("status_readmission")

ncs_newadmission = Anzahl Episoden im Status Neuaufnahme ("status_newadmission")

"values": Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (2 Angaben zu Versorgungsleistungen). **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen**.

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.kjp.timeline.admission",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["kjp_patient"],
    "bars": ["2020-Q2", "2020-Q3", "2020-Q4", "2021-Q1", ..., "2025-Q2"],
    "stacks": ["ncs_readmission", "ncs_newadmission"],
    "values": [
      [
        [220, 520], [190, 490], [180, 480], [210, 510], ..., [220, 520] ]
      ]
    ]
  }
}
```

kira.kjp.timeline.diags.admission

Beschreibung:

Kollektiv: Alle **Patient:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie** gemäß "Patient:innen_KJP".

Generiert für jeweils eine vom Benutzer **ausgewählte Diagnosegruppe** eine Zeitverlaufgraphik („charts“), beginnend mit dem Jahr des Stichtags bis zum letzten vollständigen Jahr vor dem aktuellen Kalenderdatums, welche über alle Jahre („bars“) die **Anzahl aller wiederaufgenommenen** und die **Anzahl aller neu aufgenommenen Episoden** als gestapelte **Säulen** („groups“) dargestellt.

Achsen: y-Achse: Anzahl Episoden, x-Achse: Jahre

Geliefert werden pro Jahr („bars“) jeweils ein Tupel („stacks“) bestehend aus erstens der Anzahl aller Episoden mit Status „**status_readmission**“ und zweitens der Anzahl aller Episoden mit Status „**status_newadmission**“, wobei alle berücksichtigten Episoden eine Diagnose aus der vom Benutzer ausgewählte Diagnosegruppe enthalten müssen.

Thresholding: Ermittelte Anzahlen ≤ 3 werden maskiert als „ ≤ 3 “ angegeben.

Hinweis: Für die Zuordnung zu einer Diagnosegruppe gilt die im Dokument beschriebene Diagnoseklassifikation. Wiederaufnahmen sind definiert gemäß „Wiederaufnahme_KJP“.

```
# Generischer Datentyp für gruppierte Säulendiagramme (Säulen bilden einen Zeitverlauf ab)
# „charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 14 Diagramme für alle Diagnosegruppen, bitte nicht ändern
# „bars“: Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen. Bitte hier alle Jahre in der Notation yyyy beginnend
           im Jahr 2020 bis zum letzten vollständigen Jahr vor dem aktuellen Kalenderdatums listen.
# „stacks“: Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" die Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier die 2 Angaben, bitte
           nicht ändern:
           ncs_readmission = Anzahl Episoden im Status Wiederaufnahme ("status_readmission")
           ncs_newadmission = Anzahl Episoden im Status Neuaufnahme ("status_newadmission")
# „values“: Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars"
           die anzuzeigenden Werte gemäß "stacks" Werte (hier gemäß "bars" 6 Arrays der Länge 2 gemäß "stacks"). Bitte die
           Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.
```

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.kjp.timeline.diags.admission",
  "itemtype": "stackedbarcharts_uniform",
  "data": {
    "charts": ["disorders-due-to-substance-use", "psychotic-disorders", "mood-disorders-periodic", "mood-disorders-non-periodic",
              "anxiety-disorders", "obsessive-compulsive-disorder", "stress-related-disorders", "eating-disorders", "intellectual-
              developmental-disorders", "specific-developmental-disorders", "autism-spectrum", "attention-deficit-hyperactivity-
              disorder", "conduct-disorders", "other-psychological-disorders"],
    "bars": ["2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025"],
    "stacks": ["ncs_readmission", "ncs_newadmission"],
    "values": [ [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ],
                  [ [11,21], [12,22], [13,23], [14,24], [15,25], [16,26] ] ] ]
  }
}
```

"Pädiatrie (PÄD)"

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

Parameter Pädiatrie (Fallzahlen)	Wertebereich und Beschreibung
Patient:innen_Pädiatrie	
pediatric_patients	Alle Patient:innen mit mindestens einem vollstationärem Falls, zu dessen Aufnahmedatum das Alter des/der Patient:in eine der "Altersklassen_Pädiatrie" fällt.
Altersklassen_Pädiatrie	
age_pediatric_0-3m	"Alter <=3 Monate" / "Age <=3 months"
age_pediatric_4-12m ¹	"Alter 4<=12 Monate" / "Age 4<=12 months"
age_pediatric_1-2y	"Alter 1<=2Jahre" / "Age 1<=2 years"
age_pediatric_3-5y	"Alter 3<=5 Jahre" / "Age 3 <=5 years"
age_pediatric_6-12y	"Alter 6<=12 Jahre" / "Age 6<=12 years"
age_pediatric_13-17y	"Alter 13<18 Jahre" / "Age 13<18 years"

"Pädiatrie (Fallzahlen)"

("Fallzahlen pädiatrische Stationen" / "Case numbers paediatric wards")

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

Parameter Pädiatrie (Fallzahlen)	Wertebereich und Beschreibung
Behandlungsniveaus_Pädiatrie	
treatmentlevels_pediatric	"Normal_ward_pediatric" – Stationär, nicht intensivpflichtig "PICU_no_ventilation" – Intensiv-stationär ohne Beatmung "PICU_with_highflow" – Intensiv-stationär mit Highflow "PICU_with_NIV_CPAP" – Intensiv-stationär mit CPAP-Beatmung "PICU_with_invasive_ventilation" – Intensiv-stationär mit invasiver Beatmung (ohne ECMO) "PICU_with_ecmo" – Intensiv-stationär mit invasiver Beatmung und ECMO "PICU_undifferentiated" – Intensiv-stationär undifferenziert²

¹ In diese Klasse fallen alle Kleinkinder mit einem Alter ab 4 Monaten, die ihren 1. Geburtstag noch nicht erreicht haben.

² nur falls zwischen Intensivaufenthalten mit/ohne Beatmung bzw. ECMO nicht unterschieden werden kann.

Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates

Die im folgenden angeführten Definitionen von Datenitems der **Sub-Rubrik "Pädiatrie (PÄD)"** enthalten in den Item-Templates willkürliche Beispiel-Werte. Es werden generische Daten-Items benutzt, und nur die **farblich hinterlegten Abschnitte** sind mit den aktuellen Daten des Standorts zu füllen.

Die im folgenden angeführten Datenitems (siehe Abschnitte unter "Item-Template / Beispiel") werden in der Lieferdatei umrandet von folgenden Meta-Header-Information eingebettet:

```
{
  "provider": "UKB",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 1588929963,
  "author": "Universitätsklinikum Bonn",
  "dataitems": [
    <Datenitem>,
    <Datenitem>,
    ...
    Datenitem
  ]
}
```

kira.ped.current.zipcode

Beschreibung:

Kollektiv: Derzeit in stationärer Behandlung befindliche Pädiatrie-Patient:innen gemäß „Patient:innen_Pädiatrie“.

Geliefert werden **für alle Pädiatrie-Patient:innen** die **fünfstelligen Postleitzahlen**, an denen diese **ansässig** sind, als aufsteigend sortierte Liste. Postleitzahlen können demnach mehrfach auftreten.

Hinweis: Postleitzahlen wegen einer ggf. **führend enthaltenen "0"** nicht als Zahlenwert, sondern als String (in Anführungszeichen) geführt. Patient:innen aus dem Ausland werden als Missing ("null") geführt.

Generischer Datentyp für eine nach Postleitzahlen des Bundesgebiets gegliederte geographische Karte

"data" : **Listet auf erster Ebene die Postleitzahlen der Wohnorte von Patient:innen aufsteigend sortiert.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.current.zipcode",
  "itemtype": "list",
  "data": ["53111", "53113", "53113", "53115", "53117", "53121", "53125", ... , "53177"]
}
```

kira.ped.current.treatmentlevel

Beschreibung:

Kollektiv: Derzeit in stationärer Behandlung befindliche Pädiatrie-Patient:innen gemäß „Patient:innen_Pädiatrie“.

Generiert wird eine Säulengraphik, die für alle Versorgungsniveaus gemäß "Behandlungsniveaus_Pädiatrie" jeweils anhand einer Säule die Anzahlen aktuell zugeordneter Patienten im Kollektiv darstellt.

Aktuelles Versorgungsniveau pädiatrischer Patient:innen: **Anzahl** pädiatrischer **Patient:innen auf den definierten Versorgungsniveaus** gemäß "Behandlungsniveaus_Pädiatrie" zum Zeitpunkt des Datenexports.

Die Rangfolge der Versorgungsniveaus:

"Normal_ward_pediatric",
 "PICU_no_ventilation",
 "PICU_with_highflow",
 "PICU_with_NIV_CPAP",
 "PICU_with_invasive_ventilation",
 "PICU_with_ecmo",
 "PICU_undifferentiated"

Geliefert werden also pro Versorgungsniveau jeweils eine Anzahl (Ganzzahl ≥ 0).

Beispiel: pädiatrischer Patient:in, dessen Beatmung beendet werden konnte, der aber noch auf der Intensivstation liegt, wird hier als "PICU_no_ventilation" geführt.

Generischer Datentyp für Säulendiagramme

"data" : *Listet auf erster Ebene unter verschiedenen Kategorien (hier Versorgungsniveaus) zugeordnete Anzahlen von Patienten*

Item-Template / Beispiel *:

```
{
  "itemname": "kira.ped.current.treatmentlevel",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {
    "Normal_ward_pediatric": 40,
    "PICU_no_ventilation": 10,
    "PICU_with_highflow": 9,
    "PICU_with_NIV_CPAP": 8,
    "PICU_with_invasive_ventilation": 7,
    "PICU_with_ecmo": 6,
    "PICU_undifferentiated": 5
  }
}
```

* Bitte beachten, dass eine Lieferung entweder **nur** Angaben zu "Normal_ward_pediatric" und "PICU_undifferentiated" beinhalten darf, oder Angaben zu "Normal_ward_pediatric" und zu den **fünf** spezifischen ICU-Kategorien "PICU_no_ventilation", ... , "PICU_with_ecmo".

kira.ped.timeline.maxtreatmentlevel

Beschreibung:

Kollektiv: Alle pädiatrischen Patient:innen gemäß „Patient:innen_Pädiatrie“ mit einem vollstationärem Behandlungsfall.

Generiert wird eine Zeitverlaufsgraphik, die für alle Versorgungsniveaus gemäß "Behandlungsniveaus_Pädiatrie" jeweils anhand einer Linie im Zeitverlauf die Anzahlen der Patienten im Kollektiv darstellt.

Für alle **Versorgungsniveaus** gemäß "Behandlungsniveaus_Pädiatrie" werden jeweils **Anzahlen** (Ganzzahlen ≥ 0) von pädiatrischen **Patient:innen** angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr entsprechend versorgt wurden. Patient:innen werden **in dem höchsten an dem jeweiligen Tag genutzten Versorgungsniveau** gezählt.

Die Datums-Folge "date" sollte möglichst **alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn** bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

Generischer Datentyp für Linien-Zeitverlaufsgraphiken

#"data" : Listet auf erster Ebene unter den Kategorien (hier Versorgungsniveaus) zugeordnete **Anzahlen von Patienten gemäß der Datumsfolge, welche mit der Kategorie "date" definiert wird.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.timeline.maxtreatmentlevel",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "Normal_ward_pediatric": [41,39,40,45],
    "PICU_no_ventilation": [7,11,9,10],
    "PICU_with_highflow": [4,2,3,1],
    "PICU_with_NIV_CPAP": [2,0,1,4],
    "PICU_with_invasive_ventilation": [2,1,0,1],
    "PICU_with_ecmo": [0,2,0,1],
    "PICU_undifferentiated": [1,2,3,4],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000]
  }
}
```

* Bitte beachten, dass eine Lieferung entweder **nur** Angaben "Normal_ward_pediatric" und "PICU_undifferentiated" beinhalten darf, oder "Normal_ward_pediatric" und vollständig die Angaben zu den **fünf** spezifischen ICU-Kategorien, also "PICU_no_ventilation", ..., "PICU_with_ecmo".

"Pädiatrie (RSV)"

("Pädiatrie respiratorisches Synzytial-Virus" / "Paediatrics respiratory syncytial virus")

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

Parameter Pädiatrie (RSV)	Wertebereich und Beschreibung
Patient:innen_RSV	
rsv_patients	Alle Patient:innen mit mindestens einer diagnostizierten Erkrankung gemäß "Diagnosen_RSV" im Rahmen eines Falls, zu dessen Aufnahmedatum das Alter des/der Patient:in in eine der "Alterklassen_RSV" fällt.
Mittlere_Aufenthaltsdauer_RSV	
rsv_mean_length_of_stay	Die mittlere Aufenthaltsdauer eines/r Patient:in gemäß "Patient:innen_RSV" errechnet als arithmetisches Mittel der Aufenthaltsdauern aller Fälle innerhalb der jeweiligen Fallmenge im Kontext . Die Aufenthaltsdauer eines Falls ist die Anzahl der Tage zwischen Aufnahmedatum (inklusive) und Entlassdatum (inklusive) innerhalb eines Falls nach Fallzusammenlegung (s. Fallmanagement und Zielgrößen Step 1 bis 3).
Diagramme_RSV	
rsv_diagnoses_all	"Alle Diagnosen zum respiratorischen Synzytial-Virus" / "All respiratory syncytial virus diagnoses" gemäß "Diagnosen_RSV"
Diagnosen_RSV	
rsv_acute_bronchiolitis	"Akute RSV-Bronchiolitis (J21.0)" / "Acute RSV bronchiolitis (J21.0)"
rsv_acute_bronchitis	"Akute RSV-Bronchitis (J20.5)" / "Acute RSV bronchitis (J20.5)"
rsv_pneumonia	"RSV-Pneumonie (J12.1)" / "RSV pneumonia (J12.1)"
rsv_caused_disease	"RSV andere (B97.4)" / "RSV others (B97.4)"
PCR_Test_RSV	
rsv_pcr	PCR-Nachweis für das Respiratorische Synzytial-Virus A / B gemäß LOINC-Codes: 101298-8, 101425-7, 101426-5, 30075-6, 30076-4, 40988-8, 60271-4, 76088-4, 76089-2, 77022-2, 77023-0, 80597-8, 80598-6, 82176-9, 85479-4, 88202-7, 88204-3, 88528-5, 88595-4, 88597-0, 91133-9, 91794-8, 91795-5, 92131-2, 92957-0

Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates

Die im folgenden angeführten Definitionen von Datenitems der **Sub-Rubrik "Pädiatrie (PÄD)"** enthalten in den Item-Templates willkürliche Beispiel-Werte. Es werden generische Daten-Items benutzt, und nur die **farblich hinterlegten Abschnitte** sind mit den aktuellen Daten des Standorts zu füllen.

Die im folgenden angeführten Datenitems (siehe Abschnitte unter "Item-Template / Beispiel") werden in der Lieferdatei umrandet von folgenden Meta-Header-Information eingebettet:

```
{
  "provider": "UKB",
```

```
"dashboard_dataset_version": "0.5.5",
"exporttimestamp": 1588929963,
"author": "Universitätsklinikum Bonn",
"dataitems": [
  <Datenitem>,
  <Datenitem>,
  ...
  Datenitem
]
```

kira.ped.rsv.cumulative.diags.zipcode

Beschreibung:

Kollektiv: Alle Pädiatrie-Patient:innen gemäß "Patient:innen_RSV".

Geliefert werden für alle Pädiatrie-Patient:innen die **fünfstelligen Postleitzahlen**, an denen diese **ansässig** sind, als aufsteigend sortierte Liste gemäß der definierten RSV-Diagnoseklassen. Postleitzahlen können demnach mehrfach auftreten.

Hinweis: Postleitzahlen werden wegen einer ggf. **führend enthaltenen "0"** nicht als Zahlenwert sondern als String (in Anführungszeichen) geführt. Patient:innen aus dem Ausland werden als Missing ("**null**") geführt.

Generischer Datentyp für nach Postleitzahlen des Bundesgebiets gegliederte geographische Karten
 # „charts“: Jeder Eintrag definiert eine selektierbare Kartendarstellung, hier eine Darstellung alle RSV-Diagnosen zusammenfassend und vier Darstellung für die einzelnen RSV-Diagnosen, bitte nicht ändern
 # "values": **Listet auf zweiter Ebene jeweils die Postleitzahlen gemäß "charts" die Postleitzahlen der Wohnorte von Patient:innen aufsteigend sortiert**.

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.rsv.cumulative.diags.zipcode",
  "itemtype": "chartlist",
  "data": {
    "charts": ["rsv_diagnoses_all", "rsv_acute_bronchitis", "rsv_acute_bronchiolitis", "rsv_pneumonia",
      "rsv_caused_disease"],
    "values": [
      ["53111", "53113", "53113", "53115", "53117", "53121", "53125", ... , "53177"],
      ["53111", "53113", "53113", "53115", "53117", "53121", "53125", ... , "53177"],
      ["53111", "53113", "53113", "53115", "53117", "53121", "53125", ... , "53177"],
      ["53111", "53113", "53113", "53115", "53117", "53121", "53125", ... , "53177"],
      ["53111", "53113", "53113", "53115", "53117", "53121", "53125", ... , "53177"]
    ]
  }
}
```

kira.ped.rsv.cumulative.diags.age

Beschreibung:

Kollektiv: Alle Pädiatrie-Patient:innen gemäß "Patient:innen_RSV".

Generiert für die Gesamtheit aller Diagnosen gemäß "**Diagnosen_RSV**" ("**charts**") ein Säulendiagramm, welches die Altersverteilung gemäß "**Altersklassen_Pädiatrie**" ("**bars**") darstellt. Jede Säule ("**stacks**") zeigt die **Anzahlen der Patient:innen** gemäß "Diagnosen_RSV".

y-Achse: Anzahl Patient:innen, x-Achse: Altersklassen

Geliefert werden für alle Alterklassen ("**bars**") die jeweilige Anzahl von Patient:innen kummulierte über alle Diagnosen ("**stacks**").

Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme

„charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle Diagnosen, bitte nicht ändern

"bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier 7 Altersgruppen, bitte nicht ändern

"stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 4 Werte für die spezifischen RSV-Diagnosen, bitte nicht ändern

"values": Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm gemäß "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (für 4 RSV-Diagnosen). **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.rsv.cumulative.diags.age",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["kjp_patient"],
    "bars": ["age_pediatic_0-3m", "age_pediatic_4-12m", "age_pediatic_1-2y", "age_pediatic_3-5y",
      "age_pediatic_6-12y", "age_pediatic_13-17y"],
    "stacks": ["rsv_acute_bronchitis", "rsv_acute_bronchiolitis", "rsv_pneumonia",
      "rsv_caused_disease"],
    "values": [
      [
        [1, 5, 0, 0],
        [10, 46, 5, 5],
        [84, 127, 3, 1],
        [260, 135, 2, 54],
        [208, 220, 1, 50],
        [201, 242, 1, 80]
      ]
    ]
  }
}
```

kira.ped.rsv.cumulative.diags.gender

Beschreibung:

Kollektiv: Alle Pädiatrie-Patient:innen gemäß "Patient:innen_RSV".

Generiert für alle Diagnosen gemäß "**Diagnosen_RSV**" ("**bars**") ein zusammenfassendes Säulendiagramm ("**charts**"), in welchem jede Säule die Geschlechterverteilung gemäß "**gender**" für die jeweilige Diagnose darstellt ("**stacks**").

y-Achse: Anzahl Patient:innen, x-Achse: RSV-Diagnosen

Geliefert werden für alle Diagnosen die Anzahl Patient:innen pro Geschlecht ("**stacks**").

Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme

„charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle Diagnosen, bitte nicht ändern

"bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier 4 Diagnosen, bitte nicht ändern

"stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 3 Werte für die Geschlechter, bitte nicht ändern

"values": Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm gemäß "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (für 3 Geschlechter). **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.rsv.cumulative.diags.gender",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["rsv_diagnoses_all"],
    "bars": ["rsv_acute_bronchitis", "rsv_acute_bronchiolitis", "rsv_pneumonia", "rsv_caused_disease"],
    "stacks": [["male", "female", "diverse"]],
    "values": [
      [ [ 57766, 42966, 12 ], [ 2147, 4368, 0 ], [ 16258, 17074, 7 ], [ 950, 619, 0 ] ]
    ]
  }
}
```

kira.ped.rsv.cumulative.diags.lengthofstay

Beschreibung:

Kollektiv: Alle Pädiatrie-Patient:innen gemäß "Patient:innen_RSV".

Generiert ein Diagramm ("**charts**") zur Darstellung der **durchschnittlichen Aufenthaltsdauer** der Patient:innen im Erhebungszeitraum. Jede Säule zeigt die Aufenthaltsdauer für die jeweilige Diagnose ("**bars**") gemäß "**Diagnosen_RSV**" ("**stacks**").

y-Achse: Tage, x-Achse: Diagnosegruppen

Geliefert werden für alle Diagnosen ("**bars**") jeweilige durchschnittliche Aufenthaltsdauern gemäß "Mittlere_Aufenthaltsdauer_KJP" ("**stacks**").

Hinweis: Aufenthaltsdauern werden jeweils als **arithmetisches Mittel** unter Ausschluss 1-tägiger Aufenthalte als Dezimalzahl gerundet auf eine Nachkommastelle berechnet.

Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme

„charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle Diagnosen, bitte nicht ändern

"bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier 4 Diagnosen, bitte nicht ändern

"stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 1 Werte für die Angabe der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer, bitte nicht ändern

"values": Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm gemäß "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (für 1 Angabe der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer). Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.rsv.cumulative.diags.lengthofstay",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["rsv_diagnoses_all"],
    "bars": [["rsv_acute_bronchitis", "rsv_acute_bronchiolitis", "rsv_pneumonia",
              "rsv_caused_disease"]],
    "stacks": [["rsv_mean_length_of_stay"]],
    "values": [
      [ [ 45.0 ], [ 31.1 ], [ 25.2 ], [ 2.3 ] ]
    ]
  }
}
```

kira.ped.rsv.timeline.diags.occurrence

Beschreibung:

Kollektiv: Alle Pädiatrie-Patient:innen gemäß "Patient:innen_RSV".

Generiert für die Gesamtheit aller Diagnosen gemäß "**Diagnosen_RSV**" * ("**charts**") eine Zeitverlaufsgraphik, die beginnend mit dem Monat des Stichtag bis zum aktuellen Monat jeweils pro Monat ("**bars**") innerhalb einer Säule gestapelt die **Anzahlen der Patient:innen** (als Ganzzahlen ≥ 0) für alle Diagnosen gemäß "Diagnosen_RSV" zeigt ("**stacks**").

y-Achse: Anzahl Patient:innen, x-Achse: Monate

Geliefert werden jeweilige Anzahlen Patient:innen für alle Monate ("**bars**") und Diagnosen ("**stacks**").

Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme (bilden einen Zeitverlauf ab)

„charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle Diagnosegruppen, bitte nicht ändern

"bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, bitte hier alle Monate in der Notation yyyy-mm beginnend vom Jan. 2020 bis zum Monat der aktuellen Datenlieferung listen .

"stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 4 Diagnosen, bitte nicht ändern

"values": Listet auf erster Ebene ein Array für jedes Diagramm "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (4 Diagnosen). Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.rsv.timeline.diags.occurrence",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["rsv_diagnoses_all"],
    "bars": [{"2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06"}],
    "stacks": ["rsv_acute_bronchitis", "rsv_acute_bronchiolitis", "rsv_pneumonia", "rsv_caused_disease"],
    "values": [
      [
        [5, 4, 0, 1],
        [5, 4, 0, 1],
        [5, 4, 0, 1],
        [5, 4, 0, 1],
        [5, 4, 0, 1],
        [5, 4, 0, 1]
      ]
    ]
  }
}
```

kira.ped.rsv.timeline.age

Beschreibung:

Kollektiv: Alle Pädiatrie-Patient:innen gemäß "Patient:innen_Pädiatrie" mit einem vollstationären Behandlungsfall.

Generiert wird eine Zeitverlaufgraphik, die für alle Altersklassen gemäß "Altersklassen_Pädiatrie" jeweils anhand einer Linie im Zeitverlauf die Anzahlen zugeordneter Patienten im Kollektiv darstellt.

Für alle **Altersklassen** gemäß "**Altersklassen_Pädiatrie**" werden jeweils **Anzahlen** (Ganzzahlen ≥ 0) von pädiatrischen **Patient:innen** angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr entsprechend versorgt wurden. Patient:innen werden ihrer an diesem Tag zugeordneten Altersgruppe gezählt.

Die Datums-Folge "date" sollte möglichst **alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn** bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

Generischer Datentyp für Zeitverlaufsgraphiken

#"data" : Listet auf erster Ebene unter den Kategorien (hier Altersklassen) zugeordnete Anzahlen von Patienten gemäß der Datumsfolge, welche mit der Kategorie "date" definiert wird. **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.rsv.timeline.age",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_4-12m": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_1-2y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_3-5y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_6-12y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_13-17y": [22,20,25,30],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000] }
}
```

kira.ped.rsv.timeline.age.pcr

Beschreibung:

Kollektiv: Alle Pädiatrie-Patient:innen gemäß "Patient:innen_Pädiatrie" mit einem vollstationären Behandlungsfall und mit einem positivem PCR-Nachweis des Respiratorische Synzytial-Virus A / B gemäß "PCR_Test_RSV".

Generiert wird eine Zeitverlaufsgraphik, die für alle Altersklassen gemäß "Altersklassen_Pädiatrie" jeweils anhand einer Linie im Zeitverlauf die Anzahlen positiv getesteter Patienten im Kollektiv darstellt.

Für alle **Altersklassen** gemäß "**Altersklassen_Pädiatrie**" werden jeweils **Anzahlen** (Ganzzahlen ≥ 0) von pädiatrischen **Patient:innen** angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr entsprechend versorgt wurden. Patient:innen werden ihrer an diesem Tag zugeordneten Altersgruppe gezählt.

Die Datums-Folge "date" sollte möglichst **alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn** bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

Generischer Datentyp für Zeitverlaufsgraphiken

"data" : Listet auf erster Ebene unter den Kategorien (hier Altersklassen) zugeordnete Anzahlen von Patienten gemäß der Datumsfolge, welche mit der Kategorie "date" definiert wird. **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.rsv.timeline.age.pcr",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_4-12m": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_1-2y": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_3-5y": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_6-12y": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_13-17y": [2,0,4,3],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000] }
}
```

"Pädiatrie (Influenza)"

("Pädiatrie Influenza" / "Paediatrics Influenza")

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

Parameter Pädiatrie (Influenza)	Wertebereich und Beschreibung
Patient:innen_Influenza	
influenza_patients	Alle Patient:innen mit mindestens einer diagnostizierten Erkrankung gemäß "Diagnosen_Influenza" im Rahmen eines Falls, zu dessen Aufnahmedatum das Alter des/der Patient:in eine der "Alterklassen_Pädiatrie" fällt.
Diagnosen_Influenza	
influenza_pneumonia	"Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen (J10.0)"
influenza_other_airways	"Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen (J10.1)"
influenza_other	"Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen (J10.8)"
influenza_virus_detection	"Sonstiges Influenza-Virus, nachgewiesen (U69.24!)"
PCR_Test_Influenza	
influenza_pcr	PCR-Nachweis für Influenza-Virus A / B gemäß LOINC-Codes: 100343-3, 100344-1, 100973-7, 100974-5, 101292-1, 101293-9, 101294-7, 101295-4, 101423-2, 101424-0, 101983-5, 29906-5, 29907-3, 34487-9, 38270-5, 38271-3, 38272-1, 40982-1, 44795-3, 49520-0, 49521-8, 49523-4, 49524-2, 49526-7, 49527-5, 49528-3, 49531-7, 49535-8, 50700-4, 53607-8, 55464-2, 55465-9, 57985-4, 60267-2, 60494-2, 60530-3, 60538-6, 61366-1, 62462-7, 62860-2, 68986-9, 68987-7, 74785-7, 74786-5, 76077-7, 76078-5, 76079-3, 76080-1, 77026-3, 77027-1, 77028-9, 80588-7, 80589-5, 80590-3, 80591-1, 81428-5, 82166-0, 82167-8, 82168-6, 82169-4, 82170-2, 85477-8, 85478-6, 85778-9, 86569-1, 86572-5, 88193-8, 88195-3, 88592-1, 88596-2, 88599-6, 88600-2, 92141-1, 92142-9, 92808-5, 92809-3, 92976-0, 92977-8, 93397-8, 94394-4, 94395-1, 94396-9, 95658-1, 99623-1

Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates

Die im folgenden angeführten Definitionen von Datenitems der **Sub-Rubrik "Pädiatrie (PÄD)"** enthalten in den Item-Templates willkürliche Beispiel-Werte. Es werden generische Daten-Items benutzt, und nur die **farblich hinterlegten Abschnitte** sind mit den aktuellen Daten des Standorts zu füllen.

Die im folgenden angeführten Datenitems (siehe Abschnitte unter "Item-Template / Beispiel") werden in der Lieferdatei umrandet von folgenden Meta-Header-Information eingebettet:

```
{
  "provider": "UKB",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 1588929963,
  "author": "Universitätsklinikum Bonn",
  "dataitems": [
    <Datenitem>,
    <Datenitem>,
  ]
}
```

```

    ...
    <Datenitem>
  ]
}

```

kira.ped.influenza.timeline.age

Beschreibung:

Kollektiv: Alle pädiatrischen Patient:innen gemäß "Patient:innen_Influenza" und mit einem vollstationären Behandlungsfall.

Generiert wird eine Zeitverlaufsgraphik, die für alle Altersklassen gemäß "Altersklassen_Pädiatrie" jeweils anhand einer Linie im Zeitverlauf die Anzahlen der Patienten im Kollektiv darstellt.

Für alle **Altersklassen** gemäß "**Altersklassen_Pädiatrie**" werden jeweils **Anzahlen** (Ganzzahlen ≥ 0) von pädiatrischen **Patient:innen** angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr entsprechend versorgt wurden. Patient:innen werden ihrer an diesem Tag zugeordneten Altersgruppe gezählt.

Die Datums-Folge "date" sollte möglichst **alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn** bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

Generischer Datentyp für Zeitverlaufsgraphiken

"data" : Listet auf erster Ebene unter den Kategorien (hier Altersklassen) zugeordnete Anzahlen von Patienten gemäß der Datumsfolge, welche mit der Kategorie "date" definiert wird. **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```

{
  "itemname": "kira.ped.influenza.timeline.age",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_4-12m": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_1-2y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_3-5y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_6-12y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_13-17y": [22,20,25,30],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000] }
}

```

kira.ped.influenza.timeline.age.pcr

Beschreibung:

Kollektiv: Alle Pädiatrie-Patient:innen gemäß "Patient:innen_Influenza" mit einem vollstationären Behandlungsfall und mit einem positivem PCR-Nachweis von Influenza-Virus A and B gemäß "PCR_Test_Influenza".

Generiert wird eine Zeitverlaufsgraphik, die für alle Altersklassen gemäß "Altersklassen_Pädiatrie" jeweils anhand einer Linie im Zeitverlauf die Anzahlen der Patienten im Kollektiv darstellt.

Für alle **Altersklassen** gemäß "**Altersklassen_Pädiatrie**" werden jeweils **Anzahlen** (Ganzzahlen ≥ 0) von pädiatrischen **Patient:innen** angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr ein positiver RSV PCR-Nachweis erbracht wurde. Patient:innen werden ihrer an diesem Tag zugeordneten Altersgruppe gezählt.

Die Datums-Folge "date" sollte möglichst **alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn** bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

Generischer Datentyp für Zeitverlaufsgraphiken

"data" : Listet auf erster Ebene unter den Kategorien (hier Altersklassen) zugeordnete Anzahlen von Patienten gemäß der Datumsfolge, welche mit der Kategorie "date" definiert wird. **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.influenza.timeline.age.pcr",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_4-12m": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_1-2y": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_3-5y": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_6-12y": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_13-17y": [2,0,4,3],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000] }
}
```

"Pädiatrie (Covid)"

("Pädiatrie Covid" / "Paediatrics Covid")

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

Parameter Pädiatrie (Covid)	Wertebereich und Beschreibung
Patient:innen_Covid	
covid_patients	Alle Patient:innen mit mindestens einer diagnostizierten Erkrankung gemäß "Diagnosen_Covid" im Rahmen eines Falls, zu dessen Aufnahmedatum das Alter des/der Patient:in eine der "Alterklassen_Pädiatrie" fällt.
Diagnosen_Covid	
covid_virus_detection	„Covid-19, Virus nachgewiesen (U07.1!)“
PCR_Test_Covid	
covid_pcr	PCR-Nachweis für SARS-CoV-2 (COVID-19) gemäß LOINC-Codes: 96752-1, 96756-2, 96757-0, 96957-6, 94640-0, 96765-3, 96763-8, 96986-5, 95409-9, 94760-6, 94533-7, 95425-5, 94766-3, 94316-7, 97098-8, 98132-4, 98494-8, 94559-2, 95824-9, 94639-2, 98131-6, 98493-0, 94534-5, 96120-1, 96123-5, 96091-4, 94314-2, 105749-6, 94759-8, 94845-5, 101289-7, 105748-8, 94767-1, 94641-8, 96448-6, 96958-4, 106617-4, 95406-5, 94565-9, 96797-6, 95608-6, 94500-6, 94660-8, 108180-1, 94309-2, 96829-7, 94756-4, 94757-2, 94307-6, 94308-4

Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates

Die im folgenden angeführten Definitionen von Datenitems der **Sub-Rubrik "Pädiatrie (PÄD)"** enthalten in den Item-Templates willkürliche Beispiel-Werte. Es werden generische Daten-Items benutzt, und nur die **farblich hinterlegten Abschnitte** sind mit den aktuellen Daten des Standorts zu füllen.

Die im folgenden angeführten Datenitems (siehe Abschnitte unter "Item-Template / Beispiel") werden in der Lieferdatei umrandet von folgenden Meta-Header-Information eingebettet:

```
{
  "provider": "UKB",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 1588929963,
  "author": "Universitätsklinikum Bonn",
  "dataitems": [
    <Datenitem>,
    <Datenitem>,
    ...
    Datenitem
  ]
}
```

kira.ped.covid.timeline.age

Beschreibung:

Kollektiv: Alle pädiatrischen Patient:innen gemäß "Patient:innen_Covid" mit einem vollstationären Behandlungsfall.
Generiert wird eine Zeitverlaufgraphik, die für alle Altersklassen gemäß "Altersklassen_Pädiatrie" jeweils anhand einer Linie im Zeitverlauf die Anzahlen der Patienten im Kollektiv darstellt.

Für alle **Altersklassen** gemäß "**Altersklassen_Pädiatrie**" werden jeweils **Anzahlen** (Ganzzahlen ≥ 0) von pädiatrischen **Patient:innen** angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr entsprechend versorgt wurden. Patient:innen werden ihrer an diesem Tag zugeordneten Altersgruppe gezählt.

Die Datums-Folge "date" sollte möglichst **alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn** bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

Generischer Datentyp für Zeitverlaufgraphiken

#"data" : Listet auf erster Ebene unter den Kategorien (hier Altersklassen) zugeordnete Anzahlen von Patienten gemäß der Datumsfolge, welche mit der Kategorie "date" definiert wird. **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.covid.timeline.age",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_4-12m": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_1-2y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_3-5y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_6-12y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_13-17y": [22,20,25,30],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000] }
}
```

kira.ped.covid.timeline.age.pcr

Beschreibung:

Kollektiv: Alle Pädiatrie-Patient:innen gemäß "Patient:innen_Covid" mit einem vollstationären Behandlungsfall und mit einem positivem PCR-Nachweis von SARS-CoV-2 (COVID-19) gemäß "PCR_Test_Covid".

Generiert wird eine Zeitverlaufgraphik, die für alle Altersklassen gemäß "Altersklassen_Pädiatrie" jeweils anhand einer Linie im Zeitverlauf die Anzahlen der Patienten im Kollektiv darstellt.

Für alle **Altersklassen** gemäß "**Altersklassen_Pädiatrie**" werden jeweils **Anzahlen** (Ganzzahlen ≥ 0) von pädiatrischen **Patient:innen** angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr entsprechend versorgt wurden. Patient:innen werden ihrer an diesem Tag zugeordneten Altersgruppe gezählt.

Die Datums-Folge "date" sollte möglichst **alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn** bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

Generischer Datentyp für Zeitverlaufsgraphiken

"data" : Listet auf erster Ebene unter den Kategorien (hier Altersklassen) zugeordnete Anzahlen von Patienten gemäß der Datumsfolge, welche mit der Kategorie "date" definiert wird. **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.covid.timeline.age.pcr",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_4-12m": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_1-2y": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_3-5y": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_6-12y": [2,0,43],
    "age_pediatric_13-17y": [2,0,4,3],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000] }
}
```

"Pädiatrie (Keuchhusten)"

("Pädiatrie Keuchhusten" / "Paediatrics pertussis")

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

Parameter Pädiatrie (Keuchhusten)	Wertebereich und Beschreibung
Patient:innen_Keuchhusten	
pertussis_patients	Alle Patient:innen mit mindestens einer diagnostizierten Erkrankung gemäß "Diagnosen_Keuchhusten" im Rahmen eines Falls, zu dessen Aufnahmedatum das Alter des/der Patient:in eine der "Alterklassen_Pädiatrie" fällt.
Diagnosen_Keuchhusten	
pertussis_bordetella_pertussis	"Keuchhusten durch Bordetella pertussis (A37.0)"
pertussis_bordetella_parapertussis	"Keuchhusten durch Bordetella parapertussis (A37.1)"
pertussis_bordetella_other	"Keuchhusten durch sonstige Bordetella Spezies (A37.8)"
pertussis_non_specific	"Keuchhusten nicht näher bezeichnet (A37.9)"
PCR_Test_Keuchhusten	
pertussis_pcr	PCR-Nachweis für Bordetella Pertussis gemäß LOINC-Codes: 101284-8, 23826-1, 43913-3, 80600-0, 82179-3, 85360-6, 91815-1, 91869-8, 92128-8, 92857-2, 92858-0, 94365-4, 94478-5, 96962-6

Definition öffentlicher Datenitems / JSON-Templates

Die im folgenden angeführten Definitionen von Datenitems der **Sub-Rubrik "Pädiatrie (PÄD)"** enthalten in den Item-Templates willkürliche Beispiel-Werte. Es werden generische Daten-Items benutzt, und nur die **farblich hinterlegten Abschnitte** sind mit den aktuellen Daten des Standorts zu füllen.

Die im folgenden angeführten Datenitems (siehe Abschnitte unter "Item-Template / Beispiel") werden in der Lieferdatei umrandet von folgenden Meta-Header-Information eingebettet:

```
{
  "provider": "UKB",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 1588929963,
  "author": "Universitätsklinikum Bonn",
  "dataitems": [
    <Datenitem>,
    <Datenitem>,
    ...
    Datenitem
  ]
}
```

kira.ped.pertussis.timeline.age

Beschreibung:

Kollektiv: Alle pädiatrischen Patient:innen gemäß "Patient:innen_Keuchhusten" und mit einem vollstationären Behandlungsfall.

Generiert wird eine Zeitverlaufgraphik, die für alle Altersklassen gemäß "Altersklassen_Pädiatrie" jeweils anhand einer Linie im Zeitverlauf die Anzahlen der Patienten im Kollektiv darstellt.

Für alle **Altersklassen** gemäß "**Altersklassen_Pädiatrie**" werden jeweils **Anzahlen** (Ganzzahlen ≥ 0) von pädiatrischen **Patient:innen** angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr entsprechend versorgt wurden. Patient:innen werden ihrer an diesem Tag zugeordneten Altersgruppe gezählt.

Die Datums-Folge "date" sollte möglichst **alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn** bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

Generischer Datentyp für Zeitverlaufsgraphiken

#"data" : Listet auf erster Ebene unter den Kategorien (hier Altersklassen) zugeordnete Anzahlen von Patienten gemäß der Datumsfolge, welche mit der Kategorie "date" definiert wird. **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.pertussis.timeline.age",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_4-12m": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_1-2y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_3-5y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_6-12y": [22,20,25,30],
    "age_pediatric_13-17y": [22,20,25,30],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000] }
}
```

kira.ped.pertussis.timeline.age.pcr

Beschreibung:

Kollektiv: Alle Pädiatrie-Patient:innen gemäß "Patient:innen_Keuchhusten" mit einem vollstationären Behandlungsfall und mit einem positivem PCR-Nachweis von Bordetella Pertussis gemäß "PCR_Test_Keuchhusten".

Generiert wird eine Zeitverlaufsgraphik, die für alle Altersklassen gemäß "Altersklassen_Pädiatrie" jeweils anhand einer Linie im Zeitverlauf die Anzahlen der Patienten im Kollektiv darstellt.

Für alle **Altersklassen** gemäß "**Altersklassen_Pädiatrie**" werden jeweils **Anzahlen** (Ganzzahlen ≥ 0) von pädiatrischen **Patient:innen** angegeben, die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr entsprechend versorgt wurden. Patient:innen werden ihrer an diesem Tag zugeordneten Altersgruppe gezählt.

Die Datums-Folge "date" sollte möglichst **alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn** bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

Generischer Datentyp für Zeitverlaufsgraphiken

"data" : Listet auf erster Ebene unter den Kategorien (hier Altersklassen) zugeordnete Anzahlen von Patienten gemäß der Datumsfolge, welche mit der Kategorie "date" definiert wird. **Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.**

Item-Template / Beispiel:

```
{
  "itemname": "kira.ped.pertussis.timeline.age.pcr",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_4-12m": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_1-2y": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_3-5y": [2,0,4,3],
    "age_pediatric_6-12y": [2,0,43],
    "age_pediatric_13-17y": [2,0,4,3],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000] }
}
```

Rubrik "Projekt-Dashboards"

Unter dieser Rubrik werden Projekte zusammenfassend geführt, deren Inhalte und Teilnehmer im weiteren beschreiben sind. Das erste hier realisierte Projekt ist ACRIBiS (Verbesserung der kardiovaskulären Risikoidentifizierung durch Synthese strukturierter klinischer Dokumentation und aus Biosignalen abgeleiteten Phänotypen) ein Medizininformatik-Use Case der MII

Besondere Festlegungen

- Der Bereich umfasst Darstellungen, die auf der Grundlage von Datenlieferungen von Partner erstellt werden, die sich in definierten Dashboard-Projekten zusammengeschlossen haben.
- Darstellungen können öffentlich allen Dashboard-Nutzer zugänglich sein, oder sind eingeschränkt nach Authorisierung den teilnehmenden Standorten vorbehalten.

Projekt ACRIBIS (ACR)

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

- Die Auswertung beginnt ab dem Stichtag 01.10.2024
- Alle Patient*innen haben das ACRIBiS MII-BC-Ergänzungsmodul unterzeichnet

Parameter	Wertebereich und Beschreibung
Lieferanten	
acr_provider	Charité Universitätsmedizin Berlin CHARITE Medizinische Hochschule Hannover MHH Medizinische Universität Lausitz-Carl Thiem MUL-CT Universitätsklinikum Augsburg UKAU Universitätsklinikum Bonn UKB Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden UKDD Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz UM Universitätsklinikum Essen UME Universitätsklinikum Freiburg UKFR Universitätsmedizin Göttingen UMG Universitätsklinikum Heidelberg UKHD Universitätsklinikum Leipzig UKL Universitätsklinikum Münster UKM Universitätsklinikum Schleswig-Holstein UKSH Universitätsklinikum Technische Universität München TUM Universitätsklinikum Ulm UKU Universitätsklinikum Würzburg UKW
Rekrutierung	
acr_recruitment_consent	"ACRIBiS MII-BC" / "ACRIBiS MII-BC" Die Gruppe der Patient*innen, die das ACRIBiS MII-BC-Ergänzungsmodul unterzeichnet haben.
acr_recruitment_followup	"Nachfolgeuntersuchung" / "Follow-up" Die Gruppe der Patient*innen, die das ACRIBiS MII-BC-Ergänzungsmodul unterzeichnet haben, und bei denen folgend auf die Aufnahmeuntersuchung nach 12 Monaten oder später eine Nachfolgeuntersuchung erfolgte.

Kohorten	
acr_cohort_1	"Kohorte 1" / "Cohort 1" (Barcelona-Bio-HF 3.0 Score) Die Gruppe der Patient*innen, die das ACRIBiS MII-BC-Ergänzungsmodul unterzeichnet haben, die die allgemeinen Ein- und Ausschlusskriterien erfüllen und die folgende <u>Entlassdiagnosen</u> aufweisen bzw. nicht besitzen. Einschluss: • Alter: ≥18 Jahre • Chronische Herzinsuffizienz (ICD: I50) gemäß der European Society of Cardiology-Leitlinie Ausschluss: • Kardiogener Schock (ICD: R57.0), • Mitralklappenstenose (ICD: I05.0, I05.2), • Angeborene Fehlbildung der Aorten- und der Mitralklappe (ICD: Q23), • Angeborene Fehlbildungen des Herzens • Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen (ICD: Q20), • Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten (ICD: Q21), • Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe (ICD: Q22), • Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens (ICD: Q24)
acr_cohort_k2	"Kohorte 2" / "Cohort 2" (CHA₂DS₂VAScore) Die Gruppe der Patient*innen, die das ACRIBiS MII-BC-Ergänzungsmodul unterzeichnet haben, die die allgemeinen Ein- und Ausschlusskriterien erfüllen und die folgende <u>Entlassdiagnosen</u> aufweisen bzw. nicht besitzen. Einschluss: • Alter: ≥18 Jahre • Dokumentiertes Vorhofflimmern (ICD: I48) (EKG oder Holter Aufnahmen) innerhalb der letzten 12 Monate (oder bei Index-Hospitalisierung ???) Ausschluss: • Angeborene Fehlbildungen des Herzens • Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen (ICD: Q20), • Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten (ICD: Q21), • Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe (ICD: Q22), • Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens (ICD: Q24)
acr_cohort_k3	"Kohorte 3" / "Cohort 3" (SMART-Score)

	Die Gruppe der Patient*innen, die das ACRIbIS MII-BC-Ergänzungsmodul unterzeichnet haben, die die allgemeinen Ein- und Ausschlusskriterien erfüllen und die folgende <u>Entlassdiagnosen</u> aufweisen bzw. nicht besitzen. Einschluss: • Alter: ≥18 Jahre • Akuter Myokardinfarkt (ICD: I21), • Akutes Koronarsyndrom (ICD: I24), • Koronare und arterielle Revaskularisierung (Bypassoperation (OPS: 5-361, 5-362), Gefäßangioplastie (OPS: 8-836.0, 8-36.1, 836.2)), • Nachgewiesene Arteriosklerose in der Bildgebung (Koronarangiografie (OPS: 1-275), arterieller Ultraschall), • Schlaganfall (ICD: I63), • TIA (ICD: G45.9), • Aortenaneurysma (ICD: I71), • Periphere arterielle Verschlusskrankheit (ICD: I70.2) Ausschluss: Angeborene Fehlbildungen des Herzens • Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen (ICD: Q20), • Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten (ICD: Q21), • Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe (ICD: Q22), • Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens (ICD: Q24)
Diagramme	
acr_project	"Projekt ACRIbIS" / "Project ACRIbIS"
acr_all_cohorts	"Alle ACRIbIS Kohorten" / "All cohorts defined for ACRIbIS" Gesamtheit aller für ACRIbIS definierten Kohorten
Messwerte	
acr_number_patients	"Anzahl Patient*innen" / "Number of patients"
acr_number_patients_cohort	"Anzahl Patient*innen Kohorte" / "Number of patients cohort" Anzahl der Patient*innen, die die Ein- und Ausschlusskriterien der jeweiligen Kohorte erfüllen

Definition Datenitems

Vorbemerkungen

Sichtbarkeit von Datenitems

- Die Datenitems "acr.current.recruitment" und "acr.timeline.recruitment" sind in der der öffentlichen Ansicht des Dashboards sichtbar. Alle anderen Datenitems sind ausschließlich den Projektpartnern gemäß "acr_provider" vorbehalten.
- Mit einer Standort-Anmeldung am Dashboard erhalten die Projektpartner gemäß "acr_provider" Zugriff auf die eigene Drilldown-Standortansicht und die aller Projektpartner.

Zählung von Patient:innen

- Patient*innen werden in verschiedenen Kohorten gemäß "Patient*Innen_ACR" ggf. mehrfach gezählt, wenn sie die Ein- und Ausschlusskriterien mehrerer Kohorten erfüllen. Innerhalb einer Kohorte werden Patient:innen maximal einmal gezählt.

Datenitems	Beschreibung
acr.current.recruitment	Kollektiv: Patient*innen, die mindestens der Datennutzungs- und Recontacting-Option des MII Broad Consent sowie dem ACRIBiS MII-BC-Ergänzungsmodul – Option Follow up - zugestimmt haben Es werden die aktuelle Anzahl rekrutierter Patient*innen (gemäß "acr_recruitment_consent") und die aktuelle Anzahl rekrutierter Patient*innen mit dokumentierter Followup-Untersuchung (gemäß "acr_recruitment_followup") als Ganzzahlen ≥ 0 angegeben.
acr.timeline.recruitment	Kollektiv: Patient*innen, die mindestens der Datennutzungs- und Recontacting-Option des MII Broad Consent sowie dem ACRIBiS MII-BC-Ergänzungsmodul – Option Follow up - zugestimmt haben Für jeden Wert in der Datumsfolge "date" werden (gemäß "acr_recruitment_status") jeweils die aktuelle Anzahl rekrutierter Patient*innen (gemäß "acr_recruitment_consent") und die aktuelle Anzahl rekrutierter Patient*innen mit dokumentierter Followup-Untersuchung (gemäß "acr_recruitment_followup") des jeweiligen Kalendertages als Ganzzahlen ≥ 0 angegeben. Die Datums-Folge "date" umfasst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis zum Vortag der Lieferung (inkl.).

acr.current.dischargediams.kohorts	Kollektiv: Patient*innen, die Teil einer Kohorte (gemäß "Kohorten") sind. Für alle Kohorten gemäß "Kohorten" werden die Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) der Patient:innen angegeben, für die am aktuellen Kalendertag zum Zeitpunkt der Datenausleitung eine Kombination von Entlassdiagnosen dokumentiert ist, welche laut Entlassdokumentation die Ein- und Ausschlusskriterien der jeweiligen Kohorte vollständig erfüllt. Patient:innen können für mehrere Kohorten gezählt werden, für eine Kohorte jedoch maximal einmal.
acr.timeline.dischargediams.kohorts	Kollektiv: Patient*innen, die Teil einer Kohorte (gemäß "Kohorten") sind. Für alle Kohorten gemäß "Kohorten" werden die Anzahlen (Ganzzahlen ≥ 0) der Patient:innen angegeben, für die jeweils an den in der Datums-Folge "date" gelisteten Kalendertagen zum Zeitpunkt der Datenausleitung eine Kombination von Entlassdiagnosen dokumentiert ist, welche laut Entlassdokumentation die Ein- und Ausschlusskriterien der jeweiligen Kohorten vollständig erfüllen. Patient:innen können für mehrere Kohorten gezählt werden, für eine Kohorte jedoch maximal einmal. Die Datums-Folge "date" umfasst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis zum Vortag der Lieferung (inkl.) umfassen.

JSON-Beispiele

Die Werte folgender Beispiele sind willkürlich. Es werden generische Itemtypes benutzt, nur die farblich hinterlegten Abschnitte sind mit den aktuellen Daten zu füllen.

```
{
  "provider": "UKB",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 1588929963,
  "author": "Universitätsklinikum Bonn",
  "dataitems": [
    # Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme
    # „charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für das Projekt ACRIBiS, bitte nicht ändern
    # "bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier 2 Angaben zum Rekrutierungsstatus, bitte nicht ändern
    # "stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 1 Wert für die Gesamtzahl jeweiliger Patient*innen, bitte nicht ändern
    # "values": Listet auf erster Ebene ein Array für jede Diagnosegruppe gemäß "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte. Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.
    {
      "itemname": "acr.current.recruitment",
      "itemtype": "stackedbarcharts",
      "data": {
        "charts": ["acr_project"],
        "bars": [["acr_recruitment_consent", "acr_recruitment_followup"]],
        "stacks": [["acr_number_patients"]],
        "values": [
          [
            143, 5
          ]
        ]
      }
    },
    # Generischer Datentyp für Zeitverläufe
    # "acr_recruitment_consent": Ein Array gleicher Länge wie "date" bestehend aus einer Abfolge von Ganzzahlen, die für jeweiligen (gleicher Index im Array) Messzeitpunkt in "date" (Tag) den zugehörigen Messwert (Anzahl Patient*innen) angibt.
    # "acr_recruitment_followup": Ein Array gleicher Länge wie "date" bestehend aus einer Abfolge von Ganzzahlen, die für jeweiligen (gleicher Index im Array) Messzeitpunkt in "date" (Tag) den zugehörigen Messwert (Anzahl Patient*innen) angibt.
    # "date": Ein Array bestehend aus einer Abfolge von Ganzzahlen, die für jeden Tag ab dem Stichtag ununterbrochen bis zum aktuellen Datum einen Messzeitpunkt (als unix-time-stamps) angibt. Messzeitpunkte können innerhalb eines Tages beliebig liegen.
    # Bitte die Arrays in "values" und "date" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.
    {
      "itemname": "acr.timeline.recruitment",
      "itemtype": "list",
      "data": {
        "acr_recruitment_consent": [38,71,109,143],
        "acr_recruitment_followup": [3,3,20,43],
        "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000]
      }
    },
    # Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme
    # „charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für alle Diagnosegruppen, bitte nicht ändern
    # "bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier 3 Kohortendefinitionen, bitte nicht ändern
  ]
}
```

"stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 1 Wert für die Gesamtzahl der Patient*innen zur jeweiligen Kohorte, bitte nicht ändern
 # "values": Listet auf erster Ebene ein Array für jede Diagnosegruppe gemäß "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte (1 Gesamtzahl von Patient*innen zur jeweiligen Kohorte). Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.

```
{
  "itemname": "acr.current.dischargediahs.cohorts",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["acr_all_cohorts"],
    "bars": [{"acr_cohort_k1", "acr_cohort_k2", "acr_cohort_k3"}],
    "stacks": [{"acr_number_patients_cohort"}],
    "values": [
      [
        [45], [50], [48]
      ]
    ]
  }
},
# Generischer Datentyp für Zeitverläufe
# "date": Ein Array bestehend aus einer Abfolge von Ganzzahlen, die für jeden Tag ab dem Stichtag ununterbrochen bis zum
aktuellen Datum einen Messzeitpunkt (als unix-time-stamps) angibt. Messzeitpunkte können innerhalb eines Tages beliebig
liegen.
# "acr_cohort_k1", "acr_cohort_k2", "acr_cohort_k3": Drei Arrays gleicher Länge wie "date" bestehend aus einer Abfolge von
Ganzzahlen, die für jeweiligen (gleicher Index im Array) Messzeitpunkt in "date" (Tag) den zugehörigen Messwert (Anzahl
Patient*innen zur jeweiligen Kohorte) angibt.
# Bitte die Arrays in "values" und "date" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.
{
  "itemname": "acr.timeline.dischargediahs.cohorts",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "acr_cohort_k1": [12,23,34,45],
    "acr_cohort_k2": [10,20,39,50],
    "acr_cohort_k3": [16,28,36,48],
    "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000]
  }
}
]
```

Projekt Fachnetzwerk Infektionen (SNID)

Disclaimer: Die Etablierung des NUM SNID-internen Projektbereichs erfolgt vorbehaltlich der abschließenden Freigabe der NUM Studiennetzwerk (SN)-Koordination und wird im Falle der Aktivierung bzgl. der Zugriffsrechte auf einen durch die NUM SN-Koordination festgelegten Personenkreis beschränkt.

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

- Die Auswertung beginnt ab dem Stichtag 05.05.2025

Parameter	Wertebereich und Beschreibung
Lieferanten	
snid_provider	Institut für Digitale Medizin und Klinische Datenwissenschaften IDMKD
snid_provider_diz	Charité Universitätsmedizin Berlin CHARITE LMU Klinikum München LMU Universitätsklinikum Augsburg UKAU Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden UKDD Universitätsklinikum Düsseldorf UKD Universitätsklinikum Frankfurt UKF Universitätsklinikum Freiburg UKFR Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen UKGMG Universitätsmedizin Göttingen UMG Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf UKE Universitätsklinikum Heidelberg UKHD Universitätsklinikum Jena UKJ Universitätsklinikum Köln UKK Universitätsklinikum Leipzig UKL Universitätsklinikum Magdeburg UMD Universitätsklinikum Münster UKM Universitätsklinikum Regensburg UKR Universitätsklinikum Schleswig-Holstein UKSH Universitätsklinikum Würzburg UKW Universitätsmedizin Greifswald UMGR Universitätsmedizin Oldenburg UMO
SNID Standorte	
CHARITE LMU UKAU UKDD UKD UKF UKFR UKGMG UMG UKE UKHD UKJ UKK UKL UMMD UKM UKR UKSH UKW UMGR UMO ALLSITES	"Charité,"Charité" "München" / "Munich" "Augsburg" / "Augsburg " "Dresden" / "Dresden" "Düsseldorf" / "Düsseldorf " "Frankfurt" / "Frankfurt " "Freiburg" / "Freiburg " "Gießen" / "Gießen " "Göttingen" / "Göttingen " "Hamburg-Eppendorf" / " Hamburg-Eppendorf " "Heidelberg" / "Heidelberg " "Jena" / "Jena " "Köln" / "Cologne" "Leipzig" / "Leipzig " "Magdeburg" / "Magdeburg" "Münster" / "Münster " "Regensburg" / "Regensburg " "Schleswig-Holstein" / "Schleswig-Holstein " "Würzburg" / " Würzburg " "Greifswald" / "Greifswald " "Oldenburg" / "Oldenburg " "Alle Standorte" / "All sites"
Rekrutierung	

snid_recruitment_consent snid_recruitment_consent_diz	"Einwilligung" / "Consent" Die Gruppe der Patient*innen des Lieferanten "snid_provider" bzw. "snid_provider_diz", die eine Einwilligung für das Zusatzmodul Fachnetzwerk Infektion - SNID (Z4) erteilt haben
snid_recruitment_followup	"Nachfolgeuntersuchung" / "Follow-up" Die Gruppe der Patient*innen des Lieferanten "snid_provider", die eine Einwilligung für das Zusatzmodul Fachnetzwerk Infektion - SNID (Z4) erteilt haben und bei denen folgend auf die Aufnahmeuntersuchung nach 12 Monaten oder später eine Nachfolgeuntersuchung erfolgte.
SNID Module	
snid_BSI snid_CNS snid_EI snid_GI snid_RESP snid_ALLMOD	"Blutstrom Infektionen" / "Blood stream infections" "ZNS Infektionen" / "CNS infections" "EI Infektionen" / "EI infections" "GI Infektionen" / "GI infections" "RESP Infektionen" / "RESP infections" "Alle Infektionen" / "All infections"
Diagramme	
snid_project	"Projekt Fachnetzwerk Infektionen" / "Project Study Network Infectious Diseases"
Messwerte	
snid_number_patients	"Anzahl SNID-konsentierter Patient*innen" / "Number of SNID consented patients"

Definition Datenitems

Vorbemerkungen

Sichtbarkeit von Datenitems

- Sichtbarkeit gemäß Disclaimer, siehe oben. Die Datenitems "snid.current.recruitment.diz" und "snid.timeline.recruitment.diz" sind nicht in der der öffentlichen Ansicht des Dashboards sichtbar. Der Zugang wird entsprechend Disclaimer in Abstimmung mit der SNID-Governance geregelt.

Zählung von Patient:innen

- Patient*innen werden, insofern sie mehreren Modulen gemäß "SNID Module" zugeordnet sind, für Darstellungen zu "snid_ALLMOD" ggf. mehrmals gezählt.

Datenitems	Beschreibung
snid.current.recruitment.modules	Lieferanten gemäß "snid_provider" Kollektiv: Patient*innen gemäß "snid_recruitment_consent" und "snid_recruitment_followup". Geliefert werden differenziert nach Modulen gemäß "SNID Module" für Standorte gemäß "SNID

	Standorte" pro Standort und summiert über alle Standorte die aktuellen Anzahlen rekrutierter Patient*innen (gemäß "snid_recruitment_consent") und die aktuellen Anzahlen rekrutierter Patient*innen mit dokumentierter Followup-Untersuchung (gemäß "snid_recruitment_followup") als Ganzzahlen ≥ 0. Sichtbarkeit: Public (Gesamtzahl über alle Standorte), Standortscharfe Darstellungen gemäß Disclaimer
snid.current.recruitment.sites	Lieferanten gemäß "snid_provider" Kollektiv: Patient*innen gemäß "snid_recruitment_consent" und "snid_recruitment_followup". Geliefert werden differenziert nach Standorten gemäß "SNID Standorte" für alle Module einzeln und summiert über alle Module gemäß "SNID Module" die aktuellen Anzahlen rekrutierter Patient*innen (gemäß "snid_recruitment_consent") und die aktuellen Anzahlen rekrutierter Patient*innen mit dokumentierter Followup-Untersuchung (gemäß "snid_recruitment_followup") als Ganzzahlen ≥ 0. Sichtbarkeit: gemäß Disclaimer eingeschränkt
snid.current.recruitment.diz	Lieferanten gemäß "snid_provider_diz" Kollektiv: Patient*innen gemäß "snid_recruitment_consent_diz" am jeweiligen DIZ-Standort gemäß "snid_provider_diz". Geliefert wird von dem Standort gemäß "SNID Standorte" die aktuelle Anzahl rekrutierter Patient*innen (gemäß "snid_recruitment_consent_diz") als Ganzzahl ≥ 0. Sichtbarkeit: gemäß Disclaimer eingeschränkt
snid.timeline.recruitment	Lieferanten gemäß "snid_provider" Kollektiv: Patient*innen gemäß "snid_recruitment_consent" und "snid_recruitment_followup". Geliefert werden differenziert nach Standorten gemäß "SNID Standorte" für jeden Wert in der Datumsfolge "date" summativ über alle Module

	gemäß "SNID Module" die aktuellen Anzahlen rekrutierter Patient*innen (gemäß "snd_recruitment_consent") und die aktuellen Anzahlen rekrutierter Patient*innen mit dokumentierter Followup-Untersuchung (gemäß "snd_recruitment_followup") als Ganzzahlen ≥ 0. Die Datums-Folge "date" umfasst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis zum Vortag der Lieferung (inkl.). Sichtbarkeit: Public (Gesamtzahl über alle Standorte), Standortsscharfe Darstellungen gemäß Disclaimer
snid.timeline.recruitment.diz	Lieferanten gemäß "snid_provider_diz" Kollektiv: Patient*innen gemäß "snid_recruitment_consent_diz" am jeweiligen DIZ-Standort gemäß "snid_provider_diz". Geliefert werden von dem Standort gemäß "SNID Standorte" für jeden Wert in der Datumsfolge "date" die aktuellen Anzahlen rekrutierter Patient*innen (gemäß "snd_recruitment_consent_diz") als Ganzzahlen ≥ 0. Die Datums-Folge "date" umfasst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis zum Vortag der Lieferung (inkl.). Sichtbarkeit: gemäß Disclaimer eingeschränkt


```
{
  "itemname": "snid.current.recruitment.sites",
  "itemtype": "stackedbarcharts_uniform",
  "data": {
    "charts": ["snid_ALLMOD", "snid_BSI", "snid_CNS", "snid_EI", "snid_GI", "snid_RESP"],
    "bars": ["CHARITE", "UKAU", "UKDD", "UKD", "UKF", "UKFR", "UMGR", "UKGMG", "UMG", "UKE",
      "UKHD", "UKJ", "UKK", "UKL", "UMMD", "LMU", "UKM", "UMO", "UKR", "UKSH", "UKW"],
    "stacks": ["snd_recruitment_consent", "snd_recruitment_followup"],
    "values": [
      [ [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0] ],
      [ [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0] ],
      [ [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0] ],
      [ [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0] ],
      [ [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0] ],
      [ [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0] ]
    ]
  }
},
# Generischer Datentyp aus dem gruppierte Säulendiagramme erzeugt werden (Lieferant "snid_provider_diz") analog zu
# "snid.current.recruitment.sites" s.o. jedoch aus DIZ gelieferten Daten. Der Eintrag "provider" ist gemäß liefernden DIZ
# anzupassen.
{
  "itemname": "snid.current.recruitment.diz",
  "itemtype": "parameters_set",
  "data": {
    "name": "UKB",
    "data": ["snd_recruitment_consent_diz"],
    "values": [ 0 ]
  }
},
# Generischer Datentypen für Zeitverläufe (Lieferanten "snid_provider" bzw. "snid_provider_diz")
# „charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 22 Diagramme gemäß "SNID Standorte", bitte nicht ändern
# "snid_recruitment_consent" bzw. "snid_recruitment_consent_diz" :
#   Ein Array gleicher Länge wie "date" bestehend aus einer Abfolge von Ganzzahlen, die für jeweiligen (gleicher Index im Array)
#   Messzeitpunkt in "date" (Tag) den zugehörigen Messwert (Anzahl Patient*innen) angibt.
# "snid_recruitment_followup":
#   Ein Array gleicher Länge wie "date" bestehend aus einer Abfolge von Ganzzahlen, die für jeweiligen (gleicher Index im Array)
#   Messzeitpunkt in "date" (Tag) den zugehörigen Messwert (Anzahl Patient*innen) angibt.
# "date": Ein Array bestehend aus einer Abfolge von Ganzzahlen, die für jeden Tag ab dem Stichtag ununterbrochen bis zum
#   aktuellen Datum einen Messzeitpunkt (als unix-time-stamps) angibt. Messzeitpunkte können innerhalb eines Tages beliebig
#   liegen.
# Bitte die Arrays in "values" und "date" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.
{
  "itemname": "snid.timeline.recruitment",
  "itemtype": "list_charts",
  "data": {
    "charts": ["ALLSITES", "CHARITE", "UKAU", "UKDD", "UKD", "UKF", "UKFR", "UMGR", "UKGMG", "UMG",
      "UKE", "UKHD", "UKJ", "UKK", "UKL", "UMMD", "LMU", "UKM", "UMO", "UKR", "UKSH", "UKW"],
    "line_graphs": [
      "snid_recruitment_consent", "snid_recruitment_followup"
    ],
    "values": [
      [ [0.0,0.0],[0.0,0.0] ],

```

Seite 105 von 136

Projekt MII-BC-Erfassung (BCT)

Parameter und Wertebereiche für Datenitems

- Die Auswertung beginnt ab dem Stichtag 01.10.2024

Parameter	Wertebereich und Beschreibung
Lieferanten	
bct_provider	gemäß "provider" wie in "Allgemeine Parameter und Wertebereiche für Datenitems" definiert.
Einwillungsmodule Module	
bct_mod1	"Patientendaten erheben, speichern, nutzen" / "Collect, store and use patient data"
bct_mod2	"Patientendaten retrospektiv verarbeiten, nutzen" / "Process and use patient data retrospectively"
bct_mod3	"Krankenkassendaten retrospektiv übertragen, speichern, nutzen" / "Transfer, store and use health insurance data retrospectively"
bct_mod4	"Krankenkassendaten prospektiv übertragen, speichern, nutzen" / "Transfer, store and use health insurance data prospectively"
bct_mod5	"Biomaterial erheben, lagern, nutzen" / "Collect, store and use biomaterial"
bct_mod6	"Biomaterial Zusatzentnahme" / "Additional biomaterial collection"
bct_mod7	"Biomaterial retrospektiv speichern, nutzen" / "Store and use biomaterial retrospectively"
bct_mod8	"Rekontaktierung Ergänzungen" / "Re-contact additions"
bct_mod9	"Rekontaktierung Zusatzbefund" / "Re-contact additional findings"
Diagramme	
bct_project	"Projekt MII-BC-Erfassung" / "Project MII BC Tracking "
Messwerte	
bct_number_patients	"Anzahl MII-BC Patient*innen" / "Number of MII BC patients"

Definition Datenitems

Vorbemerkungen

Sichtbarkeit von Datenitems

- Die Datenitems "bct.current.consent" und "bct.timeline.consent" sind in der der öffentlichen Ansicht des Dashboards sichtbar. Alle ggf. weiterführend definierten Datenitems sind ausschließlich den Projektpartnern gemäß "bct_provider" vorbehalten.
- Mit einer Standort-Anmeldung am Dashboard erhalten die Projektpartner gemäß "bct_provider" Zugriff auf die eigene Drilldown-Standortansicht und die aller Projektpartner.

Zählung von Patient:innen

- Patient*innen werden für jedes Einwilligungsmodul gemäß "Einwilligungsmodule Module" maximal einmal gezählt. Nur der zuletzt von dem/ der Patient*in gezeichnete MII-BC als aktiv und gültig dokumentiert ist wird gezählt. Vorab gezeichnete oder widerrufenen MII-BC führen zu keiner Zählung von Patient*innen.

Datenitems	Beschreibung
bct.current.consent	Kollektiv: Patient*innen, die mindestens einem Einwilligungsmodul gemäß "Einwilligungsmodule Module" zugestimmt haben. Geliefert werden für alle Einwilligungsmodule gemäß "Einwilligungsmodule Module" die Anzahlen von Patient*innen, die dem jeweiligen Einwilligungsmodul zugestimmt haben.
bct.timeline.consent	Kollektiv: Patient*innen, die mindestens einem Consent Modul gemäß "Einwilligungsmodule Module" zugestimmt haben. Geliefert werden für alle Einwilligungsmodule gemäß "Einwilligungsmodule Module" jeweils für jeden Wert in der Datumsfolge "date" die Anzahlen von Patient*innen, die dem Einwilligungsmodul zugestimmt haben. Die Datums-Folge "date" umfasst alle Kalendertage seit Auswertungsbeginn bis zum Vortag der Lieferung (inkl.).

JSON-Beispiele

Die Werte folgender Beispiele sind willkürlich. Es werden generische Itemtypes benutzt, nur die farblich hinterlegten Abschnitte sind mit den aktuellen Daten zu füllen.

```
{
  "provider": "UKB",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 1588929963,
  "author": "Universitätsklinikum Bonn",
  "dataitems": [
    # Generischer Datentyp für gestapelte Säulendiagramme
    # „charts“: Jeder Eintrag definiert ein Diagramm, hier 1 zusammenfassendes Diagramm für das Projekt BC-Erfassung, bitte nicht
    # ändern
    # "bars": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen der Säulen, hier eine Angabe zu Anzahl MII-BC, bitte nicht
    # ändern
    # "stacks": Listet für jedes Diagramm gemäß "charts" Benennungen zu den gestapelten Säulen-Werten, hier 1 Wert für die
    # Gesamtzahl jeweiliger Patient*innen, bitte nicht ändern
    # "values": Listet auf erster Ebene ein Array für jede Diagnosegruppe gemäß "charts", und listet auf zweiter Ebene für jeden Eintrag
    # gemäß "bars" die gestapelt in den Säulen gemäß "stacks" anzuzeigenden Werte. Bitte die Datenstrukturen in "values" gemäß
    # dieser Logik mit den Standortdaten füllen.
    {
      "itemname": "bct.current.consent",
      "itemtype": "stackedbarcharts",
      "data": {
        "charts": ["bct_project"],
        "bars": ["bct_mod1", "bct_mod2", "bct_mod3", "bct_mod4", "bct_mod5", "bct_mod6", "bct_mod7",
          "bct_mod8", "bct_mod9"],
        "stacks": ["bct_number_patients"],
        "values": [
          [
            [0,0,0,0,0,0,0,0,0]
          ]
        ]
      }
    },
    # Generischer Datentyp für Zeitverläufe
    # "bct_modx": Arrays gleicher Länge wie "date" bestehend aus einer Abfolge von Ganzzahlen, die für jeweiligen (gleicher Index im
    # Array) Messzeitpunkt in "date" (Tag) den zugehörigen Messwert (Anzahl Patient*innen) angibt.
    # "date": Ein Array bestehend aus einer Abfolge von Ganzzahlen, die für jeden Tag ab dem Stichtag ununterbrochen bis zum
    # aktuellen Datum einen Messzeitpunkt (als unix-time-stamps) angibt. Messzeitpunkte können innerhalb eines Tages beliebig
    # liegen.
    # Bitte die Arrays in "values" und "date" gemäß dieser Logik mit den Standortdaten füllen.
    {
      "itemname": "bct.timeline.consent",
      "itemtype": "list",
      "data": {
        "bct_mod1": [0,0,0,0],
        "bct_mod2": [0,0,0,0],
        "bct_mod3": [0,0,0,0],
        "bct_mod4": [0,0,0,0],
        "bct_mod5": [0,0,0,0],
        "bct_mod6": [0,0,0,0],
        "bct_mod7": [0,0,0,0],
        "bct_mod8": [0,0,0,0],
      }
    }
  ]
}
```

```
"bct_mod9": [0,0,0,0],  
  "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000]  
}  
]  
}
```

Templates

JSON-Templates öffentliche Dataitems "Covid-19"

```
{
  "provider": "...",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 0,
  "author": "...",
  "dataitems": [
    {
      "itemname": "current.treatmentlevel",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {
        "Outpatient": 0,
        "Normal_ward": 0,
        "ICU": 0,
        "ICU_with_ventilation": 0,
        "ICU_with_ecmo": 0,
        "ICU_undifferentiated": 0
      }
    },
    {
      "itemname": "current.maxtreatmentlevel",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {
        "Outpatient": 0,
        "Normal_ward": 0,
        "ICU": 0,
        "ICU_with_ventilation": 0,
        "ICU_with_ecmo": 0,
        "ICU_undifferentiated": 0
      }
    },
    {
      "itemname": "cumulative.results",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {
        "Positive": 0,
        "Borderline_suspected": 0,
        "Negative": 0
      }
    },
    {
      "itemname": "cumulative.gender",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {
        "Male": 0,
        "Female": 0,
        "Diverse": 0
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "itemname": "cumulative.age",
    "itemtype": "list",
    "data":
    [0,"...",20,"...",25,"...",30,"...",35,"...",40,"...",45,"...",50,"...",55,"...",60,"...",65,"...",70,"...",7
    5,"...",80,"...",85,"...",90,"..."]
  },
  {
    "itemname": "cumulative.maxtreatmentlevel",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {
      "Outpatient": 0,
      "Normal_ward": 0,
      "ICU": 0,
      "ICU_with_ventilation": 0,
      "ICU_with_ecmo": 0,
      "ICU_undifferentiated": 0
    }
  },
  {
    "itemname": "cumulative.zipcode",
    "itemtype": "list",
    "data": ["00000","...", "99999","null","...", "null"]
  },
  {
    "itemname": "timeline.tests",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "date": [1580079600,"..."],
      "value": [0,"..."]}
  },
  {
    "itemname": "timeline.test.positive",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "date": [1580079600,"..."],
      "value": [0,"..."]
    }
  },
  {
    "itemname": "timeline.maxtreatmentlevel",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "Outpatient": [0,"..."],
      "Normal_ward": [0,"..."],
      "ICU": [0,"..."],
      "ICU_with_ventilation": [0,"..."],
      "ICU_with_ecmo": [0,"..."],

```

```

        "ICU_undifferentiated": [0,"..."],
        "date": [1580079600,"..."]
    },
    {
        "comment": "Die Templates zur Erfassung der Lebensalter current und cumulative von
        Patient*innen mit maximalem Versorgungsniveau outpatient, normal_ward,
        icu_undifferentiated, icu, icu_with_ventilation, icu_with_ecmo sind alle analog wie folgt
        aufgebaut:"},
        {
            "itemname": "current.age.maxtreatmentlevel.outpatient",
            "itemtype": "list",
            "data": [0,0,"..."]
        },
        {
            "itemname": "current.age.maxtreatmentlevel.normal_ward" },
        {
            "itemname": "current.age.maxtreatmentlevel.icu" },
        {
            "itemname": "current.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ventilation" },
        {
            "itemname": "current.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ecmo" },
        {
            "itemname": "current.age.maxtreatmentlevel.icu_undifferentiated" },
        {
            "itemname": "cumulative.age.maxtreatmentlevel.outpatient" },
        {
            "itemname": "cumulative.age.maxtreatmentlevel.normal_ward" },
        {
            "itemname": "cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu" },
        {
            "itemname": "cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ventilation" },
        {
            "itemname": "cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ecmo" },
        {
            "itemname": "cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_undifferentiated" },

        {
            "itemname": "cumulative.inpatient.gender",
            "itemtype": "aggregated",
            "data": {
                "Male": 0,
                "Female": 0,
                "Diverse": 0
            }
        },
        {
            "itemname": "cumulative.outpatient.age",
            "itemtype": "list",
            "data":
            [0,"...",20,"...",25,"...",30,"...",35,"...",40,"...",45,"...",50,"...",55,"...",60,"...",65,"...",70,"...",7
            5,"...",80,"...",85,"...",90,"..."]
        },
        {
            "itemname": "cumulative.outpatientgtp.age",
            "itemtype": "list",
            "data":
            [0,"...",20,"...",25,"...",30,"...",35,"...",40,"...",45,"...",50,"...",55,"...",60,"...",65,"...",70,"...",7
            5,"...",80,"...",85,"...",90,"..."]
        },
    },
    {

```

```

    "itemname": "cumulative.outpatient.gender",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {
        "Male": 0,
        "Female": 0,
        "Diverse": 0
    }
},
{
    "itemname": "cumulative.outpatientgp.gender",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {
        "Male": 0,
        "Female": 0,
        "Diverse": 0
    }
},
{
    "itemname": "cumulative.inpatient.age",
    "itemtype": "list",
    "data": [
        0, "...", 20, "...", 25, "...", 30, "...", 35, "...", 40, "...", 45, "...", 50, "...", 55, "...", 60, "...", 65, "...", 70, "...", 75, "...", 80, "...", 85, "...", 90, "..."]
    ]
},
{
    "itemname": "timeline.deaths",
    "itemtype": "list",
    "data": {
        "date": [1580079600, "..."],
        "value": [0, "..."]
    }
},
{
    "itemname": "cumulative.lengthofstay.hospital",
    "itemtype": "list",
    "data": [0, "..."]
},
{
    "itemname": "cumulative.lengthofstay.hospital.alive",
    "itemtype": "list",
    "data": [0, "..."]
},
{
    "itemname": "cumulative.lengthofstay.hospital.dead",
    "itemtype": "list",
    "data": [0, "..."]
},
{
    "itemname": "cumulative.lengthofstay.icu",
    "itemtype": "list",
    "data": [0, "..."]
}

```

```

},
{
  "itemname": "cumulative.lengthofstay.icu.alive",
  "itemtype": "list",
  "data": [0, "..."]
},
{
  "itemname": "cumulative.lengthofstay.icu.dead",
  "itemtype": "list",
  "data": [0, "..."]
},

```

{ "comment": "Die Templates zur Erfassung des Immunstatus **cumulative** und **timeline** von Patient*innen mit maximalem Versorgungsniveau **outpatient**, **outpatientgp**, **normal_ward**, **icu_undifferentiated**, **icu**, **icu_with_ventilation**, **icu_with_ecmo** sind alle analog wie folgt aufgebaut:" },

```

{
  "itemname": "cumulative.immunestatus.outpatient",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {
    "Complete": 0,
    "Incomplete": 0,
    "None": 0,
    "Unknown": 0
  }
},
{
  "itemname": "cumulative.age.maxtreatmentlevel.outpatientgp" },
{
  "itemname": "current.age.immunestatus.normal_ward" },
{
  "itemname": "current.age.immunestatus.icu" },
{
  "itemname": "current.age.immunestatus.icu_with_ventilation" },
{
  "itemname": "current.age.immunestatus.icu_with_ecmo" },
{
  "itemname": "current.age.immunestatus.icu_undifferentiated" },
{
  "itemname": "timeline.immunestatus.outpatient",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {
    "Complete": [0, "..."],
    "Incomplete": [0, "..."],
    "None": [0, "..."],
    "Unknown": [0, "..."],
    "date": [1580079600, "..."]
  }
},
{
  "itemname": "timeline.age.immunestatus.outpatientgp" },
{
  "itemname": "timeline.age.immunestatus.normal_ward" },
{
  "itemname": "timeline.age.immunestatus.icu" },
{
  "itemname": "timeline.age.immunestatus.icu_with_ventilation" },
{
  "itemname": "timeline.age.immunestatus.icu_with_ecmo" },
{
  "itemname": "timeline.age.immunestatus.icu_undifferentiated" },

```

```
{
  "itemname": "cumulative.varianttestresults",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {
    "Alpha": 0,
    "Beta": 0,
    "Gamma": 0,
    "Delta": 0,
    "Omikron": 0,
    "OtherVOC": 0,
    "NonVOC": 0
  }
},
{
  "itemname": "timeline.varianttestresults",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "Alpha": [0, "..."],
    "Beta": [0, "..."],
    "Gamma": [0, "..."],
    "Delta": [0, "..."],
    "Omikron": [0, "..."],
    "OtherVOC": [0, "..."],
    "NonVOC": [0, "..."],
    "Unknown": [0, "..."],
    "Negative": [0, "..."],
    "date": [1580079600, "..."]
  }
},
{
  "itemname": "current.wardsvisited",
  "itemtype": "statsmean",
  "data": {
    "Mean": 0,
    "Standard_dev": 0,
    "Sample_size": 0
  }
},
{
  "itemname": "current.nosocomialcases.possible",
  "itemtype": "statsmean",
  "data": {
    "Mean": 0,
    "Standard_dev": 0,
    "Sample_size": 0
  }
},
{
  "itemname": "current.nosocomialcases.probable",
  "itemtype": "statsmean",
```

```

    "data": {
      "Mean": 0,
      "Standard_dev": 0,
      "Sample_size": 0
    }
  },
  {
    "itemname": "current.predictivediseases",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {
      "No_finding": 0,
      "Single_finding": 0,
      "Multiple_findings": 0
    }
  },
  {
    "itemname": "timeline.predictivediseases",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "No_finding": [0, "..."],
      "Single_finding": [0, "..."],
      "Multiple_findings": [0, "..."],
      "date": [1580079600, "..."]
    }
  },
  {
    "itemname": "current.causehospitalization",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {
      "Comorbidity": 0,
      "Unclear": 0,
      "Causative": 0
    }
  },
  {
    "itemname": "timeline.causehospitalization",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "Comorbidity": [0, "..."],
      "Unclear": [0, "..."],
      "Causative": [0, "..."],
      "date": [1580079600, "..."]}
  },
  {
    "itemname": "current.rbmortalityrisk",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "Mortality_risk": [0, "..."]
    }
  },
  },

```

```
{
  "itemname": "timeline.rbmortalityrisk",
  "itemtype": "listnestedarrays",
  "data": {"date": [1580079600,"..."],
    "Mortality_risk": [ [0,"..."], "...", [0,"..."] ],
    "Patient_deceased": [0,"..."]
  }
},
{
  "itemname": "cumulative.rbmortalityrisk.roc",
  "itemtype": "listtupel",
  "data": {
    "Rbmortalityrisk_roc": [ [0,0], "...", [0,0] ]
  }
},
{
  "itemname": "current.renalreplacementrisk",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "Renalreplacement_risk": [0,"..."]
  }
},
{
  "itemname": "timeline.renalreplacementrisk",
  "itemtype": "listnestedarrays",
  "data": {"date": [1580079600,"..."],
    "Renalreplacement_risk": [ [0,"..."], "...", [0,"..."] ],
    "Renalreplacement_therapy": [0,"..."]
  }
},
{
  "itemname": "cumulative.renalreplacementrisk.roc",
  "itemtype": "listtupel",
  "data": {
    "Renalreplacementrisk_roc": [ [0,0], "...", [0,0] ]
  }
},
{
  "itemname": "timeline.icubedoccupancy",
  "itemtype": "listprediction",
  "data": {
    "ICU_beds_occupancy": [0,"..."],
    "Last_lower": [0,"..."],
    "Last_upper": [0,"..."],
    "date": [1580079600,"..."]}
  }
}
]
```

JSON-Templates nicht-öffentliche Dataitems "Covid-19"

```
{
  "provider": "...",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 0,
  "author": "...",
  "dataitems": [
    {
      "itemname": "current.treatmentlevel.crosstab",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {
        "state": [
          "0000",
          "0100",
          "0110",
          "0111",
          "1000",
          "1100",
          "1110",
          "1111"
        ],
        "columnname": [
          "Stadt in welcher die Uniklinik ansässig ist",
          "ICU",
          "ICU_with_ventilation",
          "ICU_with_ECMO"
        ],
        "value": [0,0,0,0,0,0,0,0]
      }
    }
  ]
}
```

JSON-Templates "Influenza"

```
{
  "provider": "...",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 0,
  "author": "...",
  "dataitems": [
    {
      "itemname": "infl.current.treatmentlevel",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {
        "Outpatient": 0,
        "Normal_ward": 0,
        "ICU": 0,
        "ICU_with_ventilation": 0,
        "ICU_with_ecmo": 0,
        "ICU_undifferentiated": 0
      }
    },
    {
      "itemname": "infl.current.maxtreatmentlevel",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {
        "Outpatient": 0,
        "Normal_ward": 0,
        "ICU": 0,
        "ICU_with_ventilation": 0,
        "ICU_with_ecmo": 0,
        "ICU_undifferentiated": 0
      }
    },
    {
      "itemname": "infl.cumulative.results",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {
        "Positive": 0,
        "Suspected": 0,
        "Negative": 0
      }
    },
    {
      "itemname": "infl.cumulative.gender",
      "itemtype": "aggregated",
      "data": {
        "Male": 0,
        "Female": 0,
        "Diverse": 0
      }
    }
  ],
}
```

```
{
  "itemname": "infl.cumulative.age",
  "itemtype": "list",
  "data":
    [0,"...",20,"...",25,"...",30,"...",35,"...",40,"...",45,"...",50,"...",55,"...",60,"...",65,"...",70,"...",7
    5,"...",80,"...",85,"...",90,"..."]
},
{
  "itemname": "infl.cumulative.maxtreatmentlevel",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {
    "Outpatient": 0,
    "Normal_ward": 0,
    "ICU": 0,
    "ICU_with_ventilation": 0,
    "ICU_with_ecmo": 0,
    "ICU_undifferentiated": 0
  }
},
{
  "itemname": "infl.cumulative.zipcode",
  "itemtype": "list",
  "data": ["00000","...","99999","null","...","null"]
},
{
  "itemname": "infl.timeline.tests",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "date": [1580079600,"..."],
    "value": [0,"..."]}
},
{
  "itemname": "infl.timeline.test.positive",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "date": [1580079600,"..."],
    "value": [0,"..."]
  }
},
{
  "itemname": "infl.timeline.maxtreatmentlevel",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "Outpatient": [0,"..."],
    "Normal_ward": [0,"..."],
    "ICU": [0,"..."],
    "ICU_with_ventilation": [0,"..."],
    "ICU_with_ecmo": [0,"..."],
    "ICU_undifferentiated": [0,"..."],
    "date": [1580079600,"..."]
  }
}
```

```

    }
  },
  { "comment": "Die Templates zur Erfassung der Lebensalter current und cumulative von
Patient*innen mit maximalem Versorgungsniveau outpatient, normal_ward,
icu_undifferentiated, icu, icu_with_ventilation, icu_with_ecmo sind alle analog wie folgt
aufgebaut:"},
{
  "itemname": "infl.current.age.maxtreatmentlevel.outpatient",
  "itemtype": "list",
  "data": [0,0,"..."]
},
{
  "itemname": "infl.current.age.maxtreatmentlevel.normal_ward" },
{
  "itemname": "infl.current.age.maxtreatmentlevel.icu" },
{
  "itemname": "infl.current.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ventilation" },
{
  "itemname": "infl.current.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ecmo" },
{
  "itemname": "infl.current.age.maxtreatmentlevel.icu_undifferentiated" },
{
  "itemname": "infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.outpatient" },
{
  "itemname": "infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.normal_ward" },
{
  "itemname": "infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu" },
{
  "itemname": "infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ventilation" },
{
  "itemname": "infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_with_ecmo" },
{
  "itemname": "infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.icu_undifferentiated" },

{
  "itemname": "infl.cumulative.inpatient.gender",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {
    "Male": 0,
    "Female": 0,
    "Diverse": 0
  }
},
{
  "itemname": "infl.cumulative.outpatient.age",
  "itemtype": "list",
  "data":
[0,"...",20,"...",25,"...",30,"...",35,"...",40,"...",45,"...",50,"...",55,"...",60,"...",65,"...",70,"...",7
5,"...",80,"...",85,"...",90,"..."]
},
{
  "itemname": "infl.cumulative.outpatientgp.age",
  "itemtype": "list",
  "data":
[0,"...",20,"...",25,"...",30,"...",35,"...",40,"...",45,"...",50,"...",55,"...",60,"...",65,"...",70,"...",7
5,"...",80,"...",85,"...",90,"..."]
},
{
  "itemname": "infl.cumulative.outpatient.gender",
  "itemtype": "aggregated",

```

```

    "data": {
      "Male": 0,
      "Female": 0,
      "Diverse": 0
    }
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.outpatientgp.gender",
    "itemtype": "aggregated",
    "data": {
      "Male": 0,
      "Female": 0,
      "Diverse": 0
    }
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.inpatient.age",
    "itemtype": "list",
    "data":
    [0,"...",20,"...",25,"...",30,"...",35,"...",40,"...",45,"...",50,"...",55,"...",60,"...",65,"...",70,"...",7
    5,"...",80,"...",85,"...",90,"..."]
  },
  {
    "itemname": "infl.timeline.deaths",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "date": [1580079600,"..."],
      "value": [0,"..."]
    }
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.hospital",
    "itemtype": "list",
    "data": [0,"..."]
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.hospital.alive",
    "itemtype": "list",
    "data": [0,"..."]
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.hospital.dead",
    "itemtype": "list",
    "data": [0,"..."]
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.icu",
    "itemtype": "list",
    "data": [0,"..."]
  },
  {

```

```

    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.icu.alive",
    "itemtype": "list",
    "data": [0, "..."]
  },
  {
    "itemname": "infl.cumulative.lengthofstay.icu.dead",
    "itemtype": "list",
    "data": [0, "..."]
  },

```

{ "comment": "Die Templates zur Erfassung des Immunstatus **cumulative** und **timeline** von Patient*innen mit maximalem Versorgungsniveau **outpatient**, **outpatientgp**, **normal_ward**, **icu_undifferentiated**, **icu**, **icu_with_ventilation**, **icu_with_ecmo** sind alle analog wie folgt aufgebaut:" },

```

{
  "itemname": "infl.cumulative.immunestatus.outpatient",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {
    "Complete": 0,
    "None": 0,
    "Unknown": 0
  }
},
{
  "itemname": "infl.cumulative.age.maxtreatmentlevel.outpatientgp" },
{
  "itemname": "infl.current.age.immunestatus.normal_ward" },
{
  "itemname": "infl.current.age.immunestatus.icu" },
{
  "itemname": "infl.current.age.immunestatus.icu_with_ventilation" },
{
  "itemname": "infl.current.age.immunestatus.icu_with_ecmo" },
{
  "itemname": "infl.current.age.immunestatus.icu_undifferentiated" },
{
  "itemname": "infl.timeline.immunestatus.outpatient",
  "itemtype": "aggregated",
  "data": {
    "Complete": [0, "..."],
    "Incomplete": [0, "..."],
    "None": [0, "..."],
    "Unknown": [0, "..."],
    "date": [1580079600, "..."]
  }
},
{
  "itemname": "infl.timeline.age.immunestatus.outpatientgp" },
{
  "itemname": "infl.timeline.age.immunestatus.normal_ward" },
{
  "itemname": "infl.timeline.age.immunestatus.icu" },
{
  "itemname": "infl.timeline.age.immunestatus.icu_with_ventilation" },
{
  "itemname": "infl.timeline.age.immunestatus.icu_with_ecmo" },
{
  "itemname": "infl.timeline.age.immunestatus.icu_undifferentiated" },
{
  "itemname": "infl.cumulative.subtypetestresults",
  "itemtype": "aggregated",

```

```

    "data" :{
      "A_H1N1": 0,
      "A_H3": 0,
      "A_H5": 0,
      "A_nosub": 0,
      "B_Victoria": 0,
      "B_Yamagata": 0,
      "B_nosub": 0,
      "Unknown": 0,
      "Negative": 0}
  },
  {
    "itemname": "infl.timeline.subtypetestresults",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "A_H1N1": [0,"..."],
      "A_H3": [0,"..."],
      "A_H5": [0,"..."],
      "A_nosub": [0,"..."],
      "B_Victoria": [0,"..."],
      "B_Yamagata": [0,"..."],
      "B_nosub": [0,"..."],
      "Unknown": [0,"..."],
      "Negative": [0,"..."],
      "date": [1580079600,"..."]
    }
  }
]
}

```

JSON-Templates "KinderRadar"

```
{
  "provider": "...",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 0,
  "author": "...",
  "dataitems": [

    {
      "itemname": "kira.kjp.cumulative.diags.age",
      "itemtype": "stackedbarcharts_uniform",
      "data": {
        "charts": ["disorders-due-to-substance-use", "psychotic-disorders", "mood-disorders-periodic",
          "mood-disorders-non-periodic", "anxiety-disorders", "obsessive-compulsive-disorder",
          "stress-related-disorders", "eating-disorders", "intellectual-developmental-disorders",
          "specific-developmental-disorders", "autism-spectrum", "attention-deficit-hyperactivity-
            disorder", "conduct-disorders", "other-psychological-disorders"],
        "bars": [ "age_kjp_0-5y", "age_kjp_6-13y", "age_kjp_14-17y"],
        "stacks": ["in_group", "out_group"],
        "values": [
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ],
          [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0], [ 0 ,0] ]
        ]
      }
    },
    {
      "itemname": "kira.kjp.cumulative.diags.gender",
      "itemtype": "stackedbarcharts",
      "data": {
        "charts": ["kjp_diagnoses_all"],
        "bars": [ ["disorders-due-to-substance-use", "psychotic-disorders", "mood-disorders-periodic", "mood-disorders-non-
          periodic", "anxiety-disorders", "obsessive-compulsive-disorder", "stress-related-disorders", "eating-disorders",
          "intellectual-developmental-disorders", "specific-developmental-disorders", "autism-spectrum", "attention-deficit-
            hyperactivity-disorder", "conduct-disorders", "other-psychological-disorders"]],
        "stacks": [ ["male", "female", "diverse"]],
        "values": [
```

```
[
  [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0],
  [0,0,0], [0,0,0]
]
]
}
},
{
  "itemname": "kira.kjp.cumulative.diags.lengthofstay",
  "itemtype": "stackedbarcharts",
  "data": {
    "charts": ["kjp_diagnoses_all"],
    "bars": ["disorders-due-to-substance-use", "psychotic-disorders", "mood-disorders-periodic", "mood-disorders-non-periodic", "anxiety-disorders", "obsessive-compulsive-disorder", "stress-related-disorders", "eating-disorders", "intellectual-developmental-disorders", "specific-developmental-disorders", "autism-spectrum", "attention-deficit-hyperactivity-disorder", "conduct-disorders", "other-psychological-disorders"],
    "stacks": ["kjp_mean_length_of_stay"],
    "values": [
      [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0]
    ]
  }
}
},
{
  "itemname": "kira.kjp.timeline.diags.occurrence",
  "itemtype": "stackedbarcharts_uniform",
  "data": {
    "charts": ["disorders-due-to-substance-use", "psychotic-disorders", "mood-disorders-periodic", "mood-disorders-non-periodic", "anxiety-disorders", "obsessive-compulsive-disorder", "stress-related-disorders", "eating-disorders", "intellectual-developmental-disorders", "specific-developmental-disorders", "autism-spectrum", "attention-deficit-hyperactivity-disorder", "conduct-disorders", "other-psychological-disorders"],
    "bars": ["yyyy-mm", "...", "yyyy-mm"],
    "stacks": ["in_group", "out_group"],
    "values": [
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0],
      [0.0, "...", 0.0]
    ]
  }
}
},
{
  "itemname": "kira.kjp.timeline.age",
```

```

    "itemtype": "stackedbarcharts",
    "data": {
      "charts": ["kjp_patient"],
      "bars": ["yyyymm", "...", "yyyymm"],
      "stacks": ["age_kjp_0-5y", "age_kjp_6-13y", "age_kjp_14-17y"],
      "values": [
        [ [0,0,0], "...", [0,0,0] ]
      ]
    }
  },
  {
    "itemname": "kira.kjp.timeline.psychintensivecare",
    "itemtype": "stackedbarcharts",
    "data": {
      "charts": ["kjp_patient"],
      "bars": ["yyyymm", "...", "yyyymm"],
      "stacks": ["psychintensive_care_days_by_month", "normal_care_days_by_month"],
      "values": [
        [ [0,0], "...", [0,0] ]
      ]
    }
  },
  {
    "itemname": "kira.kjp.timeline.psychintensivecare_ratio",
    "itemtype": "groupedbarcharts_calc",
    "data": {
      "charts": ["kjp_patient"],
      "bars": ["yyyymm", "...", "yyyymm"],
      "groups": ["ratio_psychintensive_total_care_days_by_month"],
      "calculations":
["$ratio_psychintensive_total_care_days_by_month=100*($psychintensive_care_days_by_month($psychintensive_care_days_by_
month+$normal_care_days_by_month))"],
      "params": [
        ["psychintensive_care_days_by_month", "normal_care_days_by_month"]
      ],
      "values": [
        [ [0,0], "...", [0,0] ]
      ]
    }
  },
  {
    "itemname": "kira.kjp.timeline.psychintensivecare_change",
    "itemtype": "stackedbarcharts",
    "data": {
      "charts": ["kjp_patient"],
      "bars": ["yyyymm", "...", "yyyymm"],
      "stacks": ["diff_intensive_meanpsychintensive_care_days_by_month"],
      "values": [
        [ [0], "...", [0] ]
      ]
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "itemname": "kira.kjp.cumulative.psychintensivecare_3months",
    "itemtype": "groupedbarcharts_calc",
    "data": {
      "charts": ["kjp_patient"],
      "bars": [ "yyyy-mm to yyyy-mm / yyyy-mm to yyyy-mm"],
      "groups": ["ratio_psychintensive_total_care_days_3m_py",
        "ratio_psychintensive_total_care_days_3m"],
      "calculations":
["$ratio_psychintensive_total_care_days_3m=100*($psychintensive_care_days_3m/ $total_care_days_3m)",
"$ratio_psychintensive_total_care_days_3m_py=100*($psychintensive_care_days_3m_py/$total_care_days_3m_py)"],
      "params": [
        ["psychintensive_care_days_3m", "total_care_days_3m"],
        ["psychintensive_care_days_3m_py", "total_care_days_3m_py"]
      ],
      "values": [
        [ [0,0], [0,0] ]
      ]
    }
  },
  {
    "itemname": "kira.kjp.timeline.admission",
    "itemtype": "stackedbarcharts",
    "data": {
      "charts": ["kjp_patient"],
      "bars": [ ["yyyy-Qi", "...", "yyyy-Qj"]],
      "stacks": ["ncs_readmission", "ncs_newadmission"],
      "values": [
        [
          [ [0,0], "...", [0,0] ]
        ]
      ]
    }
  },
  {
    "itemname": "kira.kjp.timeline.diags.admission",
    "itemtype": "stackedbarcharts_uniform",
    "data": {
      "charts": ["disorders-due-to-substance-use", "psychotic-disorders", "mood-disorders-periodic", "mood-disorders-non-periodic",
        "anxiety-disorders", "obsessive-compulsive-disorder", "stress-related-disorders", "eating-disorders", "intellectual-
        developmental-disorders", "specific-developmental-disorders", "autism-spectrum", "attention-deficit-hyperactivity-
        disorder", "conduct-disorders", "other-psychological-disorders"],
      "bars": [ ["yyyy", "...", "yyyy"]],
      "stacks": ["ncs_readmission", "ncs_newadmission"],
      "values": [
        [ [0,0], "...", [0,0] ],
        [ [0,0], "...", [0,0] ],
        [ [0,0], "...", [0,0] ],
        [ [0,0], "...", [0,0] ],
        [ [0,0], "...", [0,0] ],
        [ [0,0], "...", [0,0] ]
      ]
    }
  }
}

```

```

        [0,0], "...", [0,0] ],
        [0,0], "...", [0,0] ],
        [0,0], "...", [0,0] ],
        [0,0], "...", [0,0] ],
        [0,0], "...", [0,0] ],
        [0,0], "...", [0,0] ],
        [0,0], "...", [0,0] ],
        [0,0], "...", [0,0] ]
    ]
}
},
{
    "itemname": "kira.ped.rsv.cumulative.diags.zipcode",
    "itemtype": "chartlist",
    "data": {
        "charts": ["rsv_diagnoses_all", "rsv_acute_bronchitis", "rsv_acute_bronchiolitis", "rsv_pneumonia",
            "rsv_caused_disease"],
        "values": [
            ["nnnnn", "...", "nnnnn"],
            ["nnnnn", "...", "nnnnn"],
            ["nnnnn", "...", "nnnnn"],
            ["nnnnn", "...", "nnnnn"],
            ["nnnnn", "...", "nnnnn"]
        ]
    }
},
{
    "itemname": "kira.ped.rsv.cumulative.diags.age",
    "itemtype": "stackedbarcharts",
    "data": {
        "charts": ["kjp_patient"],
        "bars": ["age_pediatic_0-3m", "age_pediatic_4-12m", "age_pediatic_1-2y", "age_pediatic_3-5y",
            "age_pediatic_6-12y", "age_pediatic_13-17y"],
        "stacks": ["rsv_acute_bronchitis", "rsv_acute_bronchiolitis", "rsv_pneumonia",
            "rsv_caused_disease"],
        "values": [
            [
                [0,0,0,0],
                [0,0,0,0],
                [0,0,0,0],
                [0,0,0,0],
                [0,0,0,0],
                [0,0,0,0]
            ]
        ]
    }
},
{
    "itemname": "kira.ped.rsv.cumulative.diags.gender",
    "itemtype": "stackedbarcharts",
    "data": {
        "charts": ["rsv_diagnoses_all"],

```

```

    "bars": ["rsv_acute_bronchitis", "rsv_acute_bronchiolitis", "rsv_pneumonia", "rsv_caused_disease"],
    "stacks": ["male", "female", "diverse"],
    "values": [
      [ [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0] ]
    ]
  },
  {
    "itemname": "kira.ped.rsv.cumulative.diags.lengthofstay",
    "itemtype": "stackedbarcharts",
    "data": {
      "charts": ["rsv_diagnoses_all"],
      "bars": ["rsv_acute_bronchitis", "rsv_acute_bronchiolitis", "rsv_pneumonia",
        "rsv_caused_disease"],
      "stacks": ["rsv_mean_length_of_stay"],
      "values": [
        [ [0.0], [0.0], [0.0], [0.0] ]
      ]
    }
  },
  {
    "itemname": "kira.ped.rsv.timeline.diags.occurrence",
    "itemtype": "stackedbarcharts",
    "data": {
      "charts": ["rsv_diagnoses_all"],
      "bars": ["yyyy-mm", "...", "yyyy-mm"],
      "stacks": ["rsv_acute_bronchitis", "rsv_acute_bronchiolitis", "rsv_pneumonia", "rsv_caused_disease"],
      "values": [
        [
          [0,0,0,0], "...", [0,0,0,0]
        ]
      ]
    }
  },
  {
    "itemname": "kira.ped.rsv.timeline.age",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "age_pediatric_0-3m": [0, "...", 0],
      "age_pediatric_4-12m": [0, "...", 0],
      "age_pediatric_1-2y": [0, "...", 0],
      "age_pediatric_3-5y": [0, "...", 0],
      "age_pediatric_6-12y": [0, "...", 0],
      "age_pediatric_13-17y": [0, "...", 0],
      "date": [0, "...", 0]
    }
  },
  {
    "itemname": "kira.ped.rsv.timeline.age.pcr",
    "itemtype": "list",

```

```

"data": {
  "age_pediatric_0-3m": [0, "...", 0],
  "age_pediatric_4-12m": [0, "...", 0],
  "age_pediatric_1-2y": [0, "...", 0],
  "age_pediatric_3-5y": [0, "...", 0],
  "age_pediatric_6-12y": [0, "...", 0],
  "age_pediatric_13-17y": [0, "...", 0],
  "date": [0, "...", 0]
}
},
{
  "itemname": "kira.ped.influenza.timeline.age",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_4-12m": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_1-2y": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_3-5y": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_6-12y": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_13-17y": [0, "...", 0],
    "date": [0, "...", 0]
  }
},
{
  "itemname": "kira.ped.influenza.timeline.age.pcr",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_4-12m": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_1-2y": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_3-5y": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_6-12y": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_13-17y": [0, "...", 0],
    "date": [0, "...", 0]
  }
},
{
  "itemname": "kira.ped.covid.timeline.age",
  "itemtype": "list",
  "data": {
    "age_pediatric_0-3m": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_4-12m": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_1-2y": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_3-5y": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_6-12y": [0, "...", 0],
    "age_pediatric_13-17y": [0, "...", 0],
    "date": [0, "...", 0]
  }
},
{

```

```

    "itemname": "kira.ped.covid.timeline.age.pcr",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "age_pediatic_0-3m": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_4-12m": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_1-2y": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_3-5y": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_6-12y": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_13-17y": [0, "...", 0],
      "date": [0, "...", 0]
    }
  },
  {
    "itemname": "kira.ped.pertussis.timeline.age",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "age_pediatic_0-3m": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_4-12m": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_1-2y": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_3-5y": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_6-12y": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_13-17y": [0, "...", 0],
      "date": [0, "...", 0]
    }
  },
  {
    "itemname": "kira.ped.pertussis.timeline.age.pcr",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "age_pediatic_0-3m": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_4-12m": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_1-2y": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_3-5y": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_6-12y": [0, "...", 0],
      "age_pediatic_13-17y": [0, "...", 0],
      "date": [0, "...", 0]
    }
  }
]
}

```

JSON-Templates "Projekte-Dashboard"

ACRIBIS (ACR), Fachnetzwerk Infektionen (SND) und MII-BC-Erfassung (BCT)

```
{
  "provider": "...",
  "dashboard_dataset_version": "0.5.5",
  "exporttimestamp": 0,
  "author": "...",
  "dataitems": [
    {
      "itemname": "acr.current.recruitment",
      "itemtype": "stackedbarcharts",
      "data": {
        "charts": ["acr_project"],
        "bars": [["acr_recruitment_consent", "acr_recruitment_followup"]],
        "stacks": [["acr_number_patients"]],
        "values": [
          [
            [0], [0]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "itemname": "acr.timeline.recruitment",
      "itemtype": "list",
      "data": {
        "acr_recruitment_consent": [0, "..."],
        "acr_recruitment_followup": [0, "..."],
        "date": [1580079600, "..."]
      }
    },
    {
      "itemname": "acr.current.dischargediahs.cohorts",
      "itemtype": "stackedbarcharts",
      "data": {
        "charts": ["acr_all_cohorts"],
        "bars": [["acr_cohort_k1", "acr_cohort_k2", "acr_cohort_k3"]],
        "stacks": [["acr_number_patients_cohort"]],
        "values": [
          [
            [0], [0], [0]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "itemname": "acr.timeline.dischargediahs.cohorts",
      "itemtype": "list",
      "data": {
```

Seite 134 von 136

Seite 135 von 136

```

    "data": {
      "name": "UKB",
      "line_graphs": [
        "snid_recruitment_consent_diz"
      ],
      "values": [
        [0,"...",0]
      ],
      "date": [0,"...",0]
    }
  },
  {
    "itemname": "bct.current.consent",
    "itemtype": "stackedbarcharts",
    "data": {
      "charts": ["bct_project"],
      "bars": [
        ["bct_mod1", "bct_mod2", "bct_mod3", "bct_mod4", "bct_mod5", "bct_mod6", "bct_mod7",
          "bct_mod8", "bct_mod9"]
      ],
      "stacks": [
        ["bct_number_patients"]
      ],
      "values": [
        [
          [0,0,0,0,0,0,0,0,0]
        ]
      ]
    }
  },
  {
    "itemname": "bct.timeline.consent",
    "itemtype": "list",
    "data": {
      "bct_mod1": [0,0,0,0],
      "bct_mod2": [0,0,0,0],
      "bct_mod3": [0,0,0,0],
      "bct_mod4": [0,0,0,0],
      "bct_mod5": [0,0,0,0],
      "bct_mod6": [0,0,0,0],
      "bct_mod7": [0,0,0,0],
      "bct_mod8": [0,0,0,0],
      "bct_mod9": [0,0,0,0],
      "date": [1588291200,1588377600,1588464000,1588567000]
    }
  }
]
}

```