

WIKIPEDIA

# Ataxia locomotriz

---

Es una infección sífilica de los nervios en la que existe una degeneración progresiva de las fibras nerviosas de la médula espinal. La ataxia locomotriz puede no manifestarse hasta diez o veinte años después de la infección original, y es más común en hombres que en mujeres.

## Síntomas

---

El síntoma inicial y más característico es un dolor intenso y punzante en las piernas, que se denomina dolor fulgurante. También puede haber pérdida de sensación en los miembros y falta de conciencia de su posición. A medida que la enfermedad progresa, el paciente puede caminar de modo inestable, levantando mucho las rodillas; es lo que se llama marcha festinante. También se puede producir retención de orina y, con el tiempo, incontinencia. En las últimas fases de la enfermedad, se pueden producir dolores en el abdomen y vómitos.

## Véase también

---

- Ataxia
  - Sífilis
- 

Obtenido de «[https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ataxia\\_locomotriz&oldid=108652608](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ataxia_locomotriz&oldid=108652608)»

---

**Esta página se editó por última vez el 12 jun 2018 a las 22:58.**

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.  
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.