

1 Abzählungen

Es gibt nur zwei Arten von Aufgaben:

- Anzahl Aufteilungen von einer Menge N von Kugeln in eine Menge R von Fächern
- Aus einer Menge N mit n Elementen sollen alle oder k Elemente ausgewählt werden

1.1 Anzahl Aufteilungen von einer Menge N von Kugeln in eine Menge R von Fächern

$ N = n, R = r$	beliebig	injektiv	surjektiv	bijektiv
N unterscheidbar R unterscheidbar	r^n	$r \geq n : r^n$ $r < n : 0$	$n \geq r : r! S_{n,r}$ $n < r : 0$	$r = n : n!$ $r \neq n : 0$
N nicht unterscheidbar R unterscheidbar	$\binom{r+n-1}{n}$ $= \frac{r^{\overline{n}}}{n!}$	$r \geq n : \binom{r}{n}$ $r < n : 0$	$n \geq r : \binom{n-1}{r-1}$ $n < r : 0$	$r = n : 1$ $r \neq n : 0$
N unterscheidbar R nicht unterscheidbar	$\sum_{k=1}^r S_{n,k}$	$r \geq n : 1$ $r < n : 0$	$n \geq r : S_{n,r}$ $n < r : 0$	$r = n : 1$ $r \neq n : 0$
N nicht unterscheidbar R nicht unterscheidbar	$\sum_{k=1}^r P_{n,k}$	$r \geq n : 1$ $r < n : 0$	$n \geq r : P_{n,r}$ $n < r : 0$	$r = n : 1$ $r \neq n : 0$

Beliebige Aufteilung:

- Keine speziellen Regeln bei der Aufteilung (Man kann die Kugeln verteilen wie man möchte)
 \Rightarrow Ein Fach darf leer sein, kann eine Kugel haben oder mehrere Kugeln haben
- Alle Kugeln müssen benutzt werden

Injektive Aufteilung:

- Jedes Fach darf höchstens eine Kugel enthalten (Kein Fach darf mehr als eine Kugel enthalten)
 \Rightarrow Fächer dürfen leer bleiben (wenn Anzahl Fächer $>$ Anzahl Kugeln)
- Nicht jede Kugel muss benutzt werden

Surjektive Aufteilung:

- Jedes Fach muss mindestens eine Kugel enthalten
 \Rightarrow Kein Fach darf leer sein
 \Rightarrow Einige Fächer können mehr Kugeln haben als andere (wenn Anzahl Fächer $<$ Anzahl Kugeln)
- Nicht jede Kugel muss benutzt werden


Surjektive Aufteilung:

- Jedes Fach muss genau eine Kugel enthalten
 \Rightarrow Kein Fach darf leer sein
 \Rightarrow Kein Fach darf mehre Kugeln enthalten

\Rightarrow Anzahl Kugeln = Anzahl Fächer

- Jede Kugel muss somit benutzt werden

1.2 Aus einer Menge N mit n Elementen sollen alle oder k Elemente ausgewählt werden



- Mit Beachtung der Reihenfolge: $ABC \neq ACB \neq BAC \neq BCA \neq CAB \neq CBA$
- Ohne Beachtung der Reihenfolge: $ABC = ACB = BAC = BCA = CAB = CBA$

Kombination:

Exakte Auswahl: Aus einer Menge mit n Elementen wählt man (*genau*) k aus.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Mindestauswahl (Allgemein): Wie viele Möglichkeiten gibt es *mindestens* k von n (z.B. mindestens 7 von 10) richtig zu beantworten?

- Man rechnet immer mit Plus (+)

$$\binom{10}{7} + \binom{10}{8} + \binom{10}{9} + \binom{10}{10} = 176$$

Mindestauswahl (mit getrennter Betrachtung): Wie viele Möglichkeiten gibt es, falls von den ersten 5 Fragen *genau* 3 und von den nächsten 5 *genau* 4 richtig beantwortet werden müssen?

- Man rechnet immer mit Mal (\cdot)

$$\binom{5}{3} \cdot \binom{5}{4} = 50$$

Mindestauswahl (mit kombinierter Betrachtung): Wie viele Möglichkeiten gibt es, falls von den ersten 5 Fragen *mindestens* 3 richtig beantwortet und insgesamt *genau* 7 richtig beantwortet werden müssen?

- Man rechnet immer mit Plus (+) und Mal (\cdot)

$$\binom{5}{3} \cdot \binom{5}{4} + \binom{5}{4} \cdot \binom{5}{3} + \binom{5}{5} \cdot \binom{5}{2}$$

1.3 Rekursionsgleichungen

1. Gleichung umstellen:

- Rekursionsgleichung in einen homogenen (links) und einen inhomogenen Teil (rechts) teilen
- **Homogener Teil:** Überall wo ein a vorhanden ist
- **Inhomogener Teil:** Rest wo kein a vorhanden ist

$$\text{homogener Teil} = \text{inhomogener Teil}$$

2. Allgemeine Lösung des homogenen Teils berechnen:

- Das Charakteristische Polynom aufstellen indem man alle a_n mit λ^n ersetzt

$$p(\lambda) = x_m \lambda^{n_m} + x_{m-1} \lambda^{n_{m-1}} + \dots x_0 + \lambda^{n_0}$$

- Das Charakteristische Polynom lösen, durch finden der Nullstellen
 - Bei Polynom zweiten Grades (λ^2) pq-Formel verwenden: $-\frac{-p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$

$$x_m \lambda^{n_m} + x_{m-1} \lambda^{n_{m-1}} + \dots x_0 + \lambda^{n_0} = 0$$

- Allgemeine Lösung für homogenen Teil setzt sich aus den Nullstellen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ zusammen
 - Falls die Nullstellen verschieden (und reelle Zahlen) sind ist die allgemeine Lösung des homogenen Teils:

$$a_{h,n} = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n + \dots + c_k \lambda_k^n$$

- Falls die Nullstellen gleich (und reelle Zahlen) sind ist die allgemeine Lösung des homogenen Teils:

$$a_{h,n} = c_1 \lambda_1^n + c_2 n \lambda_2^n + c_3 n^2 \lambda_3^n + \dots + c_k n^{k-1} \lambda_k^n$$

3. Ansatz für Spezielle Lösung des inhomogenen Teils herleiten:

- Mit Hilfe der Tabelle lässt sich ein Ansatz für die spezielle Lösung des inhomogenen Teils herleiten (vermutete spezielle Lösung)
- Dieser wird mit $a_{s,n}$ bezeichnet

	Ansatzfunktion: $y_{s,n}$
b (Konstante)	B (Konstante)
n	$B_1 n + B_0$
$n^t, t \in \mathbb{N}$	$B_t n^t + B_{t-1} n^{t-1} + \dots + B_1 n + B_0$
$r^n, r \in \mathbb{R}$	$B r^n$
$n^t r^n$	$r^n (B_t n^t + B_{t-1} n^{t-1} + \dots + B_1 n + B_0)$

4. Ansatz der Spezielle Lösung in den homogenen Teil einsetzen, um die spezielle Lösung zu erhalten:

- Ansatz der Spezielle Lösung in den homogenen Teil einsetzen
- Koeffizientenvergleich zum bestimmen der speziellen Lösung

5. a_n bestimmen

- Kombiniere die allgemeine Lösung des homogenen Teils und die spezielle Lösung des inhomogenen Teils:

$$a_n = a_{h,n} + a_{s,n}$$

6. Gegebenes a_0 und a_1 benutzen

- Gegebenen Anfangswerte in die allgemeine Lösung eingesetzt, um die spezifischen Werte der Konstanten zu bestimmen, die benötigt werden, um die endgültige Lösung zu finden.

Beispiel: $a_{n+2} = 49a_n + 48n - 98, \quad n \geq 0 \quad a_0 = 5, a_1 = 8$

1. Gleichung umstellen

$$a_{n+2} - 49a_n = 48n - 98$$

2. Allgemeine Lösung des homogenen Teil berechnen

- Ersetze alle a_n mit λ^n
- $a_{n+2} \rightarrow \lambda^2$ und $-49a_{n+0} \rightarrow -49\lambda^0 = -49$

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 49$$

- Nullstelle bestimmen (λ_1 und λ_2)

$$\lambda^2 - 49 = 0 \rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 7$$

- Allgemeine Lösung für homogenen Teil:

$$a_{h,n} = c_1 7^n + c_2 (-7)^n$$

3. Ansatz für spezielle Lösung des inhomogenen Teil

- Nach Tabelle Ansatz für spezielle Lösung aufstellen

$$a_{s,n} = b_1 n + b_2$$

	Ansatzfunktion: $y_{s,n}$
b (Konstante)	B (Konstante)
n	$B_1 n + B_0$
$n^t, t \in \mathbb{N}$	$B_t n^t + B_{t-1} n^{t-1} + \dots + B_1 n + B_0$
$r^n, r \in R$	$B r^n$
$n^t r^n$	$r^n (B_t n^t + B_{t-1} n^{t-1} + \dots + B_1 n + B_0)$

4. Ansatz für spezielle Lösung in homogenen Teil einfügen

- homogener Teil: $a_{n+2} - 49a_n$
- Ansatz spezielle Lösung: $a_{s,n} = b_1 n + b_2$
- inhomogener Teil: $48n - 98$

$$\begin{aligned} b_1(n+2) + b_2 - 49(b_1 n + b_2) &= 48n - 98 \\ b_1 n + 2b_1 + b_2 - 49b_1 n - 49b_2 &= 48n - 98 \end{aligned}$$

- Nun vergleicht man die Koeffizienten der speziellen Lösung (n^1, n^0)
- inhomogener Teil: $48n - 98$

$$n^1 : b_1 - 49b_1 = -48b_1 = 48 \rightarrow b_1 = -1$$

$$n^0 : 2b_1 + b_2 - 49b_2 = -98 \rightarrow b_2 = 2$$

- Nun setzt man die ermittelten Werte in den Ansatz der speziellen Lösung ein und erhält die spezielle Lösung

$$a_{s,n} = -1n + 2$$

a_n **bestimmen**

$$\begin{aligned} a_n &= a_{h,n} + a_{s,n} \\ a_n &= c_1 7^n + c_2 (-7)^n - 1n + 2 \end{aligned}$$

a_0 und a_1 **benutzen um c_1 und c_2 zu bestimmen**

- $a_0 = 5, a_1 = 8$

$$\begin{aligned} a_0 : c_1 7^0 + c_2 (-7)^0 - 1 \cdot 0 + 2 &= 5 \\ c_1 - c_2 + 2 &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_1 : c_1 7^1 + c_2 (-7)^1 - 1 \cdot 1 + 2 &= 8 \\ 7c_1 - 7c_2 - 1 + 2 &= 8 \end{aligned}$$

- a_0 nach c_1 umstellen und in a_1 einsetzen um c_2 zu bestimmen
- dann c_2 in c_1 einsetzen um c_1 zu erhalten
- Werte von c_1 und c_2 in a_n einsetzen, das Ergebnis ist die allgemeine Lösung

$$\begin{aligned} a_0 : c_1 - c_2 + 2 &= 5 \\ c_1 &= 3 + c_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_1 : 7(3 + c_2) - 7c_2 - 1 + 2 &= 8 \\ \dots \end{aligned}$$

$$a_n = c_1 7^n + c_2 (-7)^n - 1n + 2$$

Hier c_1 und c_2 mit eigentlichen Werten ersetzen

2 Codierung

2.1 Allgemeines

- Linearer (n, m) -Code C
- $a \times b$ Matrix: $n = b$ und $m = a$

2.2 Wichtige Formeln

- Blocklänge: n
- Linear unabhängige Wörter/Dimension des Unterraums C : m
- Anzahl Codewörter: $|C| = q^m$, wobei q Anzahl Elemente in C
- Anzahl Wörter in Standardfeld: q^n
- Anzahl Wörter in Syndromtabelle: q^{n-m}
- Hamming Code: $n = \frac{q^{n-m} - 1}{q - 1}$
- Schätzen der Codedistanz (Singleton-Schranke): $d(C) \leq n - m + 1$
- Fehlererkennend: $(n - m)$
- Fehlerkorrigierend: $\left\lfloor \frac{(n - m)}{2} \right\rfloor$
- t -fehlererkennend: $d(C) \leq t + 1$, das ausgewählte t ist, wie viel Fehler der Code erkennt
- t -fehlerkorrigierend: $d(C) \leq 2t + 1$, das ausgewählte t ist, wie viele Fehler der Code korrigiert

2.3 Codewörter sind gegeben

n und m bestimmen

$n = \text{Länge der Codewörter} \Rightarrow n = 5$

00000

01101

10111

11010

$m = \text{Dimension} \Rightarrow m = 2$

00000

01101

10111

11010

Hamming-Distanz/Code-Distanz/ $d(c)$

- Hamming-Distanz ist die minimale Änderung des Gewichts
- Wird mit $d(C)$ bezeichnet

Beispiel:

- Anzahl Einsen in Codewörter Zählen
- $0 \dots 0$ wird dabei nicht beachtet

01101 \rightarrow Gewicht: 3

10111 \rightarrow Gewicht: 4

11010 \rightarrow Gewicht: 3

- Gewicht der Codewörter vergleichen und minimalstes auswählen

$\Rightarrow d(C) = 3$, da es minimal ist

t-fehlererkennend

t-fehlerkorrigierend

t-ausfällekorrigierend

Kanonische Generatormatrix

- Definition: Aus der Generatormatrix kann man alle möglichen Codewörter der Sprache erzeugen.
- Falls die Generatormatrix gegeben ist, lässt sich die kanonische Generatormatrix durch das Anwenden des Gaußschen Verfahrens auf die Generatormatrix erstellen.
- Größe: $(m \times n)$
- Aufbau: $G = (E \ G')$
 - E : Einheitsmatrix
 - G' : Linear unabhängiger Rest aus Codewörtern

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Kanonische Kontrollmatrix

- Definition: Erfüllt ein Wort $wort \cdot kontrollmatrix = 0$ ist es ein richtiges Codewort.
- Größe: $n \times (n - m)$
- Aufbau: $H = \begin{pmatrix} -G \\ E \end{pmatrix}$
 - E : Einheitsmatrix
 - $-G$: Linear unabhängiger Rest aus Codewörtern

$$H = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Modulo mit negativen Zahlen:

	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
\mathbb{Z}_2									0	1	[0	1]								
\mathbb{Z}_3								0	1	2	[0	1	2]							
\mathbb{Z}_4							0	1	2	3	[0	1	2	3]						
\mathbb{Z}_5						0	1	2	3	4	[0	1	2	3	4]					
\mathbb{Z}_6					0	1	2	3	4	5	[0	1	2	3	4	5]				
\mathbb{Z}_7				0	1	2	3	4	5	6	[0	1	2	3	4	5	6]			
\mathbb{Z}_8			0	1	2	3	4	5	6	7	[0	1	2	3	4	5	6	7]		
\mathbb{Z}_9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	[0	1	2	3	4	5	6	7	8]	
\mathbb{Z}_{10}	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	[0	1	2	3	4	5	6	7	8	9]

2.4 Syndromtabelle

- Definition: Identifiziert und korrigiert Fehler in Codewörter durch Vergleich mit erwarteten Werten.
- Anzahl Zeilen: q^{n-m}
- Anzahl Spalten: n

Beispiel: (7×3) -Kontrollmatrix, $n = 7, m = 4$

	a	$S = a \cdot H$	
$H = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{blue}{1} & 0 & 1 \\ \textcolor{green}{0} & \textcolor{green}{1} & \textcolor{green}{1} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	0000000	000	
	1000000	111	• Anzahl Zeilen: $2^{7-4} = 8$
	0100000	101	• Anzahl Spalten: 7
	0010000	011	• Wenn über 0000001 hinaus geht egal ob 1000001, 1100000, ...
	0001000	110	
	0000100	100	
	0000010	010	
	0000001	001	

1. Überprüfen ob es ein empfangenes Codewort fehlerfrei ist ($\text{wort} \cdot \text{kontrollmatrix} = 0$)

- Empfangenes Wort: $y = 1010010$

$$1010010 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 110 \neq 0 \Rightarrow \text{Fehler im empfangenen Codewort}$$

2. Codewort durch Syndromtabelle korrigieren

- Klassenanführer von 110 aus Syndromtabelle ablesen: $a = 0001000$
- $\text{empfangenes Codewort} - \text{Klassenanfuhrer} = \text{korrigiertes Codewort}$

$$\begin{array}{r} y \quad 1010010 \\ a \quad - \quad 0001000 \\ \hline 1011010 \end{array}$$

- korrigiertes Codewort: 1011010

3. Nachricht extrahieren

- Letzte Stellen des korrigierten Codewort entfernen, um die Nachricht zu erhalten (Anzahl entfernte Stellen entspricht Länge des Syndrom).
- Nachricht: $1011\cancel{010} = 1011$

2.5 Standardfeld

2.6 Kontrollmatrix zu Generatormatrix umwandeln

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^T$$


3 Graphentheorie

3.1 Grundbegriffe

$G(V, E)$, V = Vertices = Knoten, E = Edges = Kanten


Gerichteter Graph

- Kante geht nur in *eine* Richtung




Ungerichteter Graph

- Kante geht nur in *beide* Richtung




Zusammenhängender Graph

- Verbindung von einem Knotenpunkt zu allen anderen
- Verbindungen müssen nicht direkt sein
- Gibt keine isolierten Knoten




Nichtzusammenhängender Graph

- Wenn ein Knoten isoliert ist und keine Verbindung herrscht




Gewichteter Graph

- Die Kanten bekommen Gewichte zugewiesen




Knotengrad

- Anzahl Kanten die von einem Knoten ausgehen




Euler-Zyklus/Eulersch

- Anfangszustand = Endzustand
- Alle Knoten haben einen geraden Grad




Euler-Pfad

- Jede Kante wird genau einmal durchlaufen
- Keine Kante wird mehrmals durchlaufen
- Startknoten muss nicht gleich Endknoten sein
- Genau zwei Knoten haben einen ungeraden Grad




Hamilton-Zyklus

- Anfangszustand = Endzustand
- Alle Knoten geraden Grads




Hamilton-Pfad

- Jede Kante wird genau einmal durchlaufen
- Keine Kante wird mehrmals durchlaufen
- Startknoten muss nicht gleich Endknoten sein





Bipartit

- Man kann alle Knoten in zwei (disjunkte) Teilmengen/Gruppen aufteilen
- Jede Verbindung geht dabei von einer Teilmenge/Gruppe in die andere
- Es darf allerdings keine Verbindung der Knoten innerhalb der eigenen Teilmenge/Gruppe geben



Beispiel: Zeigen ob ein Graph bipartit ist

- Beliebigen Knoten auswählen und färben (z.B blau).
- Alle benachbarte Knoten mit einer anderen Farbe färben (z.B grün)
- Wiederholen: Alle Knoten die an einen blauen Knoten angrenzen, grün und alle Knoten, die an einen grünen Knoten angrenzen, blau färben.
- Prüfung: Wenn man auf einen Knoten stößt, der bereits gefärbt ist und dessen Farbe sich von der Farbe unterscheidet, die man ihm zuweisen möchten, dann ist der Graph *nicht bipartit*. Wenn man alle Knoten ohne solche Konflikte färben konnte, ist der Graph *bipartit*.
- Die blauen Knoten sind am Ende die eine Teilmenge/Gruppe und die grünen Knoten sind am Ende die andere Teilmenge/Gruppe



Planar

- Ein Graph ist planar, wenn man ihn so zeichnen kann, dass sich seine Kanten nirgendwo kreuzen.


(Nicht) Planarität prüfen:

1 Methode:

- $n = |V|$ (Anzahl Knoten) und $m = |E|$ (Anzahl Kanten) bestimmen
- Hat der Graph einen Zyklus der Länge 3?
 - **Ja:** $m \leq 3n - 6$
 - **Nein:** $m \leq 2n - 4$
 - Gilt $m \not\leq 3n - 6$ oder $m \not\leq 2n - 4$ ist der Graph *nicht planar*
 - **Achtung:** Die Formel macht nur eine Aussage darüber, ob der Graph nicht planar ist, aber nicht, ob ein Graph planar ist. Gilt also $m \leq 3n - 6$ oder $m \leq 2n - 4$ heißt es nicht, dass der Graph planar ist. Man kann also nur die Nichtplanarität überprüfen.

2 Methode:

- Ist der K_5 oder $K_{3,3}$ der Graph oder ein Teilgraph ist der ein Graph immer *nicht planar*





K_5 (links), $K_{3,3}$ (rechts)

3 Methode:

- Graphen versuchen so zu zeichnen dass ein planarer Graph rauskommt (umständlich)


3.2 Kürzester Weg

Dijkstra




A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
0(A)									A
0(A)	9(A)		5(D)						A, D
0(A)	7(D)		5(D)	18(E)		31(D)	23(D)		A, D, B
0(A)	7(D)	11(B)	5(D)	17(E)	13(B)	31(D)	23(D)		A, D, B, C
0(A)	7(D)	11(B)	5(D)	17(E)	13(B)	31(D)	23(D)		A, D, B, C, F
0(A)	7(D)	11(B)	5(D)	14(F)	13(B)	31(D)	18(F)	17(F)	A, D, B, C, F, E
0(A)	7(D)	11(B)	5(D)	14(F)	13(B)	31(D)	17(E)	17(F)	A, D, B, C, F, E, H
0(A)	7(D)	11(B)	5(D)	14(F)	13(B)	31(D)	17(E)	17(F)	A, D, B, C, F, E, H, I
0(A)	7(D)	11(B)	5(D)	14(F)	13(B)	31(D)	17(E)	17(F)	A, D, B, C, F, E, H, I, G

Floyd



	<i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
	<i>a</i>	0	6	2	12	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>b</i>	6	0	3	4	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
	<i>c</i>	2	3	0	9	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>
	<i>d</i>	12	4	9	0	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
1	<i>a</i>	0	6	2	12	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
1	<i>b</i>	6	0	3	4	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
1	<i>c</i>	2	3	0	9	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>
1	<i>d</i>	12	4	9	0	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
2	<i>a</i>	0	6	2	10	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
2	<i>b</i>	6	0	3	4	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
2	<i>c</i>	2	3	0	7	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>b</i>
2	<i>d</i>	10	4	7	0	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>d</i>
3	<i>a</i>	0	5	2	9	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
3	<i>b</i>	5	0	3	4	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
3	<i>c</i>	2	3	0	7	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>b</i>
3	<i>d</i>	9	4	7	0	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>d</i>
4	<i>a</i>	0	5	2	9	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
4	<i>b</i>	5	0	3	4	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
4	<i>c</i>	2	3	0	7	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>b</i>
4	<i>d</i>	9	4	7	0	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>d</i>

FIFO



D(s,1)	D(s,2)	D(s,3)	D(s,4)	D(s,5)	R(1)	R(2)	R(3)	R(4)	R(5)	S
0										1
0	1	4				1	1			2 < 3
0	1	4	7	12		1	1	2	2	3 < 4 < 5
0	0	4	7	12		3	1	2	2	4 < 5 < 2
0	0	4	6	11		3	1	2	4	5 < 2
0	0	4	6	11		3	1	2	4	2
0	0	4	6	10		3	1	2	4	4
0	0	4	6	10		3	1	2	4	5
0	0	4	6	10		3	1	2	4	