

## Chapter 6 - Geometrische Algorithmen

### Ausweg aus Labyrinth

#### PLEDGE-STRATEGIE

```
Solange  $R \in L$ 
    gehe vorwaerts,
    bis Wand kontaktiert wird

    gehe links der Wand,
    bis  $\notin L$  oder  $\phi = 0$ 
```

Drehwinkel immer im Vergleich zur Ausgangsposition. Immer Aufsummieren  $\Rightarrow$  mehr als  $2\pi$  möglich. Wenn  $\phi = 0$  bleibt R nicht stehen, sondern geht geradeaus.

#### Polygone

Polygonzug:  $P : p_1, \dots, p_m, p_i$  Ecken  
 $P$  geschlossen  $\Leftrightarrow p_1 = p_m$   
 $P$  einfach  $\Leftrightarrow$  Kanten schneiden sich nicht  
planares Gebiet  $\hat{=}$  einfaches Polygon  $\Leftrightarrow$  Rand einf. Polygonzug

### Zum Ziel in unbekannter Umgebung

#### WANZE

```
Solange  $r \neq z$ 
    lauf in Richtung  $z$ 
    bis  $r = z$  oder  $\exists i : r \in P_i$ 
    falls  $r \neq z$ 
        umlaufe  $P_i$  und suche
        ein  $q \in \min_{x \in P_i} ||x - z||_2$ 
        gehe zu  $q$ 
```

Bewegung von WANZE kann mit  $z, l, r$  beschrieben werden.  
 $\exists$  universelles Steuerwort.

#### Türsuche

#### Kompetitivität

Problem  $P$ , Eingabemenge  $E$ , Algorithmus  $A$ .  $k_{opt} : E \rightarrow N$  und  $k_A : E \rightarrow N$  Größe der optimalen und der mit  $A$  berechneten Lsg.

Falls  $k_A \leq a + ck_{opt} \forall$  Eingaben  $E$ , heißt  $A$   $c$ -kompetitiv.

#### TUERSUCHE

```
i  $\leftarrow$  1
Bis Tuer gefunden
    gehe i Meter der Wand entlang
    und zurueck (Laufrichtung aendert sich)
    (1) i = i + 1 // nicht kompetitiv
    (2) i = 2 * i // 9-kompetitiv
```

Bsp.: Kompetitivitätsbeweis

$$\begin{aligned} \text{Weglänge} &\leq 2 \sum_{i=0}^{n+1} 2^i + 2^{n+\delta} \\ &\leq 2^{n+3+\delta} + 2^{n+\delta} \\ &\leq 9 * 2^{n+\delta} \end{aligned}$$

### Sternsuche

#### Sternsuche

```
 $\forall i \in \mathbb{N}_0 : f_i \leftarrow \left(\frac{m}{m-1}\right)^i$ 
i  $\leftarrow$  0
Bis  $z$  gefunden
    gehe  $f_i$  Einheiten auf  $H_{i \bmod m}$ 
    entlang und zurueck
    i  $\leftarrow$  i + 1
```

$$\begin{aligned} \text{Kompetitivität: } c &:= 2m \left(\frac{m}{m-1}\right)^{m-1} + 1 \\ &= 2m \left(1 + \frac{1}{m-1}\right)^{m-1} + 1 < 2me + 1 \end{aligned}$$

### Suche in Polygonen

Bem.: nicht kompetitiv, aber  $\exists$  Strategien für die gilt  $\frac{l}{d} \in O(\# \text{ Ecken von } P)$ .

Es gibt nur einen kürzesten Weg von  $s$  nach  $z$ , dessen Ecken außer  $s$  und  $z$  nur Ecken von  $P$  sind.