

Broncofibroscopia

Informações e cuidados após uma broncoscopia.

Cuidados após o exame

- Faça a primeira ingestão de líquidos e sólidos 2 horas após o exame.
- Nas primeiras horas pode sentir desconforto ou dor na garganta, tosse e dificuldade em engolir. Pode ter expectoração raiada de sangue nas primeiras 48 a 72 horas, sobretudo se forem efetuadas biópsias.

Sinais e sintomas de alerta

- Falta de ar.
- Dor no peito.
- Perda de sangue por via oral e/ou associada à tosse após 72 horas.
- Febre. Se ocorrer nas primeiras 48 horas, fazer paracetamol de 8 em 8 horas.
- Reação alérgica a medicamentos.
- Se foi anestesiado, inflamação, dor, calor ou inchaço no local da punção venosa.

Se efetuou o exame sob anestesia

- Não pode conduzir nem manobrar máquinas nas próximas 24 horas.
- Terá de sair do hospital acompanhado e permanecer o resto do dia em casa, a repousar.
- Não pode trabalhar.
- Não deve tomar decisões importantes, como assinar documentos.

Contactos

Se após o exame notar algo de anormal, contacte a Unidade de Exames Especiais através dos números 967 776 921 ou 210 025 255/0, nos dias úteis entre as 08h e as 20h. Contacte também o seu médico assistente ou dirija-se a um serviço de urgência.