배치 건강 진단 개인 표 (1차)

주민등록번호	890909-5******	이름	판자쥔	나이	37	성별	남	사원번호	
근로자주소	서울 구로구 우마2길 20-8 2층 201호현							전화번호	010-5927-7586
사업체명	대건설 디에이치 클래스트(신반포)알			업종					
현작업부서	폼	현작업내용	알폼					관할지청(청)	서울청
입사년월일	2026-10-13	현직전입일	2026-10-13	노출기간				1일노출시간	8

과거직력	작업공정명	근무년수	기간
	알폼	4	

문진		진찰	
	과거병력	특이소견없음	신경계 이비인후과 안과, 피부과 진동장애 등 특이소견없음
	가족력	특이소견없음	
	업무기인성	특이소견없음	
	흡연,음주	특이소견없음	

취급물질	(배)소음, 알루미늄및그화합물, 진동, 자외선, 광물성분진
현재증상	특이 증상 없음

항목	신장 (cm)	체중 (kg)	혈압 (mmHg) 최고	혈압 (mmHg) 최저	
참고치					흉부방사선검사 (촬영번호 :)
					판독의사면허 (면허번호 : 1051) 이경효
현재결과	172.0	76.0	119	78	특이사항없음

치과소견		치과의사	(인)

건강진단항목				
검사항목	검사결과	참고치	()년도	()년도
신장	172.0cm	0-0		
체중	76.0kg	0-0		
허리둘레	75.0	0-89.9		
혈압(최고)	119mmHg	85~139		
혈압(최저)	78mmHg	50-89		
(좌)악력검사	34.1			
(우)악력검사	30.9			
통각	정상	정상		
진동각	정상	정상		
손톱압박검사	정상	정상		
(좌)이경	특이사항무	특이사항무		
(우)이경	특이사항무	특이사항무		
(좌)기도청력 500Hz	12dB	-10-39		
(좌)기도청력 1000Hz	10dB	-10-39		
(좌)기도청력 2000Hz	11dB	-10-29		
(좌)기도청력 3000Hz	10dB	-10-39		
(좌)기도청력 4000Hz	16dB	-10-39		
(좌)기도청력 6000Hz	37dB	-10-39		
(우)기도청력 500Hz	10dB	-10-39		
(우)기도청력 1000Hz	10dB	-10-39		
(우)기도청력 2000Hz	10dB	-10-29		
(우)기도청력 3000Hz	15dB	-10-39		
(우)기도청력 4000Hz	30dB	-10-39		
(우)기도청력 6000Hz	28dB	-10-39		

청진	정상	정상		
FVC	4.44	0-0		
FVC%	92.6	80-200		
FEV1	3.48	0-0		
FEV1%	82	80-200		
FEV1/FVC(%)	77.4	70-200		
PEF	7.44			
폐활량결과	정상	정상		
흉부X선	특이사항없음	특이사항없음|비활동성(C)|비활동성 폐결핵		

판정	검진소견	사후관리조치	업무수행적합여부	유해인자별 건강구분 유해인자	건강구분
A	(배)소음(좌):특이소견 없음	건강양호(필요없음)	가	(배)소음(좌)	A
	(배)소음(우):특이소견 없음	건강양호(필요없음)		(배)소음(우)	A
	알루미늄및그화합물:특이소견 없음	건강양호(필요없음)		알루미늄및그화합물	A
	진동:특이소견 없음	건강양호(필요없음)		진동	A
	자외선:특이소견 없음	건강양호(필요없음)		자외선	A
	광물성분진:특이소견 없음	건강양호(필요없음)		광물성분진	A

건강진단정보			
건강진단일자	2026-10-13	다음검진일	
건강진단기관	한강수병원		
건강진단의사	박선욱	근로자	판자쥔

1. 건강관리구분 · 사후관리내용 및 업무적합성 평가

(뒷쪽)

건강관리구분		사후관리내용		업무수행적합여부(질병유소견자에 대하여 구분함)	
A	건강한 근로자 또는 경미한 이상소견이 있는 근로자	0	필요없음	가	건강관리상 현재의 조건하에서 작업이 가능한 경우
		1	건강상담		
C_1	직업성 질병으로 진전될 우려가 있어 추적검사 등 관찰이 필요한 근로자(요관찰자)	2	보호구착용	나	일정한 조건(환경개선, 개인보호구 착용, 건강진단의 주기를 앞당기는 경우 등)하에서 현재의 작업이 가능한 경우
		3	추적검사		
C_2	일반질병으로 진전될 우려가 있어 추적관찰이 필요한 근로자(요관찰자)	4	근무중치료		
		5	근로시간 단축	다	건강장해가 우려되어 한시적으로 현재의 작업을 할 수 없는 경우 (건강상 또는 근로조건상의 문제를 해결한 후 작업복귀 가능)
C_N	질병으로 진전될 우려가 있어 야간작업시 추적관찰이 필요한 근로자(요관찰자)	6	작업전환		
D_1	직업성질병의 소견이 있는 근로자(직업병 유소견자)	7	근로금지 및 제한		
D_2	일반질병의 소견이 있는 근로자(일반질병 유소견자)	8	직업병확진의뢰안내 (건강진단기관이 안내)	라	건강장해의 악화 혹은 영구적인 장해발생으로 현재의 작업을 해서는 안되는 경우
D_N	질병의 소견을 보여 야간작업시 사후관리가 필요한 근로자(유소견자)	9	기타		
R	건강진단 1차검사결과 건강수준의 평가가 곤란하거나 질병이 의심되는 근로자(제2차건강진단 대상자)				

※ 특수건강진단 과정에서 퇴직 등의 사유로 건강관리구분을 판정할 수 없는 경우에는 "U"로 분류함.

2.건강관리참고사항

유해요인			인체에 미치는 영향	예방
1. 화학적인자	유기화합물		-눈, 피부, 호흡기 점막의 자극 증상 -농도에 따라 다양한 정도의 마취되기전 증상이 나타난다. 즉, 어지러움증, 두통, 도취감(흥분), 피로, 졸음, 구역, 지남력 상실, 가슴통증에 이어 흡수농도가 증가 되면 점차적으로 의식을 잃을 수 있다. -만성 피로 시에는 감각 혹은 운동기능 이상, 기억력저하, 피로, 신경질, 불안 등의 신경계통의 장해를 유발하기도 한다.	-유기용제가 들어있는 통은 필요할 때 이외에는 반드시 마개 혹은 뚜껑으로 막아 놓는다. -작업장에서는 흡연이나 음식물의 섭취를 금하고 작업이 끝난 후에는 작업복으로 갈아입고 세면을 한다. -인체에 유기용제 증기가 흡입되지 않도록 유의하며, 유기용제용 방독마스크, 보호장갑 및 작업복 등 개인보호구를 반드시 착용한다.
	금속류	수은	-식욕부진, 두통, 전신권태, 정미한 몸 떨림, 불안, 호흡곤란, 화학성 폐렴, 입술부위의 창백, 메스꺼움, 설사, 정신장애 증세를 보이고 피부의 알레르기화, 기억상실, 우울증세를 나타낼 수 있다. 그리고 피부흡수를 통해 전신독성을 나타낼 수 있다.	-용기는 반드시 밀폐해 둔다. -송기(送氣)마스크 또는 방독마스크, 보호의, 불침투성 보호앞치마, 보호장갑, 보호장화를 착용하고 작업한다.
		연 · 4알킬연	-연이 체내에 흡수되면 초기에는 피로를 느끼고, 잠이 잘 안오며 팔 다리의 통 증, 식욕감퇴 등의 증세가 나타날 수 있으며 계속하여 체내에 흡수되는 납이 증가하면 갑자기 배가 아프거나 관절에 통증이 느껴질 수 있으며, 어지럽고 손발에 힘이 약해지는 증세가 올 수 있음. -4알킬연은 무기연화합물보다 독성이 강하며, 호흡기로 흡수되어 주로 중추신경계통에 작용하고 간과 골수, 신장, 뇌 등에 장해를 준다. -급성중상:무기연과는 달리 중추신경계의 증상이 강하게 나타나는데 노출 수 일 후에 불안, 흥분, 근육연축, 망상, 환상이 일어나고 혈압저하, 체질저하, 맥박수가 감소한다.	-음식물을 골고루 섭취하고 흡연, 과음을 삼가며 적당한 운동으로 체력을 유지함. -개인위생(식사전 세수, 방독마스크 착용, 작업복 세탁 등)을 철저히 지키고 근본적으로 납이 체내에 들어오는 것을 예방하는 것이 바람직함. -화기접근을 금한다. -누설의 유무를 매일 1회이상 점검한다. -작업은 교대로 실시(1일 노출시간을 가급적 단축)한다. -송기(送氣)마스크 또는 유기가스용 방독면, 보호장갑, 보호장화, 보호의 등을 착용하고 작업한다.
		카드뮴	-만성적으로 노출되면 신장장해, 만성 폐쇄성 호흡기 질환 및 폐기종을 일으키며 골격계장해와 심혈관계 장해도 일으키는 것으로 알려져 있다. -기침, 가래, 콧물, 후각이상, 식욕부진, 구토, 설사, 체중감소 등이 나타나고 앞니나 송곳니, 치은부에 연한 황색의 환상 색소침착을 볼 수 있다.	-작업장의 공기중 카드뮴 농도를 낮게 유지하고 작업장을 청결하게 한다. -작업장 내에서 식사나 흡연은 절대 금물이며 작업복은 자주 갈아입는다. -적절한 보호구(방진마스크, 보호장갑 등)를 착용하고 작업한다.
		망간	-수면방해, 행동이상, 신경증상, 발음부정확 등	-보호구 착용을 철저히 한다. -환기를 철저히 한다. -작업수칙을 철저히 지킨다. -호흡기 질환, 신경질환, 간염, 신장염이 있는 근로자는 해당 업무에 종사하지 않도록 한다.
		오산화바나듐	-눈물이 나옴, 비염, 인두염, 기관지염, 천식, 흉통, 폐염, 폐부종, 피부습진 등	
		니켈	-폐암, 비강암, 눈의 자극증상, 발한, 메스꺼움, 어지러움, 경련, 정신착란 등	
	산 및 알카리류		-심한 호흡기 자극으로 일시적으로 숨이 막히고 기침이 난다. -피부를 바늘로 찌르는 듯한 통증이 생긴다. -화상을 입을 수 있다. -장기 노출 시에는 치아부식증 및 기관지 등에 만성적인 염증이 생길 수 있다.	-마스크를 착용한다. -방수된 보호의, 고무장갑, 보호면을 착용하여 피부접촉을 방지한다. -보호용 안경을 착용한다.
	가스상 물질류		-대부분 가스상으로 호흡기를 통하여 인체에 들어와 건강장해를 일으키며 이외에도 피부나 경구적으로도 침입될 수 있는 물질이 많고 일반적으로 신경 장해(마취작용), 피부염 등이 일어날 수 있다. -짧은 기간 동안 많은 양에 노출되면 눈, 코, 목, 피부 및 점막 등을 자극한다.	-화기에 주의한다. -작업환경에서 발생한 가스흄, 분진 등은 유해가스용 방독마스크, 보호의, 장갑 등을 착용하고 필요 시, 세수, 샤워 등 개인위생을 잘 지킨다. -유해물 등이 저장장소에서 유출되지 않도록 철저히 보관, 관리한다.
	영제88조에 의한 허가대상 물질	석면	-만성장해로서는 석면폐 등을 일으킬 수 있고 기침, 담 등 기관지염 증상을 수반하고 호흡곤란, 심계항진 등을 호소하며, 폐암 및 중피종이 발생할 수 있으므로 발암물질로 규정하고 있다.	-방진마스크, 보안경을 착용한다. -작업 후 목욕을 실시한다. -작업복은 작업 시에만 착용하고 작업 후에는 반드시 갈아 입는다. -석면취급 근로자는 반드시 금연하여야 한다.
		베릴륨	-기관지염, 폐염, 접촉성 피부염, 기침, 호흡곤란, 폐의 육아종 형성	-보호구 착용을 철저히 한다. -환기를 철저히 한다. -작업수칙을 철저히 지킨다. -호흡기 질환, 신경질환, 간염, 신장염이 있는 근로자는 해당 업무에 종사하지 않도록 한다.
		비소	-접촉성 피부염, 비중격 점막의 괴사, 다발성신경염 등	
2. 분진			-광물성분진: 진폐증의 자·타각증상이나 소견은 호흡기계에서 비롯된 호흡 곤란, 기침, 담액과다, 흉통, 혈담, 피로 등의 증상이 나타난다. -면분진: 특징적인 자각증상인 월요증상(Monday disease)은 흉부압박감, 가슴통증, 호흡곤란, 기침 등인데 특히 월요일에 심하며 주말에 이를수록 점차 경미하여 진다(월요일에는 면분진에 노출되지 않는 것을 전제로 한다).	-발진 공정의 습식화 및 분진억제 대책을 수립, 시행한다. -발진원 포위 격리 및 밀폐 등을 실시한다. -방진마스크를 반드시 착용하고 작업한다.
3. 물리적인자	소음		-불쾌감, 정신피로를 발생시켜서 재해를 증가시킬 수 있고 작업능률을 저하, 청력장해를 초래할 수 있다. -청력장해는 일시적인 난청인 경우와 영구적으로 오는 난청 2가지의 경우가 있다. 영구적인 난청(직업성난청)은 높은 소음에 장기간 노출될 때 회복되지 않는 내이성 난청의 일종이며, 나중에는 말소리까지도 침범 당하여 잘 듣지 못한다.	-소음발생이 큰 기계, 기구를 교체하거나 격리시킨다. -발생원에 대한 방음흡음(吸音)시설 설치(칸막이 등) 등을 한다. -작업 시에는 귀마개, 귀덮개 등 차음보호구 착용을 생활화 한다.
	진동		-국소진동이 직접 수지부에 가하여져 수지부 혈관 및 관절에 기계적 공진현상을 일으켜 말초장해를 유발하며 증추, 말초, 골관절 장해를 일으킨다. 즉 손가락의 창백현상, 손가락의 감각이상, 투통, 감작 등의 증상을 일으킨다.	-진동흡수 장갑을 착용하고 작업한다. -공구의 보수관리를 철저히 한다. -작업시간을 단축한다.
	자외선		-피부의 홍반현상, 색소침착, 각막의 부종과 괴사, 피부암 등을 일으킬 수 있다. -용접 시에 발생되는 자외선은 각막결막염과 노출된 피부에 장해를 일으키며, 불활성가스 또는 금속 아크용접(arc welding) 등은 강력한 자외선을 발생하며 눈 및 피부에 화상을 입히는 일이 많다.	-유해광선 장해를 예방하는 근본원칙은 방사선 발생원의 격리, 산란선 누선방지 등 방사선의 피폭방지에 있어 필름뱃지(film badge) 또는 포켓선량계로 피폭량을 측정한다. -피부보호의, 보호안경, 보호장갑, 안전모(방열용) 등 개인보호구를 착용한다.
	이상기압		-고압에서는 가스가 혈액 속에 용해되어 있다가 급격한 감압으로, 특히 질소가 혈관과 조직 내에 기포를 형성하고 혈관이 약한 부위에 따라 피부의 가려움 및 근육통, 관절통, 호흡곤란, 시력장해, 반신불수 등을 일으킨다.	-수심에 따른 체재시간의 한도와 적절한 감압법을 엄수하여야 한다. -고기압 환경에 부적절한 고령자, 결핵천식 등의 만성호흡기 질환자, 심맥관계 이상 자. 만성부비강염, 중이염, 골관절 이상 자 등은 그 작업을 하지 않도록 하여야 한다.
4. 야간작업			-야간작업은 뇌심혈관질환의 위험을 증가시키며, 생체리듬의 불균형으로 인해 수면장애가 발생할 수 있고, 소화성궤양과 같은 위장관질환을 유발할 수 있다. 또한 유방암과의 관련으로 인해 국제암연구소(IARC)에서 2A 등급으로 지정되어 있다.	-뇌심혈관질환과 관련된 위험요인을 관리하기 위한 생활습관요법을 실천한다. -교대근무 일정을 바람직한 형태로 설계하며, 필요시 야간작업 중에 수면시간을 제공한다. -심혈관질환, 중추신경장해, 조혈기계질환, 생식기계 기능이상 등이 있는 경우 야간작업 배치 전 업무적합성 평가를 실시한다.