

배치 건강진단개인표 (1차)

주민등록번호	710902-6*****		이름	판운향	나이	54	성별	여	사원번호	
근로자주소	경기도 안산시 단원구 다문화1길19,504호							전화번호	010-8860-8534	
사업체명	현대건설 디에이지 클래스트(신반포)				업종					
현직업무부서	2026-09-10		현직업무내용		알품		관할지청(청)		서울청	
입사년월일			현직전입일		2026-09-10		노출기간		1일 노출시간	
과거 직력	작업공정명	근무년수	기간	문 진	과거병력	특이소견없음		진 찰	신경계 이비인후과 안과, 피부과 진동장애 등	특이소견없음
	알품	4			가족력	특이소견없음				
					업무기인성	특이소견없음				
					흡연,음주	특이소견없음				
취급물질	(배)소음, 알루미눔및그화합물, 진동, 자외선, 광물성분진									
현재증상	특이 증상 없음									
항목	신장 (cm)	체중 (kg)	혈압 (mmHg)		홍부방사선검사 (촬영번호 :) 판독의사면허 (면허번호 : 1051) 이경효					
참고치			최고	최저						
현재결과	156.0	54.0	125	85						
치과소견								치과 의사	(인)	

건강진단항목				
검사항목	검사결과	참고치	()년도	()년도
신장	156.0cm	0-0		
체중	54.0kg	0-0		
허리둘레	75.0	0-89.9		
혈압(최고)	125mmHg	85-139		
혈압(최저)	85mmHg	50-89		
(좌)약력검사	34.1			
(우)약력검사	30.9			
통각	정상	정상		
진동각	정상	정상		
손톱압박검사	정상	정상		
(좌)이경	특이사항무	특이사항무		
(우)이경	특이사항무	특이사항무		
(좌)기도청력 500Hz	12dB	-10-39		
(좌)기도청력 1000Hz	10dB	-10-39		
(좌)기도청력 2000Hz	11dB	-10-29		
(좌)기도청력 3000Hz	10dB	-10-39		
(좌)기도청력 4000Hz	16dB	-10-39		
(좌)기도청력 6000Hz	37dB	-10-39		
(우)기도청력 500Hz	10dB	-10-39		
(우)기도청력 1000Hz	10dB	-10-39		
(우)기도청력 2000Hz	10dB	-10-29		
(우)기도청력 3000Hz	15dB	-10-39		
(우)기도청력 4000Hz	30dB	-10-39		
(우)기도청력 6000Hz	28dB	-10-39		

청진	정상	정상		
FVC	444	0-0		
FVC%	92.6	80-200		
FEV1	348	0-0		
FEV1%	82	80-200		
FEV1/FVC(%)	77.4	70-200		
PEF	744			
폐활량결과	정상	정상		
흉부X선	특이사항없음	특이사항없음 비활동성(C) 비활동성 폐결핵		

판정	검진소견	사후관리조치	업무수행적합여부	유해인자별 건강구분 유해인자	건강구분
A	(배)소음(좌):특이소견 없음	건강양호(필요없음)	가	(배)소음(좌)	A
	(배)소음(우):특이소견 없음	건강양호(필요없음)		(배)소음(우)	A
	알루미늄및그화합물:특이소견 없음	건강양호(필요없음)		알루미늄및그화합물	A
	진동:특이소견 없음	건강양호(필요없음)		진동	A
	자외선:특이소견 없음	건강양호(필요없음)		자외선	A
	광물성분진:특이소견 없음	건강양호(필요없음)		광물성분진	A

건강진단정보			
건강진단일자	2026-09-10	다음검진일	
건강진단기관	한강수병원 		
건강진단의사	박선욱 	근로자	판운항

1. 건강관리구분 · 사후관리내용 및 업무적합성 평가

(뒷쪽)

건 강 관 리 구 분		사 후 관 리 내 용		업무수행적합여부(질병유소건자에 대하여 구분함)	
A	건강한 근로자 또는 경미한 이상소견이 있는 근로자	0	필요없음	가	건강관리상 현재의 조건하에서 작업이 가능한 경우
C ₁	직업성 질병으로 진전될 우려가 있어 추적검사 등 관찰이 필요한 근로자(요관찰자)	1	건강상담	나	일정한 조건(환경개선, 개인보호구 착용, 건강진단의 주기를 앞당기는 경우 등)하에서 현재의 작업이 가능한 경우
C ₂	일반질병으로 진전될 우려가 있어 추적관찰이 필요한 근로자(요관찰자)	2	보호구 착용	다	건강장해가 우려되어 한시적으로 현재의 작업을 할 수 없는 경우 (건강상 또는 근로조건상의 문제를 해결한 후 작업복귀 가능)
C _N	질병으로 진전될 우려가 있어 야간작업시 추적관찰이 필요한 근로자(요관찰자)	3	추적검사		
D ₁	직업성질병의 소견이 있는 근로자(직업병 유소건자)	4	근무중치료		
D ₂	일반질병의 소견이 있는 근로자(일반질병 유소건자)	5	근로시간 단축	라	건강장해의 악화 혹은 영구적인 장해발생으로 현재의 작업을 해서는 안되는 경우
D _N	질병의 소견을 보여 야간작업시 사후관리가 필요한 근로자(유소건자)	6	작업전환		
R	건강진단 1차검사결과 건강수준의 평가가 곤란하거나 질병이 의심되는 근로자(제2차건강진단 대상자)	7	근로금지 및 제한		
		8	직업병확진의뢰안내 (건강진단기관이 안내)		
		9	기타		

* 특수건강진단 과정에서 퇴직 등의 사유로 건강관리구분을 판정할 수 없는 경우에는 “U”로 분류함.

2. 건강관리참고사항

유해요인	인 체 에 미 치 는 영 향	예 방
유 기 화합물	눈, 피부, 호흡기 점막의 자극 증상 농도에 따라 다양한 정도의 마취/거진 증상이 나타난다. 즉, 어지러움, 두통, 도취(흥분), 피로, 졸음, 구역, 자만, 렉 상실, 가슴통증에 이어 흡수농도가 증가 되면 점차적으로 의식을 잃을 수 있다. 만성 피로 사에는 감각 혹은 운동기능 이상, 기억력저하, 피로, 신경질, 불안 등의 신경계통의 장애를 유발하기도 한다.	-유기용제가 들어있는 통은 필요할 때 이외에는 반드시 마개 혹은 뚜껑으로 막아 놓는다. -작업장에서는 흡연이나 음식물의 섭취를 금하고 작업이 끝난 후에는 작업복으로 갈아입고 세면을 한다. -인체에 유기용제 증기가 흡입되지 않도록 유의하며, 유기용제용 방독마스크, 보호장갑 및 작업복 등 개인 보호구를 반드시 착용한다.
수은	-식욕부진, 두통, 전신피로, 경미한 몸 떨림, 불안, 호흡곤란, 화상성 폐렴, 입술부위의 창백, 메스꺼움, 설사, 정신장애 증세를 보이고 피부의 알레르기화, 기억상실, 우울증세를 나타낼 수 있다. 그리고 피부흡수를 통해 전신독성을 나타낼 수 있다.	-용기는 반드시 밀폐해 둔다. -송기(送氣)마스크 또는 방독마스크, 보호의, 불침투성 보호장갑, 보호장화, 보호장화를 착용하고 작업한다.
금	-연이 체내에 흡수되면 초기에는 피로를 느끼고, 장이 잘 안되며 팔 다리의 통 증, 식욕감퇴 등의 증상이 나타날 수 있으며 계속하여 체내에 흡수되는 양이 증가하면 갑자기 배가 아프거나 관절에 통증이 느껴질 수 있으며, 어지럽고 손발이 힘이 약해지는 증상이 올 수 있음. -일일연은 무기연화합물보다 독성이 강하며, 호흡기로 흡수되어 주로 중추신경계통에 작용하고 간과 골수, 신장, 뇌 등에 장애를 준다. -금성중상부기과로는 달리 중추신경계의 증상이 강하게 나타나는데 노출 수 일 후에 불안, 흥분, 근육연축, 망상, 환상이 일어나고 혈압저하, 체질저하, 맥박수가 감소한다.	-음식물을 골고루 섭취하고 흡연, 과음을 삼가며 적당한 운동으로 체력을 유지함. -개인위생식전 세수, 방독마스크 착용, 작업복 세탁 등을 철저히 지키고 근로적으로 납이 체내에 들어 오는 것을 예방하는 것이 바람직함. -화기점근을 금한다. -누설의 유무를 매일 1회이상 점검한다. -작업은 교대로 실시(1일 노출시간을 가급적 단축)한다. -송기(送氣)마스크 또는 유기가스용 방독면, 보호장갑, 보호장화, 보호의 등을 착용하고 작업한다.
카드뮴	-만성적으로 노출되면 신장장애, 만성 폐쇄성 호흡기 질환 및 폐기종을 일으키며 골격계장애와 심혈관계 장애도 일으키는 것으로 알려져 있다. -기침, 가래, 콧물, 후각이상, 식욕부진, 구토, 설사, 체중감소 등이 나타나고 안이나 손가락, 치은부에 연한 황색의 환상 색소침착을 볼 수 있다.	-작업장의 공기중 카드뮴 농도를 낮게 유지하고 작업장을 청결하게 한다. -작업장 내에서 식사나 흡연은 절대 금물이며 작업복은 자주 갈아입는다. -적절한 보호구(방독마스크, 보호장갑 등)를 착용하고 작업한다.
망간	수면장애, 행동이상, 신경증상, 발음부정확 등	-보호구 착용을 철저히 한다.
오산화바나듐	눈물이 나옴, 비염, 인두염, 기관지염, 천식, 흉통, 폐염, 폐부종, 피부습진 등	-환기를 철저히 한다. -작업수칙을 철저히 지킨다. -호흡기 질환, 신경질환, 간염, 신장염이 있는 근로자는 해당 업무에 종사하지 않도록 한다.
니켈	-폐암, 비강암, 눈의 자극증상, 발한, 메스꺼움, 어지러움, 경련, 정신착란 등	-마스크를 착용한다.
산 및 알칼리류	-심한 호흡기 자극으로 일시적으로 숨이 막히고 기침이 난다. -피부를 바늘로 찌르는 듯한 통증이 생긴다. -화상을 입을 수 있다. -장기 노출 사에는 차아부식증 및 기관지 등에 만성적인 염증이 생길 수 있다.	-마스크를 착용한다. -피부수 보호의, 고무장갑, 보호면을 착용하여 피부접촉을 방지한다. -보호용 안경을 착용한다.
가스상 물질류	-대부분 가스상으로 호흡기를 통하여 인체에 들어와 건강장애를 일으키며 이외에도 피부나 경구적으로도 침입될 수 있는 물질이 많고 일반적으로 신경 정맥(마취작용), 피부염 등이 일어날 수 있다. -짧은 기간 동안 많은 양에 노출되면 눈, 코, 목, 피부 및 점막 등을 자극한다.	-화기에 주의한다. -작업환경에서 발생한 가스, 분진 등은 유해가스용 방독마스크, 보호의, 장갑 등을 착용하고 필요 시, 세수, 샤워 등 개인위생을 잘 지킨다. -유해물 등이 저장장소에서 유출되지 않도록 철저히 보관, 관리한다.
영 제 88 조에 의한 허가 대상 물질	-만성장애로서는 식면제 등을 일으킬 수 있고 기침, 답 등 기관지염 증상을 수반하고 호흡곤란, 심계항진 등을 호소하며, 폐암 및 중폐증이 발생할 수 있으므로 발암물질로 규정하고 있다. -기관지염, 폐염, 천식성 피부염, 기침, 호흡곤란, 폐의 육아종 형성 -천식성 피부염, 비강염, 점막의 괴사, 다발성신경염 등	-방진마스크, 보안경을 착용한다. -작업 후 목욕을 실시한다. -작업복은 작업 시에만 착용하고 작업 후에는 반드시 갈아 입는다. -식면취급 근로자는 반드시 금연하여야 한다. -보호구 착용을 철저히 한다. -환기를 철저히 한다. -작업수칙을 철저히 지킨다. -호흡기 질환, 신경질환, 간염, 신장염이 있는 근로자는 해당 업무에 종사하지 않도록 한다.
2 분진	-광물성분진 진폐증의 자·타각증상이나 소견은 호흡기계에서 비롯된 호흡 곤란, 기침, 답액과다, 흉통, 혈담, 피로 등의 증상이 나타난다. -면분진 특이적인 자가중성인 월요증상(Monday disease)은 흉부압박감, 가슴통증, 호흡곤란, 기침 등인데 특히 월요일에 심하며 주말에 이룰수록 점차 경미하여진다(월요일에는 면분진에 노출되지 않는 것을 전제로 한다).	-발전 공정의 습식화 및 분진억제 대책을 수립, 시행한다. -발전진 포위 격리 및 밀폐 등을 실시한다. -방진마스크를 반드시 착용하고 작업한다.
3 소음	-불쾌감, 정신피로를 발생시켜서 재해를 증가시킬 수 있고 작업능률을 저하, 청력장애를 초래할 수 있다. -청력장애는 일시적인 난청인 경우와 영구적으로 오는 난청 2가지의 경우가 있다. 영구적인 난청(직업성난청)은 높은 소음에 장기간 노출될 때 회복되지 않는 내이성 난청의 일종이며, 나중에는 말소까지도 침범 당하여 잘 듣지 못한다.	-소음발생이 큰 기계, 기구를 교체하거나 격리시킨다. -발생원에 대한 방음흡음(吸音)시설 설치(칸막이 등) 등을 한다. -작업 시에는 귀마개, 귀덮개 등 차음보호구 착용을 생활화 한다.
물 진동	-국소진동이 직접 수직부에 가하여져 수직부 혈관 및 관절에 기계적 공진현상을 일으켜 말초장애를 유발하며 증추, 말초, 골관절 장애를 일으킨다. 즉 손가락의 장액혈상, 손가락의 감각이상, 무통, 감각 등의 증상을 일으킨다.	-진동흡수 장갑을 착용하고 작업한다. -공구의 보수관리를 철저히 한다. -작업시간을 단축한다.
적 자외선	-피부의 홍반현상, 색소침착, 각막의 부종과 괴사, 피부암 등을 일으킬 수 있다. -용접 시에 발생하는 자외선은 각막결막염과 노출된 피부에 장애를 일으키며, 불활성가스 또는 금속 이온용접(arc welding) 등은 강력한 자외선을 발생하며 눈 및 피부에 화상을 입히는 일이 많다.	-유해광선 장애를 예방하는 근본원인은 방사선 발생원의 격리, 차단선 누선방지 등 방사선의 피폭방지에 있어 필름백지(film badge) 또는 포켓선량계로 피폭량을 측정한다. -피부보호의, 보안경, 보호장갑, 안전모(방열용) 등 개인보호구를 착용한다.
자 이상 기압	-고압에서는 가스가 혈액 속에 용해되어 있다가 급격한 감압으로, 특히 절소가 혈관과 조직 내에 기포를 형성하고 혈관이 약한 부위에 따라 피부의 가려움 및 근육통, 관절통, 호흡곤란, 시력장애, 반신불수 등을 일으킨다.	-수선에 따른 체제시간의 한도와 적절한 작업법을 엄수하여야 한다. -고압기 환경에 부적절한 고령자, 결핵진성 등의 만성호흡기 질환자, 심맥관계 이상 자, 만성부비강염, 중이염, 골관절 이상 자 등은 그 작업을 하지 않도록 하여야 한다.
4 야간작업	-야간작업은 뇌신경관절의 위생을 증가시키며, 생체리듬의 불균형으로 인해 수면장애가 발생할 수 있고, 소화장애와 같은 위장관질환을 유발할 수 있다. 또한 유방암과의 관련으로 인해 국제암연구소(IARC)에서 2A 등급으로 지정되어 있다.	-뇌신경관절과 관련된 위험요인을 관리하기 위한 생활습관요법을 실천한다. -고대근 무릎을 바람직한 형태로 설계하며, 필요시 야간작업 중에 수면시간을 제공한다. -심혈관질환, 중추신경장애, 조혈기계질환, 생식기계 기능이상 등이 있는 경우 야간작업 배치 전 업무 적합성 평가를 실시한다.