

최근 수정일 : 2025. 6. 5.(목)

■ [공통: 수학 I·수학 II]

01. ② 02. ① 03. ③ 04. ③ 05. ②  
06. ④ 07. ⑤ 08. ⑤ 09. ② 10. ①  
11. ⑤ 12. ② 13. ④ 14. ② 15. ①  
16. 2 17. 6 18. 133 19. 8  
20. 85 21. 42 22. 38

1. 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} 4^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{1}{2}} &= (2^2)^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{1}{2}} \\ &= 2^{2 \times \frac{1}{4}} \times 2^{\frac{1}{2}} \\ &= 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \\ &= 2^1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

정답 ②

2. 출제의도 : 미분계수를 이용하여 극한 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x - 1 \text{ 에서} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= f'(1) \\ &= 2 \times 1 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

정답 ①

3. 출제의도 : 시그마의 정의를 이용하여

합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\sum_{k=1}^7 a_k = 8$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^7 (2a_k + 1) &= 2 \sum_{k=1}^7 a_k + \sum_{k=1}^7 1 \\ &= 2 \times 8 + 1 \times 7 \\ &= 23 \end{aligned}$$

정답 ③

4. 출제의도 : 함수의 연속의 정의를 이용하여 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수  $y = -x^2 + a$ 와 함수  $y = 5x - a$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수  $f(x)$ 가  $x = 3$ 에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3-} (-x^2 + a) \\ &= -9 + a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3+} (5x - a) \\ &= 15 - a \end{aligned}$$

$$f(3) = 15 - a$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = f(3)$$

에서

$$-9 + a = 15 - a$$

따라서

$$a = 12$$

정답 ③

5. 출제의도 : 정적분의 값을 구할 수 있

는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\int_0^2 (6x^2 - 2x + 1)dx &= \left[ 2x^3 - x^2 + x \right]_0^2 \\ &= 14 - 0 \\ &= 14\end{aligned}$$

정답 ②

6. 출제의도 : 삼각함수의 그래프의 최댓값과 주기를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수  $f(x)$ 의 최댓값이 8이고

$a > 0$ 이므로

$a + 1 = 8$ 에서

$a = 7$

함수  $f(x)$ 의 주기가  $\pi$ 이고

$b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = \pi \text{에서}$$

$b = 2$

따라서

$$a + b = 7 + 2 = 9$$

정답 ④

7. 출제의도 : 함수의 곱의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$g(x) = 5x^2 + xf(x)$$

이므로

$$g'(x) = 10x + f(x) + xf'(x)$$

따라서

$$\begin{aligned}g'(3) &= 30 + f(3) + 3 \times f'(3) \\ &= 30 + 2 + 3 \times 1 \\ &= 35\end{aligned}$$

정답 ⑤

8. 출제의도 : 삼각함수의 성질과 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 삼각함수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\sin(\pi - \theta) > 0 \text{에서 } \sin\theta > 0$$

$$2\cos\theta = \sin\theta \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } \sin\theta > 0 \text{이므로 } \cos\theta > 0$$

$\textcircled{7}$ 의 양변을 제곱하면

$$4\cos^2\theta = \sin^2\theta$$

$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ 이므로 이를 위 등식에 대입하면

$$4\cos^2\theta = 1 - \cos^2\theta$$

$$5\cos^2\theta = 1$$

$$\cos^2\theta = \frac{1}{5}$$

따라서  $\cos\theta > 0$ 이므로

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

정답 ⑤

9. 출제의도 : 정적분의 성질을 이용하여 주어진 식을 만족시키는 함수의 미정계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\int_{-3}^3 (x+1)f(x)dx = 36 + \int_{-3}^3 f(x)dx$$

에서

$$\int_{-3}^3 (x+1)f(x)dx$$

$$= \int_{-3}^3 \{xf(x) + f(x)\}dx$$

$$= \int_{-3}^3 xf(x)dx + \int_{-3}^3 f(x)dx$$

이므로

$$\int_{-3}^3 xf(x)dx = 36$$

이때  $f(x) = x^2 + ax$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_{-3}^3 xf(x)dx &= \int_{-3}^3 x(x^2 + ax)dx \\ &= \int_{-3}^3 (x^3 + ax^2)dx \\ &= 2 \int_0^3 ax^2 dx \\ &= 2 \left[ \frac{a}{3} x^3 \right]_0^3 \\ &= 2 \times 9a \\ &= 18a\end{aligned}$$

따라서

$$18a = 36$$

이므로

$$a = 2$$

정답 ②

10. 출제의도 : 로그의 성질과 로그방정식을 이용하여 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

곡선  $y = \log_a(x+3)$ 이

곡선  $y = \log_a(-x+3)$ 과 만나는 점 A의

좌표를 구해 보자

$$\log_a(x+3) = \log_a(-x+3) \text{에서}$$

$$x+3 = -x+3$$

$$x = 0$$

$x = 0$ 일 때,  $y = \log_a 3$ 이므로

점 A의 좌표는  $(0, \log_a 3)$ 이다.

곡선  $y = \log_a(x+3)$ 에서

$y = 0$ 일 때

$$\log_a(x+3) = 0$$

$$x+3 = 1$$

$$x = -2$$

그러므로 점 B의 좌표는  $(-2, 0)$ 이다.

곡선  $y = \log_a(-x+3)$ 에서

$y = 0$ 일 때

$$\log_a(-x+3) = 0 \text{에서}$$

$$-x+3 = 1$$

$$x = 2$$

그러므로 점 C의 좌표는  $(2, 0)$ 이다.

삼각형 ABC가 정삼각형이므로

원점을 O라 하면

$$\tan \frac{\pi}{3} = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} \text{에서}$$

$$\sqrt{3} = \frac{\log_a 3}{2}$$

$$\log_a 3 = 2\sqrt{3}$$

$$a^{2\sqrt{3}} = 3$$

따라서

$$a = 3^{\frac{1}{2\sqrt{3}}} = 3^{\frac{\sqrt{3}}{6}}$$

정답 ①

11. 출제의도 : 위치, 속도, 가속도 사이의 관계 및 미분을 이용하여 가속도를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

ㄱ.  $x = t^3 - t^2 - t + 1$ 에  $t = 1$ 을 대입하면

$$x = 1^3 - 1^2 - 1 + 1 = 0 \text{ (거짓)}$$

ㄴ. 점 P의 시각  $t$ 에서의 속도를  $v$ 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 2t - 1$$

이므로 시각  $t = 1$ 일 때 점 P의 속도는

$$v = 3 \times 1^2 - 2 \times 1 - 1 = 0 \text{ (참)}$$

ㄷ. ㄴ에서 시각  $t=1$ 일 때 점 P의 속도는 0이고 시각  $t=1$ 의 좌우에서 속도  $v$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각은  $t=1$ 이다. 점 P의 시각  $t$ 에서의 가속도를  $a$ 라 하면

$$a = \frac{dv}{dt} = 6t - 2$$

이므로 시각  $t=1$ 일 때 점 P의 가속도는

$$a = 6 \times 1 - 2 = 4 \text{ (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

정답 ⑤

12. 출제의도 : 수열의 귀납적 정의를 이용하여 수열의 특정한 항의 최댓값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (나)에서

$$a_{n+1} = a_n - 3 \text{ 또는 } a_{n+1} = 2a_n$$

조건 (가)에서  $a_3 = a_1$  ..... ㉠

(i)  $a_3 = a_2 - 3$ ,  $a_2 = a_1 - 3$ 인 경우

$$a_3 = a_2 - 3 = (a_1 - 3) - 3$$

$$a_3 = a_1 - 6$$

이 식은 ㉠을 만족시키지 않는다.

(ii)  $a_3 = a_2 - 3$ ,  $a_2 = 2a_1$ 인 경우

$$a_3 = a_2 - 3 = 2a_1 - 3$$

㉠에서

$$a_3 = 2a_3 - 3$$

$$a_3 = 3$$

$$a_4 = a_3 - 3 = 0 \text{ 또는 } a_4 = 2a_3 = 6$$

(iii)  $a_3 = 2a_2$ ,  $a_2 = a_1 - 3$ 인 경우

$$a_3 = 2(a_1 - 3) = 2a_1 - 6$$

㉠에서

$$a_3 = 2a_3 - 6$$

$$a_3 = 6$$

$$a_4 = a_3 - 3 = 3 \text{ 또는 } a_4 = 2a_3 = 12$$

(iv)  $a_3 = 2a_2$ ,  $a_2 = 2a_1$ 인 경우

$$a_3 = 2a_2 = 2(2a_1) = 4a_1$$

㉠에서  $a_3 = 4a_3$

$$a_3 = 0$$

$$a_4 = a_3 - 3 = -3 \text{ 또는 } a_4 = 2a_3 = 0$$

(i) ~ (iv)에서

$$a_4 = -3 \text{ 또는 } a_4 = 0 \text{ 또는 } a_4 = 3 \text{ 또는}$$

$$a_4 = 6 \text{ 또는 } a_4 = 12$$

이므로

$a_4$ 의 최댓값은 12

정답 ②

13. 출제의도 : 정적분과 넓이의 관계를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 상수  $k$ 의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

주어진 조건에서

$$(A \text{의 넓이}) + (C \text{의 넓이}) = (B \text{의 넓이})$$

가 성립해야 하므로

$$\int_0^k \left\{ (3x^2 - 7x + 2) - \left( \frac{1}{3}x - \frac{2}{3} \right) \right\} dx = 0$$

$$\int_0^k \left( 3x^2 - \frac{22}{3}x + \frac{8}{3} \right) dx = 0$$

$$\left[ x^3 - \frac{11}{3}x^2 + \frac{8}{3}x \right]_0^k = 0$$

$$k^3 - \frac{11}{3}k^2 + \frac{8}{3}k = 0$$

$$3k^3 - 11k^2 + 8k = 0$$

$$k(k-1)(3k-8) = 0$$

이때  $k > 2$  이므로  $k = \frac{8}{3}$

정답 ④

14. 출제의도 : 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 삼각형의 외접원의 넓이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

삼각형 APQ에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{PQ}}{\sin(\angle QAP)} = \frac{\overline{AQ}}{\sin(\angle APQ)}$$

조건에서  $\overline{AQ} = 3\sqrt{2}$  이고

$\sin(\angle QAP) : \sin(\angle APQ) = \sqrt{2} : 3$  이므로

$$\overline{PQ} = \frac{\sin(\angle QAP)}{\sin(\angle APQ)} \times \overline{AQ}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3} \times 3\sqrt{2}$$

$$= 2$$

점 P는 선분 BC의 중점이고 점 Q는 선분 BC를 5:1로 내분하는 점이므로

$$\overline{BC} = \overline{BP} + \overline{PQ} + \overline{QC}$$

$$= \frac{1}{2}\overline{BC} + 2 + \frac{1}{6}\overline{BC}$$

$$= \frac{2}{3}\overline{BC} + 2$$

$$\frac{1}{3}\overline{BC} = 2, \overline{BC} = 6$$

한편,  $\overline{BQ} = \frac{5}{6}\overline{BC} = 5$  이고  $\overline{AB} = 2\sqrt{7}$  이므로

삼각형 ABQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos(\angle ABQ) &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BQ}^2 - \overline{AQ}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{BQ}} \\ &= \frac{(2\sqrt{7})^2 + 5^2 - (3\sqrt{2})^2}{2 \times 2\sqrt{7} \times 5} \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{7}}{4}$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2$$

$$= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos(\angle ABC)$$

$$= (2\sqrt{7})^2 + 6^2 - 2 \times 2\sqrt{7} \times 6 \times \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$= 22$$

이므로

$$\overline{AC} = \sqrt{22}$$

이때

$$\sin(\angle ABC) = \sqrt{1 - \cos^2(\angle ABC)}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2}$$

$$= \frac{3}{4}$$

이므로 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(\angle ABC)} = 2R$$

이므로

$$R = \frac{\sqrt{22}}{2 \times \frac{3}{4}} = \frac{2\sqrt{22}}{3}$$

따라서 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는

$$\pi R^2 = \pi \times \left(\frac{2\sqrt{22}}{3}\right)^2 = \frac{88}{9}\pi$$

정답 ②

15. 출제의도 : 미분을 이용하여 상수와 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

삼차함수  $f(x)$  를

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a, b, c, d \text{는 상수})$$

수,  $a \neq 0$ )이라 하자

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f'(0) = c \text{ 이므로}$$

$$c = 6$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + 6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$x \neq -1$ ,  $x \neq 1$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여

함수  $g(x)$ 는 미분가능하고

$$x < -1 \text{ 또는 } x > 1 \text{에서 } g'(x) = f'(x),$$

$$-1 < x < 1 \text{에서}$$

$$g'(x) = -f'(x) \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

이다.

조건 (가)에서 모든 실수  $a$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \text{의 값이 존재하므로}$$

$$a \neq -1, a \neq 1 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \\ &= g'(a) \end{aligned}$$

모든 실수  $a$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

의 값이 0 이하이므로

$\textcircled{8}$ 에서 함수  $f(x)$ 는

$$x < -1 \text{ 또는 } x > 1 \text{에서 } f'(x) \leq 0$$

$$-1 < x < 1 \text{에서 } f'(x) \geq 0$$

을 만족시킨다.

함수  $f(x)$ 는  $x = -1$ 과  $x = 1$ 에서 모두

극값을 가지므로

$$f'(-1) = f'(1) = 0 \text{ 이어야 한다.}$$

$\textcircled{7}$ 에서

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + 6 = 3a(x+1)(x-1)$$

$$3ax^2 + 2bx + 6 = 3ax^2 - 3a$$

양변의 일차항 계수와 상수항을 비교하면

$$2b = 0 \text{에서 } b = 0$$

$$6 = -3a \text{에서 } a = -2$$

$$f(x) = -2x^3 + 6x + d$$

조건 (가)에서

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1}$$

의 값이 존재하고

$x \rightarrow 1+$ 일 때 (분모)  $\rightarrow 0$ 이므로 (분자)  $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = g(1) \quad \dots\dots \textcircled{9}$$


$$\lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x) + k\} = -f(1)$$

$$f(1) + k = -f(1) \text{ 이므로}$$

$$f(1) = -\frac{k}{2} \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

$$\begin{aligned} \text{한편 } \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-} \{-f(x)\} \\ &= -f(1) = g(1) \end{aligned}$$

이고  $\textcircled{9}$ 에서 함수  $g(x)$ 는  $x = 1$ 에서 연속이므로 함수  $y = g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



조건 (나)에서

방정식  $g(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수  $t$ 의 최댓값이 13이므로

$$g(-1) = -f(-1) = 13$$

$$f(-1) = 2 - 6 + d = -13 \text{ 이므로}$$

$$d = -9$$

$$f(x) = -2x^3 + 6x - 9$$

$\textcircled{10}$ 에서

$$f(1) = -2 + 6 - 9 = -\frac{k}{2}$$

$$k = 10$$

따라서

$$k + f\left(\frac{1}{2}\right) = 10 + \left(-\frac{1}{4} + 3 - 9\right) \\ = \frac{15}{4}$$

정답 ①

16. 출제의도 : 로그에 미지수가 포함된 방정식의 해를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\log_5(x+1) + \log_5(x-1) = \log_{25} 9 \dots\dots \textcircled{7}$$

진수 조건에 의해

$$x+1 > 0, x-1 > 0 \text{ 이므로 } x > 1$$

⑦에서

$$\log_5(x+1)(x-1) = \log_{5^2} 3^2$$

$$\log_5(x^2 - 1) = \log_5 3$$

$$\text{즉, } x^2 - 1 = 3 \text{ 에서 } x^2 = 4$$

따라서  $x > 1$  이므로

$$x = 2$$

정답 2

17. 출제의도 : 다항함수의 부정적분을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = 3x^2 + 4x$$

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \int (3x^2 + 4x) dx$$

$$= x^3 + 2x^2 + C \text{ (단, } C \text{ 는 적분상수)}$$

$$f(0) = 3 \text{ 이므로}$$

$$C = 3$$

따라서

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 3$$

이므로

$$f(1) = 1 + 2 + 3 = 6$$

정답 6

18. 출제의도 :  $\sum$ 의 성질을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\sum_{k=1}^6 (k^2 + 2k) = \sum_{k=1}^6 k^2 + 2 \sum_{k=1}^6 k \\ = \frac{6 \times 7 \times 13}{6} + 2 \times \frac{6 \times 7}{2} \\ = 91 + 42 \\ = 133$$

정답 133

19. 출제의도 : 함수의 그래프를 이용하여 극솟값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = 9x^2 - 18x = 9x(x-2)$$

$$f'(x) = 0 \text{ 에서}$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	$\dots$	0	$\dots$	2	$\dots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

함수  $f(x)$ 는  $x=0$ 에서 극대이고 극댓값은  $f(0) = a$ 이므로

$$a = 20$$

함수  $f(x)$ 는  $x=2$ 에서 극소이므로 극솟값은


$$f(2) = 24 - 36 + 20 = 8$$

정답 8

20. 출제의도 : 주기함수를 이해하고 등차수열의 일반항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$0 \leq x < 4$ 일 때  $f(x) = -x^2 + 4x$ 이고 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x+4) = f(x)$ 이므로 함수  $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



방정식  $f(x) = x$ 에서

$$-x^2 + 4x = x$$

$$-x(x-3) = 0$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = 3$$

방정식  $f(x) = x$ 의 모든 실근이 0, 3이므로 방정식  $f(f(x)) = f(x)$ 의 실근을 구하는 것은 방정식  $f(x) \times (f(x) - 3) = 0$ 의 실근을 구하는 것과 같다.

$0 \leq x < 4$ 일 때,

$$f(x) = 0 \text{에서 } x = 0$$

$$f(x) = 3 \text{에서 } -x^2 + 4x = 3$$

$$-(x-1)(x-3) = 0$$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

그러므로  $0 \leq x < 4$ 일 때, 방정식

$$f(x) \times (f(x) - 3) = 0 \text{의 모든 실근은}$$

0,  $\boxed{1}$ , 3이므로

$$a_1 = 0, a_2 = \boxed{1}, a_3 = 3$$

이다. 또한 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x+4) = f(x)$ 이므로 세 수열  $\{a_{3n-2}\}$ ,  $\{a_{3n-1}\}$ ,  $\{a_{3n}\}$ 은 첫째항이 각각 0,  $\boxed{1}$ , 3이고, 공차가 모두  $\boxed{4}$ 인 등차수열이다.

따라서

$$a_{20} = a_{3 \times 7 - 1} = 1 + 6 \times 4 = 25,$$

$$a_{21} = a_{3 \times 7} = 3 + 6 \times 4 = 27,$$

$$a_{22} = a_{3 \times 8 - 2} = 0 + 7 \times 4 = 28$$

이므로

$$a_{20} + a_{21} + a_{22} = 25 + 27 + 28 = \boxed{80} \text{이다.}$$

이때  $p = 1$ ,  $q = 4$ ,  $r = 80$ 이므로

$$p + q + r = 85$$

정답 85

21. 출제의도 : 함수의 극한의 성질을 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 함수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = (x-1)(x-2)$$

(i)  $a < 1$  또는  $a > 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times f(x)}{f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= g(a) \end{aligned}$$

(ii)  $1 < a < 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times (-f(x))}{f(x)} \\ &= -\lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= -g(a) \end{aligned}$$

(iii)  $a = 1$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) \times f(x)}{f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) \\ &= g(1), \end{aligned}$$



$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x) \times (-f(x))}{f(x)}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 1+} g(x)$$

$$= -g(1)$$

$$a=1 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} \text{의 극한}$$

값이 존재해야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

이어야 한다.

즉,  $g(1) = -g(1)$ 이므로

$$g(1) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(iv)  $a=2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) \times (-f(x))}{f(x)}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 2-} g(x)$$

$$= -g(2),$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) \times f(x)}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} g(x)$$

$$= g(2)$$

$$a=2 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} \text{의 극한}$$

값이 존재해야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

이어야 한다.

즉,  $-g(2) = g(2)$ 이므로

$$g(2) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

(i) ~ (iv)에서

모든 실수  $a$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

의 극한값이 존재하려면

$\textcircled{7}$ ,  $\textcircled{8}$ 에서

$$g(1) = g(2) = 0$$

이어야 한다.

이때, 함수  $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로

$$g(x) = f(x)h(x)$$

(단,  $h(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수)로 놓을 수 있다.

한편,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)h(x) - f(x)|}{f(x)h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)| \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

(v)  $a < 1$  또는  $a > 2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때,  $h(a) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(a) \neq 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

$$= \frac{|h(a) - 1|}{h(a)}$$

(vi)  $1 < a < 2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow a} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때,  $h(a) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(a) \neq 0$ 이고

$$- \lim_{x \rightarrow a} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)} = - \frac{|h(a) - 1|}{h(a)}$$

(vii)  $a = 1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때,  $h(1) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(1) \neq 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

$$= \frac{|h(1) - 1|}{h(1)},$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{-f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때,  $h(1) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(1) \neq 0$ 이고

$$- \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

$$= - \frac{|h(1) - 1|}{h(1)}$$

$$a = 1 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

의 극한값이 존재해야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{|h(1) - 1|}{h(1)} = - \frac{|h(1) - 1|}{h(1)} \text{ 이므로}$$

$$|h(1) - 1| = -|h(1) - 1|$$

$$h(1) = 1 \quad \dots\dots \textcircled{E}$$

이다.

(viii)  $a = 2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{-f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때,  $h(2) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(2) \neq 0$ 이고

$$- \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)} = - \frac{|h(2) - 1|}{h(2)},$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때,  $h(2) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(2) \neq 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)} = \frac{|h(2) - 1|}{h(2)}$$

$$a = 2 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

의 극한값이 존재해야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } -\frac{|h(2)-1|}{h(2)} = \frac{|h(2)-1|}{h(2)} \text{ 이므로}$$

$$-|h(2)-1| = |h(2)-1|$$

$$h(2)=1 \quad \dots\dots \textcircled{\text{㉞}}$$

이다.

(v) ~ (viii)에서

모든 실수  $a$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

의 극한값이 존재하려면

㉞, ㉞에서

$$h(1)=h(2)=1$$

이어야 한다.

이때, 함수  $h(x)$ 는 최고차항의 계수가 1

인 이차함수이므로

$$h(x)-1=(x-1)(x-2)$$

$$\text{즉, } h(x)=f(x)+1$$

따라서

$$g(x)=f(x) \times (f(x)+1)$$

이고,

$$f(-1)=(-1-1)(-1-2)=6$$

이므로

$$g(-1)=6 \times (6+1)=42$$

정답 42

[참고]

$$h(x)=f(x)+1$$

$$=(x-1)(x-2)+1$$

$$=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$$

이므로 모든 실수  $a$ 에 대하여

$h(a) \neq 0$ 을 만족시킨다.

22. 출제의도 : 지수함수의 그래프를 이용하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

두 곡선

$$y=2^x+\frac{k}{2}, \quad y=k \times \left(\frac{1}{2}\right)^x+k-2$$

가 만나는 점 A의  $x$ 좌표를  $a$ 라 하면

$$2^a+\frac{k}{2}=k \times \left(\frac{1}{2}\right)^a+k-2$$

$$2^a=t(t>0) \text{라 하면}$$

$$t+\frac{k}{2}=\frac{k}{t}+k-2$$

$$2t^2+(4-k)t-2k=0$$

$$(t+2)(2t-k)=0$$

$t>0$ 이므로

$$t=\frac{k}{2}$$

$$\text{즉, } 2^a=\frac{k}{2} \text{ 이므로}$$

$$a=\log_2 \frac{k}{2}$$

이고,

$$2^{\log_2 \frac{k}{2}}+\frac{k}{2}=\frac{k}{2}+\frac{k}{2}=k$$

이므로 점 A의 좌표는

$$\left(\log_2 \frac{k}{2}, k\right)$$

이다.

$$\text{이때, 실수 } k \text{에 대하여 } 2^{\log_2 \frac{k}{2}}=\frac{k}{2} \text{ 이므}$$

$$\text{로 점 A는 곡선 } 2^x=\frac{y}{2}, \text{ 즉 } y=2^{x+1}$$

위를 움직인다.

한편, 곡선  $y=2^{x-2}-3$ 은 곡선  $y=2^{x+1}$ 을  $x$ 축의 방향으로 3만큼,  $y$ 축의 방향으로  $-3$ 만큼 평행이동한 것이므로 점 A를 지나고 기울기가  $-1$ 인 직선이 곡선

---

$y = 2^{x-2} - 3$ 과 만나는 점 B의 좌표는

$$\left(\log_2 \frac{k}{2} + 3, k - 3\right)$$

이고, 두 점 A, B 사이의 거리는

$$\sqrt{3^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}$$

이다.

이때 원점 O에서 직선 AB까지의 거리를  $h$ 라 하면 삼각형 OAB의 넓이가 16

이므로

$$\frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times h = 16$$

에서

$$h = \frac{16\sqrt{2}}{3}$$

이다.

한편, 직선 AB의 방정식은

$$y - k = -\left(x - \log_2 \frac{k}{2}\right)$$

즉,  $x + y - k - \log_2 \frac{k}{2} = 0$ 이고 원점과 직

선 AB사이의 거리가  $\frac{16\sqrt{2}}{3}$ 이므로

$$\frac{\left| -k - \log_2 \frac{k}{2} \right|}{\sqrt{2}} = \frac{16\sqrt{2}}{3}$$

$$\left| -k - \log_2 k + 1 \right| = \frac{32}{3}$$

$k > 1$ 이므로

$$k + \log_2 k - 1 = \frac{32}{3}$$

$$k + \log_2 k = \frac{35}{3}$$

따라서  $p = 3$ ,  $q = 35$ 이므로

$$p + q = 38$$

정답 38

■ [선택: 기하]

23. ② 24. ④ 25. ② 26. ① 27. ③  
28. ④ 29. 20 30. 36

23. 출제의도 : 성분으로 나타낸 평면벡터의 연산을 할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\vec{a} = (2, 6), \vec{b} = (k, -6) \text{에서}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (2+k, 0)$$

$\vec{a} + \vec{b}$ 의 모든 성분의 합이 4이므로

$$(2+k) + 0 = 4, k = 2$$

정답 ②

24. 출제의도 : 포물선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

포물선  $y^2 = 12x$  위의 점  $(3, 6)$ 에서의 접선의 방정식은

$$6y = 6(x+3), \text{ 즉 } y = x+3$$

위의 직선이 점  $(1, a)$ 를 지나므로

$$a = 1+3 = 4$$

정답 ④

25. 출제의도 : 법선벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 점  $A(4, 0), B(2, -4)$ 에 대하여

$$\vec{AB} = (2, -4) - (4, 0) = (-2, -4)$$

이므로 벡터  $\vec{AB}$ 에 수직이고 점  $A$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$-2(x-4) - 4(y-0) = 0, \text{ 즉 } y = -\frac{1}{2}x + 2$$

따라서 이 직선의  $y$ 절편은 2이다.

정답 ②

26. 출제의도 : 쌍곡선의 점근선의 방정식을 이해하고 쌍곡선의 접선의 방정식을 이용하여 조건을 만족시키는 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :


쌍곡선  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 한 점근선의 방정

식이  $y = \frac{1}{2}x$ 이고,  $a > 0, b > 0$ 이므로

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{2} \text{에서 } a = 2b \quad \dots\dots ⑦$$

그러므로 이 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



이 쌍곡선이 직선  $y=1$ 과 만나는 점 중 제1사분면의 점을  $P$ , 제2사분면의 점을  $Q$ 라 하고, 점  $P$ 의  $x$ 좌표를  $k$  ( $k > 0$ )이라 하면 두 점  $P, Q$ 는  $y$ 축에 대하여 대칭이므로

$$P(k, 1), Q(-k, 1)$$

두 점 P, Q가 쌍곡선  $\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  위의  
점이므로

$$\frac{k^2}{4b^2} - \frac{1}{b^2} = 1 \text{에서 } b^2 = \frac{k^2}{4} - 1 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

쌍곡선  $\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  위의 점 P(k, 1)에  
서의 접선의 방정식은

$$\frac{kx}{4b^2} - \frac{y}{b^2} = 1, \text{ 즉 } y = \frac{k}{4}x - b^2$$

쌍곡선  $\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  위의 두 점 P, Q에  
서의 접선이 y축에 대하여 대칭이고 서  
로 수직이므로 점 P에서의 접선의 기울  
기가 1이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{k}{4} = 1 \text{이므로 } k = 4$$

$$\textcircled{L} \text{에서 } b^2 = 4 - 1 = 3$$

$$\textcircled{O} \text{에서 } a^2 = 4b^2 = 4 \times 3 = 12$$

$$\text{따라서 } a^2 + b^2 = 15$$

정답 ①

27. 출제의도 : 벡터의 내적을 이용하여  
삼각형의 넓이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$|\vec{a} + \vec{b}| = 6$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\begin{aligned} |\vec{a} + \vec{b}|^2 &= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 36 \quad \dots \textcircled{O} \end{aligned}$$

마찬가지로  $|2\vec{a} - \vec{b}| = 9$ 의 양변을 제곱하

여 정리하면  $|2\vec{a} - \vec{b}|^2 = 81$ 에서

$$4|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 81 \quad \dots \textcircled{L}$$

한편,  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ 에서

$$|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0, \text{ 즉 } |\vec{a}| = |\vec{b}| \quad \dots \textcircled{O}$$

$\textcircled{L}$ 을  $\textcircled{O}$ ,  $\textcircled{L}$ 에 각각 대입하여 정리하면

$$|\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 18 \quad \dots \textcircled{O}$$

$$5|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 81 \quad \dots \textcircled{L}$$

$5 \times \textcircled{O} - \textcircled{L}$ 을 하면

$$9\vec{a} \cdot \vec{b} = 9, \vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \quad \dots \textcircled{O}$$

$\textcircled{O}$ 을  $\textcircled{O}$ 에 대입하여 정리하면

$$|\vec{a}|^2 = 17, |\vec{a}| = |\vec{b}| = \sqrt{17}$$

$\textcircled{L}$ 에서

$$|\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\angle AOB) = 1$$

$$\cos(\angle AOB) = \frac{1}{17}$$

$$\sin(\angle AOB) = \sqrt{1 - \cos^2(\angle AOB)}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{17}\right)^2}$$

$$= \frac{12\sqrt{2}}{17}$$

따라서 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times |\vec{a}| \times |\vec{b}| \times \sin(\angle AOB)$$

$$= \frac{1}{2} \times (\sqrt{17})^2 \times \frac{12\sqrt{2}}{17} = 6\sqrt{2}$$

[다른 풀이]

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| = \sqrt{17}$$

이고  $\overline{OA} = \overline{OB} = \sqrt{17}$ 이므로 삼각형 OAB

는 이등변삼각형이다. 선분 AB의 중점을 M

이라 하면  $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ 이고  $|\vec{a} + \vec{b}| = 6$ 에서

$$|\vec{a} + \vec{b}| = |2\overline{OM}| = 2\overline{OM} = 6$$

$$\overline{OM} = 3$$

직각삼각형 OAM에서

$$\overline{AM} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OM}^2}$$

$$= \sqrt{(\sqrt{17})^2 - 3^2}$$

$$= 2\sqrt{2}$$

$$\text{이므로 } \overline{AB} = 2\overline{AM} = 4\sqrt{2}$$

따라서 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{OM} = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 3 = 6\sqrt{2}$$

정답 ③

28. 출제의도 : 타원의 정의와 도형의 성질을 이용하여 타원의 장축의 길이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

타원  $C_1 : \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 의 장축의 길이가


$2a$ 이고,  $\overline{GP} = \overline{PF}$ 이므로

$$\overline{GP} + \overline{PF'} = \overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$$

즉,  $2a = 2\sqrt{2}$ 에서  $a = \sqrt{2}$

이때  $c^2 = a^2 - 1 = 1$ 에서  $c = 1$ 이므로

$F(1, 0)$ ,  $F'(-1, 0)$



$\overline{PF} = k$  ( $k > 0$ )이라 하면  $\overline{GF} = 2k$ 이고,

$$\overline{PF'} = 2\sqrt{2} - \overline{PF} = 2\sqrt{2} - k$$

$\angle PFF' = \theta$ 라 하면 직각삼각형 GOF에서

$$\cos \theta = \frac{\overline{OF}}{\overline{GF}} = \frac{1}{2k} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

삼각형  $PF'F$ 에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\overline{PF}^2 + \overline{F'F}^2 - \overline{PF'}^2}{2 \times \overline{PF} \times \overline{F'F}} \\ &= \frac{k^2 + 4 - (2\sqrt{2} - k)^2}{2 \times 2 \times k} \\ &= \frac{4k\sqrt{2} - 4}{4k} \\ &= \frac{k\sqrt{2} - 1}{k} \quad \dots\dots \textcircled{8} \end{aligned}$$

⑦, ⑧에서

$$\frac{1}{2k} = \frac{k\sqrt{2} - 1}{k}$$

$$2k\sqrt{2} = 3$$

$$k = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

그러므로 직각삼각형 GOF에서

$$\overline{OG}^2 = \overline{GF}^2 - \overline{OF}^2$$

이므로

$$\begin{aligned} d^2 &= 4k^2 - 1 \\ &= 4 \times \frac{9}{8} - 1 = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

타원  $C_2$ 의 꼭짓점 중  $y$ 좌표가 양수인 점의  $y$ 좌표를  $b$ 라 하면

$$b^2 - (\sqrt{2})^2 = \frac{7}{2}$$

이므로

$$b^2 = \frac{11}{2}$$


이때  $b > 0$ 이므로

$$b = \frac{\sqrt{22}}{2}$$

따라서  $\overline{QG} + \overline{QG'}$ 의 값은 타원  $C_2$ 의 장축의 길이이므로







점 Q가 나타내는 원의 중심을 S, 점 S에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 E는 직선 SH 위의 점이다.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} &= \overrightarrow{AE} \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HS} + \overrightarrow{SQ}) \\ &= \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{HS} + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{SQ}\end{aligned}$$

이고,  $0 \leq t \leq 8$ 인 실수  $t$ 에 대하여  $\overrightarrow{HS} = t\overrightarrow{BC}$


이므로  $t=0$ 이고 두 벡터  $\overrightarrow{SQ}$ ,  $\overrightarrow{AE}$ 의 방향이 서로 반대일 때  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 값은

최소이다. 즉,  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 최솟값은  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AH} + 0 + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{SQ}$

$$\begin{aligned}&= |\overrightarrow{AH}|^2 - |\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{SQ}| \\ &= 9^2 - \sqrt{9^2 + 12^2} \times 3 \\ &= 81 - 15 \times 3 \\ &= 36\end{aligned}$$

정답 36

[다른 풀이 1]



점 Q에서 직선 AE에 내린 수선의 발을 I라 하면 점 I는 점 P의 위치에 관계없


이 선분 AE 위에 있고

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} &= |\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{AQ}| \cos(\angle QAE) \\ &= \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AI}\end{aligned}$$

이다. 이때

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE} &= \frac{3}{2} \overrightarrow{AC} = \frac{3}{2} \sqrt{AB^2 + BC^2} \\ &= \frac{3}{2} \times \sqrt{6^2 + 8^2} = \frac{3}{2} \times 10 = 15\end{aligned}$$

이고 선분 AI의 길이는 점 P가 점 B와 일치하고 직선 QI가 점 Q가 나타내는 원에 접할 때 최소이다.



점 Q가 나타내는 원의 중심을 S라 하고 점 S에서 직선 AE에 내린 수선의 발을 J라 하면

$$\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AS} \cos(\angle SAJ) = 9 \times \frac{3}{5} = \frac{27}{5}$$

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{IJ} = \frac{27}{5} - 3 = \frac{12}{5}$$

따라서  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 최솟값은

$$\overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AI} = 15 \times \frac{12}{5} = 36$$

[다른 풀이 2]

네 점 A, B, C, D의 좌표를 각각 (0, 6), (0, 0), (8, 0), (8, 6)

이라 하자.  $2\overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}$ 에서

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BE} &= \frac{3\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}}{2} \\ &= \frac{3(8, 0) - (0, 6)}{2} \\ &= (12, -3)\end{aligned}$$

이다. 점 P가 선분 BC 위를 움직이는  
점이므로  $0 \leq t \leq 8$ 인 실수  $t$ 에 대하여  
점 P의 좌표를  $(t, 0)$ 으로 놓을 수 있다.

점 Q의 좌표를  $(x, y)$ 라 하면


$$\begin{aligned} \overrightarrow{PQ} \cdot (\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{AB}) &= 0 \text{에서} \\ (x-t, y) \cdot ((x-t, y) - (0, -6)) \\ &= (x-t, y) \cdot (x-t, y+6) \\ &= (x-t)^2 + y(y+6) = 0 \end{aligned}$$

$$(x-t)^2 + (y+3)^2 = 9$$


즉, 점 Q는 점  $(t, -3)$ 을 중심으로 하고 반  
지름의 길이가 3인 원 위의 점이다.

이때  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} = k$ 라 하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} &= ((12, -3) - (0, 6)) \cdot ((x, y) - (0, 6)) \\ &= (12, -9) \cdot (x, y-6) \\ &= 12x - 9(y-6) \\ &= 12x - 9y + 54 = k \\ 12x - 9y + 54 - k &= 0 \end{aligned}$$



즉,  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 값은 기울기가  $\frac{4}{3}$ 이고 점  
Q를 지나는 직선의  $y$ 절편이 최대일 때 최소  
이다.



따라서  $t=0$ 일 때, 즉, 원

$$x^2 + (y+3)^2 = 9$$

에 접하고 기울기가  $\frac{4}{3}$ 인 직선의  $y$ 절편이

최대일 때  $k$ 의 값이 최소이므로  $k$ 의 최솟값  
을  $k_0$ 이라 하면

$$\frac{|-9 \times (-3) + 54 - k_0|}{\sqrt{12^2 + (-9)^2}} = 3$$

$$\text{에서 } 81 - k_0 = 45$$

$$k_0 = 81 - 45 = 36$$