

■ [공통: 수학 I·수학 II]

01. ⑤ 02. ③ 03. ② 04. ① 05. ⑤
06. ③ 07. ④ 08. ④ 09. ③ 10. ③
11. ⑤ 12. ① 13. ③ 14. ② 15. ④
16. 6 17. 24 18. 5 19. 4
20. 98 21. 19 22. 10

1. 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 값을 계산할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & 3^{1-\sqrt{5}} \times 3^{1+\sqrt{5}} \\ &= 3^{(1-\sqrt{5})+(1+\sqrt{5})} \\ &= 3^2 \\ &= 9 \end{aligned}$$

정답 ⑤

2. 출제의도 : 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & f(x) = 2x^2 - x \text{에서} \\ & f'(x) = 4x - 1 \\ & \text{이므로} \\ & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1} = f'(1) = 3 \end{aligned}$$

정답 ③

3. 출제의도 : 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 삼각함수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\sqrt{6}}{3} \text{이고 } \frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi \text{이므로} \\ \sin \theta &= -\sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= -\sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2} \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\ &= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{3}}{\frac{\sqrt{6}}{3}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

정답 ②

4. 출제의도 : 그래프를 보고 함수의 좌극한과 우극한을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & \text{함수 } y = f(x) \text{의 그래프에서} \\ & \lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = -2, \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0 \end{aligned}$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -2 + 0 = -2$$

정답 ①

5. 출제의도 : 주어진 조건을 만족시키는 등비수열의 항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이므로 $a > 0, r > 0$ 이다.

$$\frac{a_3 a_8}{a_6} = 12 \text{ 에서 } \frac{ar^2 \times ar^7}{ar^5} = 12, ar^4 = 12$$

$$\text{즉, } a_5 = 12$$

$$a_5 + a_7 = 36 \text{ 에서 } a_7 = 24 \text{ 이므로}$$

$$r^2 = \frac{a_7}{a_5} = \frac{24}{12} = 2$$

$$\frac{a_{11}}{a_7} = r^4 = (r^2)^2 = 2^2 = 4 \text{ 이므로}$$

$$a_{11} = a_7 \times 4 = 24 \times 4 = 96$$

정답 ⑤

6. 출제의도 : 다항함수의 극댓값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1 \text{ 에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

이고, 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극대, $x = 3$ 에서 극소이므로

$$\begin{aligned} 3x^2 + 2ax + b &= 3(x+1)(x-3) \\ &= 3x^2 - 6x - 9 \end{aligned}$$

따라서 $a = -3, b = -9$ 이고

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$$

이므로 함수 $f(x)$ 의 극댓값은

$$f(-1) = -1 - 3 + 9 + 1 = 6$$

정답 ③

7. 출제의도 : 로그의 성질을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$3a + 2b = \log_3 32, ab = \log_9 2 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{3a} + \frac{1}{2b} &= \frac{3a + 2b}{6ab} \\ &= \frac{\log_3 32}{6 \times \log_9 2} \\ &= \frac{\log_3 2^5}{6 \times \log_3 2} \\ &= \frac{5 \log_3 2}{3 \log_3 2} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

정답 ④

8. 출제의도 : 부정적분을 이용하여 조건을 만족시키는 함수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = 6x^2 - 2f(1)x \text{ 에서}$$

$$f(x) = 2x^3 - f(1)x^2 + C \text{ (} C \text{ 는 적분상수)}$$

라 하면 $f(0) = 4$ 이므로

$$C = 4$$

$$\text{즉, } f(x) = 2x^3 - f(1)x^2 + 4$$

이 식에 $x = 1$ 을 대입하면

$$f(1) = 2 - f(1) + 4$$

$$f(1) = 3$$

따라서

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4$$

이므로


$$f(2) = 2 \times 2^3 - 3 \times 2^2 + 4 = 8$$

정답 ④

9. 출제의도 : 삼각함수가 포함된 부등식의 해를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\sin \frac{\pi}{7} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7} \right) = \cos \frac{5}{14} \pi$$



그림과 같이 곡선 $y = \cos x (0 \leq x \leq 2\pi)$

와 직선 $y = \cos \frac{5}{14} \pi$ 가 만나는 두 점의 x 좌표를 각각 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 라 하면

$$x_1 = \frac{5}{14} \pi \text{이고 } \frac{x_1 + x_2}{2} = \pi \text{이므로}$$

$$x_2 = 2\pi - x_1 = \frac{23}{14} \pi$$

따라서 $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 부등식

$\cos x \leq \sin \frac{\pi}{7}$ 을 만족시키는 모든 x 의

값의 범위는 $\frac{5}{14} \pi \leq x \leq \frac{23}{14} \pi$ 이므로

$$\beta - \alpha = \frac{23}{14} \pi - \frac{5}{14} \pi = \frac{9}{7} \pi$$

정답 ③

10. 출제의도 : 삼차함수 그래프의 접선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의

접선이 점 $(1, 3)$ 을 지나므로

$$f(x) - 3 = (x - a)(x - 2)^2$$

$$f(x) = (x - a)(x - 2)^2 + 3 \text{ (단, } a \text{는 상수)}$$

이때

$$f'(x) = (x - 2)^2 + 2(x - a)(x - 2)$$

이므로 곡선 $y = f(x)$ 위의 점

$(-2, f(-2))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - f(-2) = f'(-2)(x + 2)$$

이 접선이 점 $(1, 3)$ 을 지나므로

$$3 - f(-2) = f'(-2)(1 + 2)$$

$$3 - f(-2) = 3f'(-2)$$

$$3 - \{16(-2 - a) + 3\} = 3\{16 - 8(-2 - a)\}$$

$$3 - (-29 - 16a) = 3(32 + 8a)$$

$$32 + 16a = 96 + 24a, \quad 8a = -64$$

즉, $a = -8$ 이므로

$$f(x) = (x + 8)(x - 2)^2 + 3$$

따라서

$$f(0) = 8(-2)^2 + 3 = 35$$

정답 ③

11. 출제의도 : 적분을 이용하여 수직선 위를 움직이는 점이 움직인 거리를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

점 P가 점 A(1)에서 출발하고 속도가

$$v_1(t) = 3t^2 + 4t - 7 \text{이므로}$$

시각 t 에서의 위치를 $s_1(t)$ 라 하면

$$s_1(t) = 1 + \int_0^t (3t^2 + 4t - 7) dt$$

$$= t^3 + 2t^2 - 7t + 1 \text{ -----㉠}$$

또, 점 Q가 점 B(8)에서 출발하고 속도가

$$v_2(t) = 2t + 4 \text{이므로}$$

시각 t 에서의 위치를 $s_2(t)$ 라 하면

$$s_2(t) = 8 + \int_0^t (2t + 4) dt$$

$$= t^2 + 4t + 8 \text{ -----㉡}$$

이때, 두 점 P, Q사이의 거리가 4가 되는

시각은

$$|s_1(t) - s_2(t)| = 4$$

㉠, ㉡에서

$$|(t^3 + 2t^2 - 7t + 1) - (t^2 + 4t + 8)| = 4$$

$$|t^3 + t^2 - 11t - 7| = 4$$

그러므로

$$t^3 + t^2 - 11t - 7 = 4 \text{ 또는}$$

$$t^3 + t^2 - 11t - 7 = -4$$

즉,

$$t^3 + t^2 - 11t - 11 = 0 \text{ 또는}$$

$$t^3 + t^2 - 11t - 3 = 0$$

(i) $t^3 + t^2 - 11t - 11 = 0$ 일 때,

$$t^2(t+1) - 11(t+1) = 0$$

$$(t+1)(t^2 - 11) = 0$$

$t > 0$ 이므로

$$t = \sqrt{11}$$

(ii) $t^3 + t^2 - 11t - 3 = 0$ 일 때,

좌변을 인수분해하면

$$(t-3)(t^2 + 4t + 1) = 0$$

$t > 0$ 이므로

$$t = 3$$

(i), (ii)에 의하여 두 점 P, Q의 사이의 거리가 처음으로 4가 되는 시각은

$$t = 3$$

한편,

$$v_1(t) = 3t^2 + 4t - 7$$

$$= (3t+7)(t-1)$$

이므로

$$0 \leq t < 1 \text{ 일 때, } v_1(t) < 0$$

$$t \geq 1 \text{ 일 때, } v_1(t) \geq 0$$

따라서 점 P가 시각 $t=0$ 에서 시각 $t=3$ 까지 움직인 거리는

$$\int_0^3 |v_1(t)| dt$$

$$= - \int_0^1 v_1(t) dt + \int_1^3 v_1(t) dt$$

$$= - \int_0^1 (3t^2 + 4t - 7) dt + \int_1^3 (3t^2 + 4t - 7) dt$$

$$= - [t^3 + 2t^2 - 7t]_0^1 + [t^3 + 2t^2 - 7t]_1^3$$

$$= -(-4) + 28$$

$$= 32$$

정답 ⑤

12. 출제의도 : 귀납적으로 정의된 수열의 항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

자연수 k 에 대하여

(i) $a_1 = 4k$ 일 때,

a_1 은 짝수이므로

$$a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{4k}{2} = 2k$$

a_2 도 짝수이므로

$$a_3 = \frac{a_2}{2} = \frac{2k}{2} = k$$

㉠ k 가 홀수인 경우

$$a_4 = a_3 + 1 = k + 1$$

이때

$$a_2 + a_4 = 2k + (k + 1) = 3k + 1$$

이므로

$$3k + 1 = 40$$

에서 $k = 13$ 이고,

$$a_1 = 4k = 4 \times 13 = 52$$

㉡ k 가 짝수인 경우

$$a_4 = \frac{a_3}{2} = \frac{k}{2}$$

이때

$$a_2 + a_4 = 2k + \frac{k}{2} = \frac{5}{2}k$$

이므로

$$\frac{5}{2}k = 40$$

에서 $k = 16$ 이고,

$$a_1 = 4k = 4 \times 16 = 64$$

(ii) $a_1 = 4k - 1$ 일 때,

a_1 은 홀수이므로

$$a_2 = a_1 + 1 = 4k$$

a_2 는 짝수이므로

$$a_3 = \frac{a_2}{2} = \frac{4k}{2} = 2k$$

a_3 도 짝수이므로

$$a_4 = \frac{a_3}{2} = \frac{2k}{2} = k$$

이때

$$a_2 + a_4 = 4k + k = 5k$$

이므로

$$5k = 40$$

에서 $k = 8$ 이고,

$$a_1 = 4k - 1 = 4 \times 8 - 1 = 31$$

(iii) $a_1 = 4k - 2$ 일 때,

a_1 은 짝수이므로

$$a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{4k - 2}{2} = 2k - 1$$

a_2 는 홀수이므로

$$a_3 = a_2 + 1 = (2k - 1) + 1 = 2k$$

a_3 은 짝수이므로

$$a_4 = \frac{a_3}{2} = \frac{2k}{2} = k$$

이때

$$a_2 + a_4 = (2k - 1) + k = 3k - 1$$

이므로

$$3k - 1 = 40$$

에서 $k = \frac{41}{3}$ 이고, 이것은 조건을 만족시키지 않는다.

(iv) $a_1 = 4k - 3$ 일 때,

a_1 은 홀수이므로

$$a_2 = a_1 + 1 = (4k - 3) + 1 = 4k - 2$$

a_2 는 짝수이므로

$$a_3 = \frac{a_2}{2} = \frac{4k - 2}{2} = 2k - 1$$

a_3 은 홀수이므로

$$a_4 = a_3 + 1 = (2k - 1) + 1 = 2k$$

이때

$$a_2 + a_4 = (4k - 2) + 2k = 6k - 2$$

이므로

$$6k - 2 = 40$$

에서 $k = 7$ 이고,

$$a_1 = 4k - 3 = 4 \times 7 - 3 = 25$$

(i)~(iv)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 a_1 의 값의 합은

$$52 + 64 + 31 + 25 = 172$$

정답 ①

13. 출제의도 : 도함수를 활용하여 함수가 주어진 증가, 감소에 대한 조건을 만족시키도록 하는 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 - ax^2 - bx & (x < 0) \\ \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - bx & (x \geq 0) \end{cases}$$

에서

$$f'(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - b & (x < 0) \\ x^2 + 2ax - b & (x > 0) \end{cases}$$

이다.

함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 의 좌우에서 감소하다가 증가하고, 함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 미분가능하므로

$$f'(-1) = 0$$

$$-1 + 2a - b = 0, \quad b = 2a - 1$$

$x < 0$ 일 때

$$f'(x) = -x^2 - 2ax - 2a + 1$$

$$= -(x+1)(x+2a-1)$$

$f'(x)=0$ 인 x 의 값은 $x=-1$ 또는 $x=-2a+1$ 이다. 이때 함수 $f(x)$ 가 구간 $(-\infty, -1]$ 에서 감소하고, 구간 $[-1, 0]$ 에서 증가하므로 $(-\infty, -1)$ 에서 $f'(x) \leq 0$, $(-1, 0)$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

즉, $f'(-2a+1)=0$ 에서 $-2a+1 \geq 0$ 이어야 한다.

$$\text{그러므로 } a \leq \frac{1}{2} \quad \text{..... ㉞}$$

한편, $x > 0$ 일 때

$$\begin{aligned} f'(x) &= x^2 + 2ax - b \\ &= x^2 + 2ax - 2a + 1 \\ &= (x+a)^2 - a^2 - 2a + 1 \end{aligned}$$

이고 함수 $f(x)$ 가 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가하므로 $(0, \infty)$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

(i) $-a < 0$, 즉 $a > 0$ 인 경우
 $(0, \infty)$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이려면
 $f'(0) = -2a + 1 \geq 0$ 이면 된다.

$$\text{그러므로 } 0 < a \leq \frac{1}{2}$$

(ii) $-a \geq 0$, 즉 $a \leq 0$ 인 경우
 $(0, \infty)$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이려면
 $f'(-a) = -a^2 - 2a + 1 \geq 0$ 이면 된다.
 $a^2 + 2a - 1 \leq 0$,

$$-1 - \sqrt{2} \leq a \leq -1 + \sqrt{2}$$

$$\text{그러므로 } -1 - \sqrt{2} \leq a \leq 0$$

(i), (ii)에서

$$-1 - \sqrt{2} \leq a \leq \frac{1}{2} \quad \text{..... ㉟}$$

즉, ㉞, ㉟에서 구하는 a 의 값의 범위는 $-1 - \sqrt{2} \leq a \leq \frac{1}{2}$ 이므로 $a+b=3a-1$ 의

값의 최댓값은 $a = \frac{1}{2}$ 일 때 $\frac{1}{2}$, 최솟값

은 $a = -1 - \sqrt{2}$ 일 때 $-4 - 3\sqrt{2}$ 이다.

따라서



$$M-m = \frac{1}{2} - (-4 - 3\sqrt{2}) = \frac{9}{2} + 3\sqrt{2}$$

정답 ③

14. 출제의도 : 지수함수의 그래프를 이해하고 조건을 만족시키는 지수함수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$x \leq -8$ 과 $x > -8$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 각각 그림과 같다.



또한 주어진 조건에서 $3 \leq k < 4$ 이므로 $x > -8$ 인 경우에 정수 $f(x)$ 는

$$f(x) = 6 \text{ 또는 } f(x) = 7$$

이다.

따라서 주어진 조건을 만족시키기 위해서는 $x \leq -8$ 인 경우에 정수 $f(x)$ 는 6뿐이어야 한다.

즉 $b=5$ 이고 $6 \leq f(-8) < 7$ 이어야 하
므로

$$6 \leq 2^{-8+a} + 5 < 7$$

$$1 \leq 2^{-8+a} < 2$$

$$0 \leq -8+a < 1, \quad 8 \leq a < 9$$

이때 a 는 자연수이므로 $a=8$

$$\text{따라서 } a+b=8+5=13$$

정답 ②

15. 출제의도 : 함수의 극한과 연속을
이해하고 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3) - 1 \quad \text{----} \ominus$$

이므로 $x=3$ 일 때, $f(3)$ 의 값에 따라 다
음 각 경우로 나눌 수 있다.

(i) $f(3) \neq 0$ 일 때,

$x=3$ 에 가까운 x 의 값에 대하여
 $f(x) \neq 0$ 이므로

$$g(x) = \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)}$$

이때 함수 $f(x)$ 는 다항함수이므로 $f(x)$,
 $f(x+3)$, $f(x)+1$ 은 연속이다.

그러므로 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이
다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3)$$

이 식을 \ominus 에 대입하면 만족하지 않는
다.

(ii) $f(3)=0$ 일 때,

함수 $f(x)$ 가 삼차함수이므로 방정식
 $f(x)=0$ 은 많아야 서로 다른 세 실근을
갖는다.

그러므로 $x=3$ 에 가까우며 $x \neq 3$ 인 x 의
값에 대하여

$$f(x) \neq 0$$

이때,

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} \quad \text{----} \ominus$$

위에서 $x \rightarrow 3$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이므로
(분자) $\rightarrow 0$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x+3)\{f(x)+1\} = 0$$

$$f(6)\{f(3)+1\} = 0$$

$$f(6) = 0$$

그러므로

$$f(x) = (x-3)(x-6)(x-k)$$

(k 는 상수)

이 식을 \ominus 에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x-3)(x+3-k)\{(x-3)(x-6)(x-k)+1\}}{(x-3)(x-6)(x-k)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x+3-k)\{(x-3)(x-6)(x-k)+1\}}{(x-6)(x-k)}$$

$$= \frac{3(6-k)}{-3(3-k)}$$

$$= \frac{6-k}{k-3}$$

이 값을 \ominus 에 대입하면 $g(3)=3$ 이므로

$$\frac{6-k}{k-3} = 3 - 1$$

$$6-k = 2k-6$$

$$3k = 12$$

$$k = 4$$

따라서,

$$f(x) = (x-3)(x-4)(x-6)$$

이고 $f(5) \neq 0$ 이므로

$$g(5) = \frac{f(8)\{f(5)+1\}}{f(5)}$$

$$= \frac{5 \times 4 \times 2 \times \{2 \times 1 \times (-1) + 1\}}{2 \times 1 \times (-1)}$$

$$= 20$$

16. 출제의도 : 로그방정식을 풀 수 있는가?

정답풀이 :

로그의 진수 조건에 의하여

$$x-1 > 0 \text{에서 } x > 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$13+2x > 0 \text{에서 } x > -\frac{13}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에서 $x > 1$

$$\log_2(x-1) = \log_4(13+2x)$$

에서

$$\log_2(x-1) = \frac{1}{2}\log_2(13+2x)$$

$$2\log_2(x-1) = \log_2(13+2x)$$

$$\log_2(x-1)^2 = \log_2(13+2x)$$

$$(x-1)^2 = 13+2x$$

$$x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$(x+2)(x-6) = 0$$

$$x > 1 \text{이므로 } x = 6$$

정답 6

17. 출제의도 : 합의 기호 \sum 의 성질을 이해하여 주어진 수열의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (a_k - b_k) &= \sum_{k=1}^{10} \{(2a_k - b_k) - a_k\} \\ &= \sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k) - \sum_{k=1}^{10} a_k \\ &= 34 - 10 \\ &= 24 \end{aligned}$$

18. 출제의도 : 곱의 미분법을 이용하여 다항함수의 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = (x^2+1)(x^2+ax+3) \text{에서}$$

$$f'(x) = 2x(x^2+ax+3) + (x^2+1)(2x+a)$$

이므로

$$f'(1) = 2(a+4) + 2(a+2)$$

$$= 4a + 12 = 32$$

$$\text{따라서 } a = 5$$

정답 5

19. 출제의도 : 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 정적분을 이용하여 구할 수 있는가?

정답풀이 :


두 곡선 $y = 3x^3 - 7x^2$, $y = -x^2$ 이 만나는 점의 x 좌표는

$$3x^3 - 7x^2 = -x^2$$

$$3x^2(x-2) = 0$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

이때, 두 함수 $y = 3x^3 - 7x^2$, $y = -x^2$ 의 그래프는 다음과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_0^2 \{(-x^2) - (3x^3 - 7x^2)\} dx \\ &= \int_0^2 (-3x^3 + 6x^2) dx \\ &= \left[-\frac{3}{4}x^4 + 2x^3 \right]_0^2 \\ &= (-12 + 16) - 0 \\ &= 4 \end{aligned}$$

정답 4

20. 출제의도 : 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

삼각형 BCD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BD}}{\sin \frac{3}{4}\pi} = 2R_1, \quad \frac{\overline{BD}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2R_1$$

$$R_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \overline{BD}$$

이고, 삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BD}}{\sin \frac{2}{3}\pi} = 2R_2, \quad \frac{\overline{BD}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2R_2$$

$$R_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \overline{BD}$$

이다. 삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 2^2 + 1^2 - 2 \times 2 \times 1 \times \cos \frac{2}{3}\pi \\ &= 2^2 + 1 - \boxed{(-2)} \\ &= 7 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} R_1 \times R_2 &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \times \overline{BD} \right) \times \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \times \overline{BD} \right) \\ &= \frac{\sqrt{6}}{6} \times \overline{BD}^2 \\ &= \boxed{\frac{7\sqrt{6}}{6}} \end{aligned}$$

이다.

따라서 $p = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $q = -2$, $r = \frac{7\sqrt{6}}{6}$ 이므로

로

$$\begin{aligned} 9 \times (p \times q \times r)^2 &= 9 \times \left\{ \frac{\sqrt{3}}{3} \times (-2) \times \frac{7\sqrt{6}}{6} \right\}^2 \\ &= 9 \times \frac{98}{9} \\ &= 98 \end{aligned}$$

정답 98

21. 출제의도 : 등차수열의 일반항과 합을 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 수열의 항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하자. 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 자연수이므로 a 는 자연수이고 d 는 0 이상의 정수이다.

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2} = \frac{d}{2}n^2 + \left(a - \frac{d}{2}\right)n$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^7 S_k &= \sum_{k=1}^7 \left\{ \frac{d}{2}k^2 + \left(a - \frac{d}{2}\right)k \right\} \\ &= \frac{d}{2} \times \sum_{k=1}^7 k^2 + \left(a - \frac{d}{2}\right) \times \sum_{k=1}^7 k \\ &= \frac{d}{2} \times \frac{7 \times 8 \times 15}{6} + \left(a - \frac{d}{2}\right) \times \frac{7 \times 8}{2} \\ &= 70d + 28\left(a - \frac{d}{2}\right) \\ &= 28a + 56d \end{aligned}$$

$$28a + 56d = 644 \text{ 에서}$$

$$a + 2d = 23 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

a_7 이 13의 배수이므로 자연수 m 에 대하여

$$a + 6d = 13m \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} - \textcircled{B} \text{에서 } 4d = 13m - 23$$

$$4d + 23 + 13 = 13m + 13$$

$$4(d+9) = 13(m+1)$$

$$d+9 = \frac{13(m+1)}{4}$$

이 값이 자연수가 되어야 하므로 $m+1$ 의 값은 4의 배수이어야 한다. 즉, m 이 될 수 있는 값은

$$3, 7, 11, 15, \dots$$

$$\text{한편, } d = \frac{13m-23}{4} \text{ 이므로 } \textcircled{A} \text{에서}$$

$$a = 13m - 6d$$

$$= 13m - 6 \times \left(\frac{13m-23}{4} \right)$$

$$= 13m - \frac{39}{2}m + \frac{69}{2}$$

$$= -\frac{13}{2}m + \frac{69}{2}$$

이고 이 값이 양수이어야 하므로

$$-\frac{13}{2}m + \frac{69}{2} > 0, \quad m < \frac{69}{13}$$

따라서 $m=3$ 이고 이때 $d=4$ 이므로

$$a = 23 - 2d = 15$$

이고

$$a_2 = a + d = 15 + 4 = 19$$

정답 19

22. 출제의도 : 곱의 미분법과 부정적분을 이용하여 조건을 만족시키는 함수를 구하고, 그 정적분을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = f(1) - 3$$

이므로

$$f(1) = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

조건 (가)의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 4x$$

이고, $f(x)$ 는 다항함수이므로

$$f'(x) = 4$$

즉,

$$f(x) = 4x + C_1 \quad (C_1 \text{은 적분상수})$$

로 놓을 수 있다. 이때 \textcircled{A} 에서

$$f(1) = 3$$

이므로

$$f(1) = 4 + C_1 = 3$$

$$C_1 = -1$$

즉, $f(x) = 4x - 1$ 이므로

$$F(x) = 2x^2 - x + C_2 \quad (C_2 \text{는 적분상수})$$

한편, 조건 (나)에서

$$f(x)G(x) + F(x)g(x) = \{F(x)G(x)\}'$$

이므로 양변을 x 에 대하여 적분하면

$$F(x)G(x) = 2x^4 + x^3 + x + C_3 \quad (C_3 \text{은 적분 상수})$$

로 놓을 수 있다.

이때 $F(x) = 2x^2 - x + C_2$ 이고 $G(x)$ 도 다항함수이므로 $G(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이다.

$$G(x) = x^2 + ax + b \quad (\text{단, } a, b \text{는 상수})$$

로 놓으면

$$\begin{aligned} (2x^2 - x + C_2)(x^2 + ax + b) \\ = 2x^4 + x^3 + x + C_3 \end{aligned}$$

양변의 x^3 의 계수를 비교하면

$$2a - 1 = 1$$

즉, $a = 1$ 이므로

$$G(x) = x^2 + x + b$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_1^3 g(x)dx &= \left[G(x) \right]_1^3 \\ &= G(3) - G(1) \\ &= (3^2 + 3 + b) - (1^2 + 1 + b) \\ &= 10 \end{aligned}$$

정답 10

■ [선택: 확률과 통계]

23. ① 24. ③ 25. ③ 26. ② 27. ④
28. ⑤ 29. 62 30. 336

23. 출제의도 : 이항분포의 평균을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

이항분포 $B\left(30, \frac{1}{5}\right)$ 을 따르는 확률변수 X 의 평균은

$$E(X) = 30 \times \frac{1}{5} = 6$$

정답 ①

24. 출제의도 : 같은 것이 있는 순열을 이용하여 도로망에서 최단 거리로 가는 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

A지점에서 P지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는

$$\frac{4!}{3! \times 1!} = 4$$

P지점에서 B지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는

$$\frac{2!}{1! \times 1!} = 2$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$4 \times 2 = 8$$

정답 ③

25. 출제의도 : 두 사건의 관계를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 사건 A, B^C 이 서로 배반사건이므로 $A \subset B$

$$P(A \cap B) = P(A) = \frac{1}{5}$$

$$P(B) = \frac{7}{10} - P(A)$$

$$= \frac{7}{10} - \frac{1}{5}$$

$$= \frac{1}{2}$$

따라서 $A \subset B$ 이므로

$$P(A^C \cap B) = P(B) - P(A)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{5}$$

$$= \frac{3}{10}$$

정답 ③

26. 출제의도 : 표준정규분포표를 이용하여 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

시험 점수를 확률변수 X 라 하면

X 는 정규분포 $N(68, 10^2)$ 을 따르고

$$Z = \frac{X - 68}{10} \text{으로 놓으면 확률변수 } Z \text{는}$$

표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$P(55 \leq X \leq 78)$$

$$= P\left(\frac{55 - 68}{10} \leq Z \leq \frac{78 - 68}{10}\right)$$

$$= P(-1.3 \leq Z \leq 1)$$

$$= P(-1.3 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 1.3) + P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$= 0.4032 + 0.3413$$

$$= 0.7445$$

정답 ②

27. 출제의도 : 확률의 덧셈정리를 이용하여 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

X 에서 Y 로의 일대일함수 f 의 개수는

$${}_7P_4 = 7 \times 6 \times 5 \times 4$$

(i) 함수 f 의 치역에 4가 포함되고 6이 포함되지 않는 경우

함숫값이 4인 정의역의 원소를 정하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

함숫값이 2, 4가 아닌 경우, 함숫값이 홀수이어야 하므로

나머지 두 함숫값을 정하는 경우의 수는

$${}_4P_2 = 4 \times 3 = 12$$

즉, 이 경우의 확률은

$$\frac{3 \times 12}{7 \times 6 \times 5 \times 4} = \frac{3}{70}$$

(ii) 함수 f 의 치역에 6이 포함되고 4가 포함되지 않는 경우

(i)과 같은 방법으로 이 경우의 확률은

$$\frac{3 \times 12}{7 \times 6 \times 5 \times 4} = \frac{3}{70}$$

(iii) 함수 f 의 치역에 4와 6이 모두 포함되는 경우

함숫값이 4, 6인 정의역의 원소와 함숫값을 정하는 경우의 수는

$${}_3P_2 = 3 \times 2 = 6$$

함숫값이 2, 4, 6이 아닌 경우, 함숫값이 홀수이어야 하므로

나머지 함숫값을 정하는 경우의 수는 4

즉, 이 경우의 확률은

$$\frac{6 \times 4}{7 \times 6 \times 5 \times 4} = \frac{1}{35}$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은

$$\frac{3}{70} + \frac{3}{70} + \frac{1}{35} = \frac{4}{35}$$

정답 ④

28. 출제의도 : 주어진 시행과 표본평균의 의미를 이해하고 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

주머니 A에서 꺼낸 2개의 공에 적혀 있

는 두 수의 차가 1일 확률은 $\frac{2}{3}$

주머니 A에서 꺼낸 2개의 공에 적혀 있

는 두 수의 차가 2일 확률은 $\frac{1}{3}$

주머니 B에서 꺼낸 2개의 공에 적혀 있

는 두 수의 차가 1일 확률은 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

주머니 B에서 꺼낸 2개의 공에 적혀 있

는 두 수의 차가 2일 확률은 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

주머니 B에서 꺼낸 2개의 공에 적혀 있

는 두 수의 차가 3일 확률은 $\frac{1}{6}$

첫 번째 시행에서 기록한 수를 X_1 , 두

번째 시행에서 기록한 수를 X_2 라 하면

구하는 확률은 $X_1 + X_2 = 4$ 일 확률이다.

(i) $(X_1, X_2) = (1, 3)$ 인 경우

첫 번째 시행에서 3의 배수의 눈이 나온 경우의 확률은

$$\left(\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{6}\right) = \frac{2}{81}$$

첫 번째 시행에서 3의 배수가 아닌 눈이 나온 경우의 확률은

$$\left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{27}$$

이 경우의 확률은

$$\frac{2}{81} + \frac{1}{27} = \frac{5}{81}$$

(ii) $(X_1, X_2) = (3, 1)$ 인 경우

(i)과 같은 방법으로 이 경우의 확률은

$$\frac{2}{81} + \frac{1}{27} = \frac{5}{81}$$

(iii) $(X_1, X_2) = (2, 2)$ 인 경우

① 주머니 A에서만 공을 꺼내는 경우
이 경우의 확률은

$$\left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{81}$$

② 주머니 B에서만 공을 꺼내는 경우
이 경우의 확률은

$$\left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{81}$$

③ 주머니 A와 주머니 B에서 한 번
씩 공을 꺼내는 경우

이 경우의 확률은

$$2 \times \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{81}$$

이 경우의 확률은

$$\frac{1}{81} + \frac{4}{81} + \frac{4}{81} = \frac{1}{9}$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은

$$\frac{5}{81} + \frac{5}{81} + \frac{1}{9} = \frac{19}{81}$$

정답 ⑤

29. 출제의도 : 독립시행의 확률을 이용하여 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

동전을 두 번 던져 앞면이 나온 횟수가

2일 확률은 $\frac{1}{4}$

앞면이 나온 횟수가 0 또는 1일 확률은

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

문자 B가 보이도록 카드가 놓이려면

뒤집는 횟수가 홀수이어야 한다.

따라서

구하는 확률은 5번의 시행 중 앞면이 나온 횟수가 2인 횟수가 1 또는 3 또는 5인 확률이므로

$$\begin{aligned} p &= {}_5C_1 \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^4 + {}_5C_3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2 + {}_5C_5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^0 \\ &= \frac{405 + 90 + 1}{4^5} \\ &= \frac{31}{64} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{즉, } 128 \times p &= 128 \times \frac{31}{64} \\ &= 62 \end{aligned}$$

정답 62

30. 출제의도 : 중복조합의 수를 이용하여 조건을 만족시키는 순서쌍의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (나)에서

$a \times d$ 가 홀수이므로 a 와 d 는 모두 홀수이고, $b+c$ 가 짝수이므로 b 와 c 가 모두 홀수이거나 b 와 c 가 모두 짝수이다.

(i) b 와 c 가 모두 홀수인 경우

a, b, c, d 가 모두 13 이하의 홀수이다. 13 이하의 홀수의 개수는 7이고, 조건 (가)에서 $a \leq b \leq c \leq d$ 이므로 조건을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 서로 다른 7개

에서 중복을 허락하여 4개를 택하는
중복조합의 수 ${}_7H_4$ 와 같다.

$${}_7H_4 = {}_{10}C_4 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210$$

(ii) b 와 c 가 모두 짝수인 경우

a 와 d 가 모두 홀수, b 와 c 가 모두
짝수, $a \leq b \leq c \leq d$ 이므로 $d-a$ 의
값은 12 이하의 자연수이다.

① $d-a=12$ 인 경우 순서쌍 (a, d) 의
개수는 1, 순서쌍 (b, c) 의 개수는
서로 다른 짝수 6개에서 중복을 허
락하여 2개를 택하는 중복조합의
수 ${}_6H_2$ 이므로 구하는 순서쌍의 개
수는

$$1 \times {}_6H_2 = 1 \times {}_7C_2 = 1 \times \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$$

② $d-a=10$ 인 경우 순서쌍 (a, d) 의
개수는 2이고, 순서쌍 (b, c) 의 개
수는 서로 다른 짝수 5개에서 중복
을 허락하여 2개를 택하는 중복조
합의 수 ${}_5H_2$ 이므로 구하는 순서쌍
의 개수는

$$2 \times {}_5H_2 = 2 \times {}_6C_2 = 2 \times \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 30$$

③ $d-a=8$ 인 경우 순서쌍 (a, d) 의
개수는 3이고, 순서쌍 (b, c) 의 개
수는 서로 다른 짝수 4개에서 중복
을 허락하여 2개를 택하는 중복조
합의 수 ${}_4H_2$ 이므로 구하는 순서쌍
의 개수는

$$3 \times {}_4H_2 = 3 \times {}_5C_2 = 3 \times \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 30$$

④ $d-a=6$ 인 경우 순서쌍 (a, d) 의
개수는 4이고, 순서쌍 (b, c) 의 개
수는 서로 다른 짝수 3개에서 중복
을 허락하여 2개를 택하는 중복조
합의 수 ${}_3H_2$ 이므로 구하는 순서쌍

의 개수는

$$4 \times {}_3H_2 = 4 \times {}_4C_2 = 4 \times \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 24$$

⑤ $d-a=4$ 인 경우 순서쌍 (a, d) 의
개수는 5이고, 순서쌍 (b, c) 의 개
수는 서로 다른 짝수 2개에서 중복
을 허락하여 2개를 택하는 중복조
합의 수 ${}_2H_2$ 이므로 구하는 순서쌍
의 개수는

$$5 \times {}_2H_2 = 5 \times {}_3C_2 = 5 \times \frac{3 \times 2}{2 \times 1} = 15$$

⑥ $d-a=2$ 인 경우 순서쌍 (a, d) 의
개수는 6이고, 순서쌍 (b, c) 의 개
수는 $a+1=b=c$ 에서 1이므로 구
하는 순서쌍의 개수는

$$6 \times 1 = 6$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 순서쌍의 개
수는

$$210 + 21 + 30 + 30 + 24 + 15 + 6 = 336$$

정답 336

[다른 풀이]

(ii) b 와 c 가 모두 짝수인 경우

홀수 a, d 와 짝수 b, c 에 대하여

$$1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 13$$

이므로

$$a = a', \quad b - a = b', \quad c - b = c', \quad d - c = d', \\ 14 - d = e'$$

이라 하면

a', b', d', e' 은 홀수이고, c' 은 0 또는
짝수이다.

$$a' + b' + c' + d' + e' = 14$$

음이 아닌 정수 a'', b'', c'', d'', e'' 에 대
하여

$$a' = 2a'' + 1, \quad b' = 2b'' + 1, \quad c' = 2c'', \\ d' = 2d'' + 1, \quad e' = 2e'' + 1$$

이라 하면

$$a'' + b'' + c'' + d'' + e'' = 5$$

그러므로 구하는 순서쌍의 개수는

$${}_5H_5 = {}_9C_5 = {}_9C_4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$