

10 кл

Іраціональні рівняння

9

Іраціональні рівняння

Область визначення іраціональних рівнянь

Рівняння, в якому є невідоме під знаком кореня або невідоме має в степені дріб, називається іраціональним. При розв'язуванні таких рівнянь треба пам'ятати, що:

- у рівнянні корені парного степеня є арифметичними, це означає, що значення кореня невід'ємне, крім цього, підкореневий вираз додатний;
- усі корені непарного степеня визначені для будь-якого підкореного виразу, причому значення кореня має той самий знак, що й підкореневий вираз.

Отже, розв'язання іраціональних рівнянь треба починати з знаходження області визначення рівняння, якщо з нього виходять корені парного степеня.

Область визначення іраціонального рівняння — це множина всіх дійсних значень x , при яких виходять мають зміст вирази, що входять до рівняння. Корені рівняння, які не задовольняють вихідне рівняння, називають сторонніми. Для того, щоб виключити отримані в результаті нерівностей перетворень сторонні корені, треба робити перевірку розв'язків.

До появи сторонніх коренів можуть призвести, але не обов'язково, такі перетворення, як піднесення обох частин рівняння, які рівні за абсолютним значенням, але можуть відрізнятися знаком, до квадрата або до іншого парного степеня. Звернути увагу, що формальне виношення властивостей кореня

$\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$ або $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ може призвести до звуження області визначення рівняння в цілому, що не допустимо.

10 Основні методи розв'язування іраціональних рівнянь

1. Піднесення обох частин рівняння до степеня та позбавлення від радикалів.

Розв'язати рівняння $\sqrt{9-x} = x+3$.

Розв'язання.

Оскільки в рівнянні зліва корінь парного степеня, то $9-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 9$. Крім того, права частина рівняння повинна бути додатною, оскільки зліва маємо арифметичний корінь. Отже, $x+3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$. Тоді область значень змінної така: $x \in [-3; 9]$. Піднесемо до квадрата обидві частини рівняння:

$$9-x = (x+3)^2 \Rightarrow x^2 + 6x + 9 - x = 0 \Rightarrow x^2 + 5x + 9 = 0 \Rightarrow x_1 = -7, x_2 = -9$$

але $x_1 = -7 \notin [-3; 9]$. Отже, рівняння має тільки один корінь $x = 0$.

2. Відокремлення квадратного кореня використовується у тих випадках, коли це спрощує розв'язання рівняння.

Розв'язати рівняння $\sqrt{x+2} + \sqrt{3-x} = 3$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння $\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ 3-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [-2; 3]$.

Відокремимо один квадратний корінь: $\sqrt{x+2} = 3 - \sqrt{3-x}$. Піднесемо обидві частини рівняння до квадрата:

$$x+2 = 9 - 6\sqrt{3-x} + 3-x \Rightarrow 2x-7 = -6\sqrt{3-x} \Rightarrow 2x-7 \leq 0 \Rightarrow x \leq 3.5$$

Оскільки $x \in [-2; 3]$, то $2x-7 \leq 0$ виконується завжди. Піднесемо до квадрата обидві частини рівняння:

$$(2x-7)^2 = 36(3-x) \Rightarrow 4x^2 - 28x + 49 = 108 - 36x \Rightarrow 4x^2 + 8x - 59 = 0$$

Розв'язавши це квадратне рівняння, отримаємо корені $x_1 = -5.5$, $x_2 = 2.5$. Перевіримо: $x_1 = -5.5 \notin [-2; 3]$, $x_2 = 2.5 \in [-2; 3]$. Тоді розв'язок рівняння $x = 2.5$.

3. Відокремлення кубічного кореня.

Розв'язати рівняння $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x-2} = 3$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння є всі дійсні числа. Відокремимо один з коренів і піднесемо обидві частини рівняння до куба:

$$x-1 + 3\sqrt[3]{(x-1)(x-2)} + 3\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2} + x-2 = 27 \Rightarrow 2x-3 + 3\sqrt[3]{(x-1)(x-2)} + 3\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2} = 24$$

$$\Rightarrow 3\sqrt[3]{(x-1)(x-2)} + 3\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2} = 21 \Rightarrow \sqrt[3]{(x-1)(x-2)} + \sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2} = 7$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = 0 \\ x-2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

Тоді $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x-2} = 3$ виконується тільки для $x = 1$ і $x = 2$. Тоді розв'язок рівняння $x = 1$ і $x = 2$.

4. Введення нової змінної.

Один із поширених способів, який застосовують для розв'язування іраціональних рівнянь, — введення нової змінної. За цим способом певний вираз, який входить у рівняння і містить невідоме, замінюють новою змінною. Наприклад, розв'язування рівняння $\sqrt{x^2-6x+9} + \sqrt{x^2-6x+18} = 9$ значно спрощується, якщо x^2-6x+9 позначити, наприклад, через y : $x^2-6x+9 = y \geq 0$. Тоді $x^2-6x+18 = y+9$. І дане рівняння набуде вигляду $\sqrt{y} + \sqrt{y+9} = 9$. Розв'язавши його відомим способом, одержимо $y = 16$. Повернемося тепер до вихідного підстахови. Маємо: $x^2-6x+9 = 16$, $x^2-6x-7 = 0$, $x_1 = -1$, $x_2 = 7$. Обидва корені задовольняють початкове рівняння.

11

Іраціональні нерівності

Іраціональними називають нерівності, в яких змінна стоїть під знаком радикала, причому розглядатися лише арифметичні корені, якщо корені парного степеня.

Основним методом розв'язування іраціональних нерівностей є метод введення вихідної нерівності до рівносильної системи раціональних нерівностей або сукупності таких систем.

Проте треба пам'ятати:

- Піднесення обох частин нерівності до непарного степеня із збереженням знака нерівності завжди є рівносильним перетворенням.
- Якщо обидві частини нерівності на деякій множині X визначені та набувають тільки додатних значень, то можна піднести обидві частини нерівності до квадрата або іншого парного степеня із збереженням знака вихідної нерівності, оскільки отримаємо нерівність, рівносильну вихідній на множині X .
- Для іраціональних нерівностей виду $\sqrt[n]{f(x)} < g(x)$ та $\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$, піднесення до парного степеня обох частин нерівності не можна. Треба враховувати додаткові умови.

Наведемо методи розв'язання найпростіших іраціональних нерівностей:

1) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$; 2) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$; 3) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$; 4) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$.

Примітка. Щоб уникнути помилок при розв'язуванні нерівностей загального виду, треба насамперед знайти область визначення вихідної нерівності, а потім здійснювати рівносильний перехід на область визначення або на її частини.

12

УЧІБНИЦЬКА СТОРІНКА

1. Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

Знайдемо область визначення рівняння: для цього припустимо, що всі підкореневі вирази більше або дорівнюють нулю:

$$\begin{cases} 11x+3 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ 9x-7 \geq 0 \\ x-2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{3}{11} \\ x \leq 2 \\ x \geq \frac{7}{9} \\ x \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 2$$

Отже, область визначення складається тільки з однієї точки $x = 2$. Перевіримо, чи буде це значення розв'язком вихідного рівняння:

$$\sqrt{11 \cdot 2 + 3} - \sqrt{2 - 2} + \sqrt{9 \cdot 2 - 7} + \sqrt{2 - 2} = 0$$

Як бачимо, $x = 2$ — розв'язок вихідного рівняння.

Відповідь: 2.

2. Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

Знайдемо область визначення рівняння:

$$\begin{cases} x-8 \geq 0 \\ 5-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 8 \\ x \leq 5 \end{cases}$$

Отже, спільних точок немає і вихідне рівняння не має розв'язку.

Відповідь: $\emptyset$.

3. Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

Область визначення рівняння $\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x-5 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq 5 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [5; \infty)$.

Якщо проаналізувати рівняння, то два додатні вирази в сумі не можуть дорівнювати нулю, отже, розв'язок $x \in \emptyset$.

Відповідь: $\emptyset$.

4. Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

Область визначення рівняння $1 + 5x \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{1}{5} \Rightarrow x \in [-\frac{1}{5}; \infty)$.

Відокремимо квадратний корінь: $\sqrt{1+5x} = 1-x$.

Припустимо, що $1-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 1$; тоді область визначення така: $x \in [-\frac{1}{5}; 1]$.

Піднесемо до квадрата обидві частини рівняння:

$$1+5x = 1-2x+x^2 \Rightarrow x^2-7x = 0 \Rightarrow x_1 = 0; x_2 = 7$$

Оскільки підносили до квадрата, то можуть з'явитися сторонні корені, і тому треба зробити перевірку або вибрати розв'язки, які належать області визначення.

Перевіримо: 1) $x = 0$, $1 - \sqrt{1} = 0 \Rightarrow x = 0$ — корінь; 2) $x = 7$, $1 - \sqrt{1+35} \neq 0 \Rightarrow x = 7$ — не є коренем рівняння.

Відповідь: 0.

5. Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

Залишимо рівняння у вигляді $\sqrt{x^2-3x+2} = -(x-2)^2$.

Зліва $\sqrt{x^2-3x+2} \geq 0$, справа $-(x-2)^2 \leq 0$. Очевидно, розв'язання можливе лише при $x = 2$. Значення $x = 2$ є перетворенням на тотожність.

Відповідь: 2.

6. Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

Для розв'язування іраціональних рівнянь можна користуватися методом міркувань у загальному вигляді. Наприклад: $\sqrt[2n]{f(x)} = \sqrt[2n]{g(x)}$ Замінімо рівняння рівносильною йому системою:

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^{2n}(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -2 \\ x^2-5x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -2 \\ x = 0 \text{ або } x = 5 \end{cases}$$

2) Розв'язати систему (1);

Відповідь: 0.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$. Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-3x-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \text{ або } x \geq 3 \\ x \leq -1 \text{ або } x \geq 4 \\ x = 2 \text{ або } x = 6 \end{cases}$$

Відповідь: 2.

15

Розв'язування іраціональних нерівностей виду $\sqrt[n]{f(x)} \geq g(x)$

Розв'язати нерівність.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дану нерівність у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} \geq g(x)$.

2) Розглянемо випадок, коли вираз, що стоїть під знаком модуля, невід'ємний: $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 3$.

3) Розв'язуємо систему (1):

Розв'язання.

4) Розглянемо випадок, коли вираз, який стоїть під знаком модуля, від'ємний: $\begin{cases} f(x) < 0 \\ -f(x) \geq g(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 2 \\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x < 2$.

5) Розв'язуємо систему (2):

Розв'язання.

6) Запишемо відповідь, об'єднавши результати, отримані в п.3 та п.5): $x < 2$ або $x \geq 3$.

Відповідь: $(-\infty; 2) \cup [3; \infty)$.

Розв'язати нерівність.

Розв'язання.

1. а) Якщо $n = 2k-1$, то дану нерівність (1) запишемо у вигляді $\sqrt[n]{f(x)} \geq g(x)$.

б) якщо $n = 2k$, то дану нерівність замінимо рівносильною їй системою: $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g^{2k}(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 3$.

2) Розв'язуємо нерівність (1) або (2).

Розв'язання.

3. Запишемо відповідь: $x < 2$ або $x \geq 3$.

Відповідь: $(-\infty; 2) \cup [3; \infty)$.

Розв'язати нерівність.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дану нерівність у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} \geq g(x)$.

2) Розглянемо випадок, коли вираз, що стоїть під знаком модуля, невід'ємний: $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 3$.

3) Розв'язуємо систему (1):

Розв'язання.

4) Розглянемо випадок, коли вираз, який стоїть під знаком модуля, від'ємний: $\begin{cases} f(x) < 0 \\ -f(x) \geq g(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 2 \\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x < 2$.

5) Розв'язуємо систему (2):

Розв'язання.

6) Запишемо відповідь, об'єднавши результати, отримані в п.3 та п.5): $x < 2$ або $x \geq 3$.

Відповідь: $(-\infty; 2) \cup [3; \infty)$.

Розв'язати нерівність.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дану нерівність у вигляді: $\sqrt[n]{f(x)} \geq g(x)$.

2) Розглянемо випадок, коли вираз, що стоїть під знаком модуля, невід'ємний: $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 3$.

3) Розв'язуємо систему (1):

Розв'язання.

4) Розглянемо випадок, коли вираз, який стоїть під знаком модуля, від'ємний: $\begin{cases} f(x) < 0 \\ -f(x) \geq g(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 2 \\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x < 2$.

5) Розв'язуємо систему (2):

Розв'язання.

6) Запишемо відповідь, об'єднавши результати, отримані в п.3 та п.5): $x < 2$ або $x \geq 3$.

Відповідь: $(-\infty; 2) \cup [3; \infty)$.

1) Просте рівняння з коренем $\sqrt{(2x+5)} = 3$

Область визначення $2x+5 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2,5$

Піднесемо обидві частини до квадрата: $2x+5=9$
 $2x=4$
 $x=2$

Перевірка: $\sqrt{(2 \cdot 2 + 5)} = \sqrt{9} = 3$; Відповідь: $x=2$

2) Рівняння з двома коренями $\sqrt{(x+1)} + \sqrt{(2x-3)} = 4$