



§3. Многокутники

Ламана

Ламаною $A_1, A_2, \dots, A_n$ називається фігура, яка складається з точок $A_1, A_2, \dots, A_n$ та з'єднуючих їх відрізків $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n$. Точки $A_1, A_2, \dots, A_n$ називаються **вершинами ламаної**, а відрізки $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n$ – **ланками ламаної**. Ламана називається **простою**, якщо вона не має самоперетинів.



Проста ламана




Ламана з самоперетинами

Ламана називається **замкнутою**, якщо у неї кінці співпадають. Довжиною ламаної називається сума довжин її ланок.

Властивість довжини ламаної

Довжина ламаної не менше довжини відрізка, з'єднуючого її кінці.



$$A_1A_2 + A_2A_3 + \dots + A_{n-1}A_n \geq A_1A_n$$

Опуклі многокутники


Проста замкнута ламана називається **многокутником**, якщо її сусідні ланки не лежать на одній прямій. Вершини ламаної називаються **вершинами многокутника**, а ланки ламаної – **сторонами многокутника**. Відрізки, які з'єднують несусідні вершини многокутника, називаються **діагоналями**. Многокутник з n -вершинами, тобто з n -сторонами, називається **n -кутником**.

Плоским многокутником, або **многокутним областю**, називається скінченна частина площини, обмежена многокутником.


Многокутник називається **опуклим**, якщо він лежить в одній півплощині відносно будь-якої прямої, що містить його сторону. При цьому сама пряма вважається належною півплощині.

Кутом опуклого многокутника при даній вершині називається кут, утворений його сторонами, що сходяться в цій вершині.


Зовнішнім кутом опуклого многокутника при даній вершині називається кут, суміжний внутрішньому куту многокутника, при цій вершині.



Неопуклий многокутник




$\angle ABC$ – кут опуклого многокутника;
 $\angle BCDE$ – опуклий многокутник.



$\angle BDM$ – зовнішній кут


Сума кутів опуклого n -кутника

Сума кутів опуклого n -кутника дорівнює $180^\circ(n-2)$.




$$\angle A_1 + \angle A_2 + \angle A_3 + \dots + \angle A_n = 180^\circ(n-2)$$

Сума зовнішніх кутів опуклого n -кутника, узятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360° .




$$\angle 1 + \angle 2 + \dots + \angle n = 360^\circ$$


Многокутник називається **вписаним у коло**, якщо всі його вершини лежать на деякому колі, яке, в свою чергу, називається **описаним навколо многокутника**.




Многокутник називається **описаним навколо кола**, якщо всі його сторони дотикаються до деякого кола, яке, в свою чергу, називається **вписаним у многокутник**.




Опуклий многокутник називається **правильним**, якщо в нього всі сторони і всі кути рівні.




Правильний опуклий многокутник є вписаним у коло і описаним навколо кола. Ці кола мають один і той самий центр, який називається **центром многокутника**.



Вершини правильного $2n$ -кутника, якщо їх брати через одну, є вершинами правильного n -кутника.




У чотирикутника, описаного навколо кола, суми довжин протилежних сторін рівні.




$$AB + DC = AD + BC$$

Якщо в опуклому чотирикутнику суми довжин протилежних сторін рівні між собою, то в нього можна вписати коло.



Якщо трапеція або ромб описані навколо кола, то їх висоти дорівнюють діаметру кола.




$$MN = h$$

Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників			
Кількість (n)	n = 3	n = 4	n = 6
Радіус	$R = \frac{a_n}{2 \sin(180^\circ/n)}$	$R = \frac{a_4 \sqrt{3}}{3}$	$R = \frac{a_6 \sqrt{2}}{2}$
	$r = \frac{a_n}{2 \tan(180^\circ/n)}$	$r = \frac{a_4 \sqrt{3}}{6}$	$r = \frac{a_6 \sqrt{3}}{2}$

Залежність сторони a_n правильного n -кутника від радіуса R описаного навколо нього кола і радіуса r вписаного в нього кола


Кількість сторін	Залежність	
	a_n від R і n	a_n від r і n
n	$a_n = 2R \sin(180^\circ/n)$	$a_n = 2r \tan(180^\circ/n)$
3	$a_3 = R\sqrt{3}$	$a_3 = 2r\sqrt{3}$
6	$a_6 = R\sqrt{2}$	$a_6 = 2r$
4	$a_4 = R$	$a_4 = \frac{2}{3}r\sqrt{3}$

Хорда, що перпендикулярна радіусу і проходить через його середину, дорівнює стороні правильного вписаного в коло трикутника.




AB – сторона правильного трикутника, вписаного в коло.

Правильні опуклі n -кутники подібні. Зокрема, якщо в них сторони однакові, то вони рівні.




У правильних n -кутників відношення периметрів, радіусів вписаних і радіусів описаних кіл рівні.




Довжина кола

Відношення довжини кола до його діаметра не залежить від кола, тобто є сталою величиною, яка позначається π ($\pi \approx 3,14$).



Довжина кола дорівнює: $l = 2\pi R$ або $l = \pi D$, $D = 2R$

Довжина дуги кола обчислюється за формулою: $l = \frac{R}{180^\circ} \cdot n$, де n – градусна міра кута, або $l = \alpha R$, де α – радіанна міра кута.



Радіанна міра кута

Радіанна міра кута отримується з градусної множенням на $\frac{\pi}{180^\circ}$, тобто

$$\alpha = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot n, \text{ де } \alpha \text{ – радіанна міра кута, а } n \text{ – градусна міра кута.}$$


Одиницею радіанної міри кутів є радіан. Кут в один радіан – це центральний кут, у якого довжина дуги дорівнює радіусу. Градусна міра кута в один радіан дорівнює: $\frac{180^\circ}{\pi} \approx 57^\circ$.

Радіанна міра деяких кутів

0°	30°	45°	60°	90°	180°
0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π


Хорди і дуги кіл

Якщо градусні міри двох дуг одного кола рівні, то дуги теж рівні. І навпаки: якщо дуги рівні, то і градусні міри їх рівні.



$$\cup AB = \cup CD$$


Рівні дуги стягуються рівними хордами, і навпаки: рівні хорди стягують рівні дуги.



$$AB = CD$$

$$\cup AB = \cup CD$$

Більша дуга, яка не перевищує 180° , стягується більшою хордою, і навпаки: більша хорда стягує більшу дугу.



$$CD > AB$$

$$\cup CD > \cup AB$$


Дуги, розташовані між паралельними хордами, рівні між собою.



$$AB \parallel CD$$

$$\cup AC = \cup BD$$


Якщо хорди, що не перетинаються, з'єднують кінці рівних дуг одного кола, то ці хорди паралельні.



$$AB \parallel CD$$

$$\cup AC = \cup BD$$

Якщо трапеція вписана в коло, то вона рівнобічна.



$$AB = CD$$

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

1. Ланки ламаної $EFMO$ такі: $EF=1\text{ см}$; $FM=4\text{ см}$; $MO=2\text{ см}$. Чи може відрізок EO дорівнювати: а) $0,5\text{ см}$; б) 8 см ?

Розв'язання.

Використаємо теорему, виходячи з якої довжина ламаної $EFMO$ повинна бути не менше довжини відрізка EO , що з'єднує її кінці. Довжина ламаної $EFMO$ дорівнює 7 см , тобто, відрізок EO повинен бути не більше 7 см .

Відповідь: відрізок EO може дорівнювати $0,5\text{ см}$ і не може дорівнювати 8 см .

2. Знайти кути опуклого п'ятикутника, якщо вони пропорційні числам $1, 3, 5, 7, 11$.

Розв'язання.

Сума кутів опуклого п'ятикутника дорівнює $180^\circ \cdot (5-2) = 180^\circ \cdot 3 = 540^\circ$.

Прийнявши за x менший з кутів, складемо рівняння: $x + 3x + 5x + 7x + 11x = 540$, $27x = 540$; $x = 20^\circ$

Відповідь: кути п'ятикутника дорівнюють 20° ; 60° ; 100° ; 140° ; 220° .

3. Скільки сторін має опуклий n -кутник, якщо сума його внутрішніх кутів дорівнює 1260° ?

Розв'язання.

$180^\circ(n-2) = 1260^\circ$, $180n - 360 = 1260^\circ$, $180n = 1260 + 360$, $180^\circ n = 1620$, $n = 1620^\circ : 180^\circ$, $n = 9$.

Відповідь: 9 сторін.

4. Визначити суму внутрішніх кутів опуклого n -кутника, якщо $n = 7$.

Розв'язання.

$180^\circ(7-2) = 180^\circ \cdot 5 = 900^\circ$.

Відповідь: 900° .

5. Сторона правильного вписаного в коло трикутника дорівнює a . Знайти сторону квадрата, вписаного в коло.

Розв'язання.

Зв'язок між сторонами правильного трикутника і правильного чотирикутника виражається формулами: $a_3 = R\sqrt{3}$, звідки $R = \frac{a_3}{\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$; $a_4 = R\sqrt{2}$. Підставивши

значення R , отримаємо: $a_4 = \frac{a}{\sqrt{3}}\sqrt{2} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = a\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Відповідь: $a_4 = a\sqrt{\frac{2}{3}}$.

6. Довести, що сторона правильного 8-кутника обчислюється за формулою: $a_8 = R\sqrt{2-\sqrt{2}}$, де R – радіус описаного кола.

Доведення.

Нехай AB – сторона правильного 8-кутника, $AO = BO = CO = R$ – описаного кола, тоді $AC = \sqrt{R^2 + R^2} = R\sqrt{2}$ (із $\triangle AOC$). $\triangle AOD$ – прямокутний, $BO \perp AC$ і $\angle DOA = \angle OAD = 45^\circ$, отже, і $DO = AD$, $AD = \frac{R\sqrt{2}}{2}$ і $DO = \frac{R\sqrt{2}}{2}$. Знайдемо BD . $BD = R - DO$;

$$BD = R - \frac{R\sqrt{2}}{2} = \frac{2R - R\sqrt{2}}{2} = \frac{R(2-\sqrt{2})}{2}$$

$\triangle ABD$ – прямокутний за теоремою Піфагора: $AB^2 = BD^2 + AD^2$, отримаємо:


$$AB = \sqrt{\left(\frac{R\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{R(2-\sqrt{2})}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{R^2}{4} \cdot (2 + 4 - 4\sqrt{2} + 2)} = \sqrt{\frac{R^2 \cdot 4(2-\sqrt{2})}{4}} = R\sqrt{2-\sqrt{2}}.$$

Відповідь $a_8 = R\sqrt{2-\sqrt{2}}$.

43

7. Радіус кола, вписаного в правильний шестикутник, дорівнює 3 см . Знайти радіус кола, описаного навколо цього шестикутника.

Розв'язання.



1-й спосіб. Нехай AB – сторона правильного шестикутника, описаного навколо кола радіуса R , тобто $BO = R$, A_1B_1 – сторона правильного вписаного у коло шестикутника і $CO = r = 3\text{ см}$, тоді $A_1B_1 = 3\text{ см}$, $C_1B_1 = 1,5\text{ см}$. Знайдемо C_1O з прямокутного трикутника C_1OB_1 за теоремою Піфагора: $B_1O^2 = C_1B_1^2 + C_1O^2$;

$$\text{звідки } C_1O = \sqrt{B_1O^2 - C_1B_1^2} = \sqrt{9 - \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{36-9}{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} (\text{см});$$

$\triangle OBC \sim \triangle OB_1C_1$ (за гострим кутом BOC), тоді $\frac{BO}{B_1O} = \frac{CO}{C_1O}$;

$$BO = \frac{B_1O \cdot CO}{C_1O} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot \sqrt{3}} = \frac{3 \cdot 2 \cdot \sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} (\text{см}).$$

2-й спосіб. Використовуючи зв'язок між стороною правильного шестикутника і радіусами описаного і вписаного кіл.

$$a_6 = R; a_6 = \frac{2r}{\sqrt{3}}; R = \frac{2r}{\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot 3}{\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} (\text{см}).$$

Відповідь: $BO = 2\sqrt{3}\text{ см}$.

8. Точки M і N поділяють коло на дві дуги, різниця градусних мір яких дорівнює 90° . Чому дорівнюють градусні міри кожної із дуг?

Розв'язання.

Сума градусних мір дуг дорівнює 360° , а різниця дорівнює 90° . Позначимо градусні міри дуг x і y . Маємо:

$$\begin{cases} x + y = 360^\circ \\ x - y = 90^\circ \end{cases} \quad 2x = 450^\circ, \quad x = 225^\circ, \quad \text{то } y = 135^\circ.$$

Відповідь: 135° , 225° .

9. Знайти відношення периметра правильного вписаного 12-кутника до діаметра.

Розв'язання.

$$P_{12} = a \cdot n = 2R \cdot n \cdot \sin \frac{180^\circ}{12} = 24R \sin 15^\circ. \quad \frac{P_{12}}{2R} = \frac{24R \cdot \sin 15^\circ}{2R} = 12 \sin 15^\circ \approx 12 \cdot 0,2588 \approx 3,12.$$

Відповідь: 3,12.

10. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 3 см . Обчислити довжину кола, описаного навколо нього.

Розв'язання.

Сторона рівностороннього трикутника знаходиться за формулою $a_3 = R\sqrt{3}$,

$$\text{звідки } R = \frac{a_3}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} (\text{см}), \quad \text{тоді } l = 2\pi \cdot \frac{3}{\sqrt{3}}; \quad l = 2\pi\sqrt{3} (\text{см}).$$

11. Обчислити радіус кола, довжина якого дорівнює $12,5\text{ дм}$.

Розв'язання.

$$l = 2\pi R; \quad R = \frac{l}{2\pi} = \frac{12,56}{6,28} = 2 (\text{дм}).$$

Відповідь: $R = 2\text{ дм}$.

44

✓

1. Ламана (нерівність ламаної)

Задача:
Ланки ламаної $ABCD$ дорівнюють $AB = 2$ см, $BC = 3$ см, $CD = 5$ см. Чи може відрізок AD дорівнювати:
а) 1 см;
б) 9 см;
в) 10 см?

Розв’язання:
Довжина ламаної $= 2 + 3 + 5 = 10$ см.
Відрізок AD не довший за ламану: $AD \leq 10$.
Також AD не може бути меншим за різницю найдовшої ланки та суми інших? Ні — тут нерівність ламаної: довжина ламаної **не менша** за відстань між кінцями. Тому $AD \leq 10$, але AD може бути дуже малим, якщо точки майже збігаються (геометрично можна зламати так, щоб кінці зблизити до нуля, але строго >0).
Формально: AD може бути будь-яким числом від 0 до 10 (крім 0 , бо точки різні).

Відповідь:
а) 1 — **так** (лежить між 0 і 10)
б) 9 — **так**
в) 10 — **так** (якщо ламана випрямлена).

Зауважте: у вашому прикладі $0,5$ см — можливо, 8 см — ні, бо $8 < 7$. Там довжина ламаної 7 , тому $EO \leq 7$. У моїй задачі верхня межа 10 .

2. Кути многокутника (пропорційні числам)

Задача:
Кути опуклого чотирикутника пропорційні числам $2, 3, 4, 6$. Знайти всі кути.

Розв’язання:
Сума кутів чотирикутника: $180^\circ \cdot (4 - 2) = 360^\circ$.
Нехай коефіцієнт пропорційності k , тоді:
 $2k + 3k + 4k + 6k = 360$

$2k + 3k + 4k + 6k = 360$

$15k = 360$

$k = 24.$

Кути:
 $2k = 48^\circ, 3k = 72^\circ, 4k = 96^\circ, 6k = 144^\circ$.

Перевірка: сума $48 + 72 + 96 + 144 = 360$.

Відповідь: $48^\circ, 72^\circ, 96^\circ, 144^\circ$.

3. Кількість сторін многокутника за сумою кутів

Задача:
Сума внутрішніх кутів опуклого многокутника дорівнює 1980° . Скільки в нього сторін?

Розв’язання:
 $180(n - 2) = 1980$
 $n - 2 = \frac{1980}{180}$
 $n - 2 = 11$
 $n = 13.$

Відповідь: 13 сторін.

4. Сума кутів для заданого n

Задача:
Знайти суму внутрішніх кутів опуклого 12-кутника.

Розв’язання:
 $180^\circ \cdot (12 - 2) = 180^\circ \cdot 10 = 1800^\circ$.

Відповідь: 1800° .

5. Правильний трикутник і квадрат, вписані в коло

Задача:
Сторона правильного трикутника, вписаного в коло, дорівнює a . Знайти сторону квадрата, вписаного в те саме коло.

Розв’язання:
Для правильного трикутника: $a = R\sqrt{3}$.
Звідси радіус кола: $R = \frac{a}{\sqrt{3}}$.

Для квадрата: сторона $b = R\sqrt{2}$.
Підставляємо R :
 $b = \frac{a}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{2} = a\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Відповідь: $a\sqrt{\frac{2}{3}}$ (або $\frac{a\sqrt{6}}{3}$).

6. (Обернена задача) Квадрат вписаний, знайти сторону трикутника

Задача:
Сторона квадрата, вписаного в коло, дорівнює b . Знайти сторону правильного трикутника, вписаного в те саме коло.

Розв’язання:
Для квадрата: $b = R\sqrt{2} \rightarrow R = \frac{b}{\sqrt{2}}$
Для трикутника: $a = R\sqrt{3} = \frac{b}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{3} = b\sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{b\sqrt{6}}{2}$.

Відповідь: $\frac{b\sqrt{6}}{2}$.

Задача 1: Радіус кола, описаного навколо правильного п'ятикутника

Умова:
Радіус кола, вписаного в правильний п'ятикутник, дорівнює 4 см. Знайти радіус кола, описаного навколо цього п'ятикутника.

Розв'язок:
Для правильного п'ятикутника зв'язок між радіусом вписаного кола r і радіусом описаного кола R визначається формулою:

$$r = R \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$$

де $\frac{\pi}{5} = 36^\circ$.

Відомо, що:

$$\cos(36^\circ) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$$

Тому:

$$4 = R \cdot \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \implies R = \frac{16}{1 + \sqrt{5}}$$

Рационалізуємо знаменник:

$$R = \frac{16(1 - \sqrt{5})}{(1 + \sqrt{5})(1 - \sqrt{5})} = \frac{16(1 - \sqrt{5})}{1 - 5} = \frac{16(1 - \sqrt{5})}{-4} = 4(\sqrt{5} - 1)$$

Відповідь:
 $R = 4(\sqrt{5} - 1)$ см

Задача 2: Радіус кола, вписаного в правильний восьмикутник

Умова:
Радіус кола, описаного навколо правильного восьмикутника, дорівнює 10 см. Знайти радіус кола, вписаного в цей восьмикутник.

Розв'язок:
Для правильного восьмикутника зв'язок між радіусом описаного кола R і радіусом вписаного кола r визначається формулою:

$$r = R \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$$

де $\frac{\pi}{8} = 22.5^\circ$.

Відомо, що:

$$\cos(22.5^\circ) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$



Тому:

$$r = 10 \cdot \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} = 5\sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

Відповідь:
 $r = 5\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ см

Задача 3: Гради в кутах трикутника

Умова:
Кути трикутника дорівнюють 30° , 70° і 80° . Знайти ці кути в градусах.

Розв'язок:
Град — це одиниця вимірювання кутів, де повний кут дорівнює 400 градам. Перехід від градусів до градусів здійснюється за формулою:

$$\text{Гradi} = \text{Гradiси} \cdot \frac{400}{360} = \text{Гradiси} \cdot \frac{10}{9}$$

- Тому:
- $30^\circ = 30 \cdot \frac{10}{9} = \frac{300}{9} \approx 33.\bar{3}$ гради,
 - $70^\circ = 70 \cdot \frac{10}{9} = \frac{700}{9} \approx 77.\bar{7}$ гради,
 - $80^\circ = 80 \cdot \frac{10}{9} = \frac{800}{9} \approx 88.\bar{8}$ гради.

Відповідь:
 $33.\bar{3}$ гради, $77.\bar{7}$ гради, $88.\bar{8}$ гради

Задача 4: Довжина дуги кола

Умова:
Радіус кола дорівнює 6 см. Знайти довжину дуги, яка відповідає центральному куту 120° .

Розв'язок:
Довжина дуги l обчислюється за формулою:

$$l = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi R$$

де $\theta = 120^\circ$, $R = 6$ см.

Тому:

$$l = \frac{120}{360} \cdot 2\pi \cdot 6 = \frac{1}{3} \cdot 12\pi = 4\pi \text{ см}$$

Відповідь:
 $l = 4\pi$ см



Відповідь:
 $l = 4\pi$ см

Задача 5: Відношення периметрів правильних багатокутників

Умова:
Знайти відношення периметра правильного вписаного дванадцятикутника до діаметра описаного кола.

Розв'язок:
Периметр правильного дванадцятикутника, вписаного в коло радіуса R , дорівнює:
 $P_{12} = 12 \cdot a_{12}$

де $a_{12} = 2R \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Відомо, що:

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sin(15^\circ) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

Тому:

$$a_{12} = 2R \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = R \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$$

Периметр:

$$P_{12} = 12 \cdot R \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} = 6R(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

Діаметр кола дорівнює $2R$, тому відношення:

$$\frac{P_{12}}{2R} = \frac{6R(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{2R} = 3(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

Відповідь:
 $3(\sqrt{6} - \sqrt{2})$

Задача 6: Радіус кола, описаного навколо рівнобічної трапеції

Умова:
Більша основа рівнобічної трапеції дорівнює 10 см, менша — 6 см, а бічна сторона — 5 см. Знайти радіус кола, описаного навколо цієї трапеції.

Розв'язок:
Для рівнобічної трапеції, яку можна вписати в коло, сума довжин основ дорівнює сумі довжин бічних сторін:
 $AB + CD = AD + BC$

У цій задачі:



$$AB + CD = AD + BC$$

У цій задачі:
 $10 + 6 = 5 + 5 \implies 16 = 10$

Ця умова не виконується, тому трапецію не можна вписати в коло.

Відповідь:
Таку трапецію не можна вписати в коло.