

A graph showing the function $y = \sin 2x$ (solid line) and the function $y = \sin x$ (dashed line) on a Cartesian coordinate system. The x-axis is labeled with $-\pi$, $-\frac{\pi}{2}$, 0 , $\frac{\pi}{2}$, and π . The y-axis is labeled with 1 and -1 . The solid line $y = \sin 2x$ has a period of π , while the dashed line $y = \sin x$ has a period of 2π .

13

$$\frac{\cos \frac{\alpha}{3} \cos \alpha}{\cos \alpha}$$

14

$$\sin^8 \alpha + \cos^8 \alpha = \frac{1}{32}(\cos^2 4\alpha + 14\cos 4\alpha + 17)$$

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$
 $\frac{7}{8}$

Тотожність доведена.

$0,5 = 0,5$. Тотожність доведена.

Тотожність доведена.

$$= \frac{1}{2} \sin 106^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3 = 3.$$

3

$$\sqrt{2} \sin 25^\circ = 3.$$
[illegible]
$$\frac{\cos 14^\circ \sin 28^\circ}{\frac{1}{2}} = \frac{\sin 28^\circ}{2 \sin 28^\circ} = \frac{1}{2}$$
 $\frac{1}{2}$

16

$$= \frac{1}{4} \sin 3 \cdot 10^\circ = \frac{1}{4} \sin 30^\circ = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

Відповідь: так.

Відповідь: так.

Відповідь: ні.

$$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = -\frac{1}{4} \cdot 4 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{1}{4} \sin 2\alpha$$

--	--	--	--

[illegible]

11 Побудова графіків тригонометричних функцій

1. Для побудови графіка функції $y = f(x) + a$ треба графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Oy на a одиниць вгору, якщо $a > 0$, і на a одиниць вниз, якщо $a < 0$.

2. Для побудови графіка функції $y = f(x + a)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Ox на a одиниць вправо при $a < 0$ і на a одиниць вліво при $a > 0$.

3. Для побудови графіка $y = -f(x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично відносно осі Ox .

4. Для побудови графіка $y = f(-x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично осі Oy .

5. Для побудови графіка $y = |f(x)|$ необхідно додатну частину графіка $y = f(x)$ залишити незмінною, а від'ємну частину відобразити симетрично відносно осі Ox .

6. Для побудови графіка функції $y = f(|x|)$ можна розглянути співвідношення:

$$f(|x|) = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } x > 0 \\ f(-x), & \text{якщо } x < 0 \end{cases}$$

Звідси випливає, що при $x \geq 0$ треба будувати графік функції $y = f(x)$, а для $x < 0$ треба побудувати графік, який буде симетричним для вже побудованого графіка відносно осі Oy .

7. Для побудови графіка $y = kf(x)$ необхідно ординати всіх точок графіка $y = f(x)$ помножити на k , залишивши при цьому незмінними абсциси. Причому, при $k > 1$ графік $y = kf(x)$ отримують з графіка $y = f(x)$ розтягненням його від осі Ox у k разів, а при $0 < k < 1$ — за допомогою стиснення до осі Ox у $\frac{1}{k}$ разів. Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у перпендикулярних напрямках до осі Ox .

8. Для побудови графіка $y = f(kx)$, $k > 0$ необхідно всі абсциси графіка $y = f(x)$ розділити на k , залишивши ординати незмінними. Тобто при $k > 1$ графік $y = f(kx)$ отримують з графіка $y = f(x)$, стискаючи його до осі Oy у k разів, а при $0 < k < 1$ розтягують графік $y = f(x)$ від осі Oy у $\frac{1}{k}$ разів. Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у напрямках, перпендикулярних до осі Oy .

6. Розтягування/стиснення по осі Ox (зміна періоду):

- Для функції $y = \sin(kx)$, де $k > 0$:
- При $k > 1$: графік стискається, період зменшується до $2\pi/k$
- При $0 < k < 1$: графік розтягується, період збільшується до $2\pi/k$

7. Розтягування/стиснення по осі Oy (зміна амплітуди):

- Для функції $y = A \cdot \sin(x)$, де $A \neq 0$:
- При $|A| > 1$: амплітуда збільшується в $|A|$ разів
- При $0 < |A| < 1$: амплітуда зменшується в $|A|$ разів
- При $A < 0$: додатково відображення відносно осі Ox

8. Загальний вигляд:

$y = A \cdot \sin(k(x - a)) + b$, де:

- A - амплітуда
- k - коефіцієнт частоти (період $= 2\pi/k$)
- a - зсув по осі Ox
- b - зсув по осі Oy

9. Додаткові властивості:

- Парність/непарність зберігається при вертикальних зсувах
- Композиція перетворень: порядок має значення
- Для $\cos(x)$ діють аналогічні правила

Також корисно запам'ятати, що всі ці перетворення можна застосовувати до будь-якої тригонометричної функції ($\cos$, tg , ctg).

12

6. Для побудови графіка функції $y = f(|x|)$ можна розглянути співвідношення:

$$f(|x|) = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } x > 0 \\ f(-x), & \text{якщо } x < 0 \end{cases}$$

Звідси випливає, що при $x \geq 0$ треба будувати графік функції $y = f(x)$, а для $x < 0$ треба побудувати графік, який буде симетричним для вже побудованого графіка відносно осі Oy .

7. Для побудови графіка $y = kf(x)$ необхідно ординати всіх точок графіка $y = f(x)$ помножити на k , залишивши при цьому незмінними абсциси. Причому, при $k > 1$ графік $y = kf(x)$ отримують з графіка $y = f(x)$ розтягненням його від осі Ox у k разів, а при $0 < k < 1$ — за допомогою стиснення до осі Ox у $\frac{1}{k}$ разів. Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у перпендикулярних напрямках до осі Ox .

8. Для побудови графіка $y = f(kx)$, $k > 0$ необхідно всі абсциси графіка $y = f(x)$ розділити на k , залишивши ординати незмінними. Тобто при $k > 1$ графік $y = f(kx)$ отримують з графіка $y = f(x)$, стискаючи його до осі Oy у k разів, а при $0 < k < 1$ розтягують графік $y = f(x)$ від осі Oy у $\frac{1}{k}$ разів. Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у напрямках, перпендикулярних до осі Oy .

До пункту 6 (модуль функції):

- Важливо підкреслити: $y = |f(x)|$ завжди ≥ 0
- Всі від'ємні частини вихідного графіка відображаються вгору відносно осі Ox
- Функція $y = |\sin x|$ має період π (а не 2π), оскільки графік "складається" вдвічі

До пункту 7 (множення на константу k):

- При $k < 0$: крім зміни амплітуди відбувається відображення відносно осі Ox
- Наприклад: $y = -2\sin x$ (амплітуда 2, але графік перевернутий)

До пункту 8 (аргумент з коефіцієнтом):

- Період функції $y = f(kx)$ дорівнює T_0/k , де T_0 - період вихідної функції
- Для $y = \sin(kx)$: період $= 2\pi/k$
- При $k = 1/2$: $y = \sin(x/2)$, період $= 4\pi$ (розтягнення)
- При $k = 2$: $y = \sin(2x)$, період $= \pi$ (стиснення)

Додаткові зауваження:

- Комбінація перетворень: $y = A|\sin(kx + \phi)| + b$
- Порядок застосування перетворень впливає на результат
- Для практичних завдань корисно запам'ятати ключові точки: $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$

Типові помилки:

- Плутання між $y = f(kx)$ та $y = kf(x)$
- Неправильне визначення періоду при модулі функції

1) Перетворити у добутки

$$\sin 4x + \sin 2x$$

Ф-ла: $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$

$$\sin 4x + \sin 2x = 2 \sin \frac{4x+2x}{2} \cdot \cos \frac{4x-2x}{2} = 2 \sin 3x \cos x$$

Візьми: $\sin 4x + \sin 2x = 2 \sin 3x \cos x$

2) Перетворити у добутки

$$\cos 5x - \cos 3x$$

Ф-ла: $\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \cdot \sin \frac{A-B}{2}$

$$\cos 5x - \cos 3x = -2 \sin \frac{5x+3x}{2} \cdot \sin \frac{5x-3x}{2} = -2 \sin 4x \cdot \sin x$$

Візьми: $\cos 5x - \cos 3x = -2 \sin 4x \sin x$

3) Перетворити у добутки

$$1 - 2 \sin^2 x$$

Ф-ла подвійного кута: $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$

Візьми: $1 - 2 \sin^2 x = \cos 2x$

4) Перетворити у добутки

$$\sin^2 x - \cos^2 y$$

Ф-ли: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$; $\cos^2 y = \frac{1 + \cos 2y}{2}$

$$\sin^2 x - \cos^2 y = \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{1 + \cos 2y}{2} = \frac{-\cos 2x - \cos 2y}{2}$$

Далі зор-моно: $\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$
 $= \frac{-\cos 2x - \cos 2y}{2} = -\cos(x+y) \cos(x-y)$

Візьми: $\sin^2 x - \cos^2 y = -\cos(x+y) \cos(x-y)$

13		УЧНІВСЬКА СТОРІНКА	
		Подати у вигляді добутку.	
1. $\sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2}$	$\sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2} = 2 \sin \frac{10\alpha+9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} \cos \frac{10\alpha-9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} = 2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$		
Відповідь:	$2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$		
2. $\sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha$	$\sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha = \sin \alpha + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \cos \frac{\alpha}{2} \left(\sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{5\alpha}{2} \right) = 2 \cos \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \sin \frac{3\alpha}{2} \cos \alpha = 4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2}$		
Відповідь:	$4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2}$		
3. $\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta$	$\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} - \frac{1 + \cos 2\beta}{2} = \frac{-\cos 2\alpha - \cos 2\beta}{2} = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$		
Відповідь:	$\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$		
4. $\sin \alpha + \cos \beta$	$\sin \alpha + \cos \beta = \sin \alpha + \sin(90^\circ - \beta) = 2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2}$		
Відповідь:	$\sin \alpha + \cos \beta = 2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2}$		
5. $3 - 4 \sin^2 \alpha$	$3 - 4 \sin^2 \alpha = 4 \left(\frac{3}{4} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - \sin^2 \alpha \right) = 4 \left(\sin^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \frac{1 - \cos \frac{2\pi}{3} - 1 + \cos 2\alpha}{2} = 2 \left(\cos 2\alpha - \cos \frac{2\pi}{3} \right) = 4 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)$		
Відповідь:	$3 - 4 \sin^2 \alpha = 4 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)$		
6. $3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha$	$3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3} (\sqrt{3} - \operatorname{tg} \alpha) = \sqrt{3} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} - \operatorname{tg} \alpha \right) = \frac{\sqrt{3} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \frac{\pi}{3} \cos \alpha} = \frac{2 \sqrt{3} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \alpha}$		

Тримаймо це напам'яті як застосувати тригонометричні потужності для спрощення виразів та доведення рівностей

① Обчислити $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha$ якщо $\sin^2 \alpha = \frac{1}{3}$

Використовуємо тотожність:

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = (\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3$$

Застосовуємо ф-лу суми кубів:

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

Якщо $a = \sin^2 \alpha$; $b = \cos^2 \alpha$ маємо:

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha)$$

Оскільки $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ то:

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = \sin^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha$$

Використовуємо тотожність:

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

Підставляємо значення $\sin^2 \alpha = \frac{1}{3}$; $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = \frac{2}{3}$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Відповідь: $\frac{1}{3}$

② Доведіть тотожність: $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = 2 \sin^2 \alpha - 1$

1) Використавши формули різниці квадратів:

$$\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$$

2) Оскільки $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ то: $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$

3) Вирозини $\cos^2 \alpha$ через $\sin^2 \alpha$: $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$

4) Підставимо у вираз: $\sin^2 \alpha - (1 - \sin^2 \alpha) = 2 \sin^2 \alpha - 1$

Тотожність доведена.

③ Доведіть тотожність з використанням формули подвійного кута Довести тотожність $\sin^2(\alpha + 30^\circ) + \sin^2(\alpha - 30^\circ) = 1$

Доведення: 1) Використавши формулу для $\sin^2 x$: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$

2) Підставимо у вираз: $\sin^2(\alpha + 30^\circ) + \sin^2(\alpha - 30^\circ) = \frac{1 - \cos(2\alpha + 60^\circ)}{2} + \frac{1 - \cos(2\alpha - 60^\circ)}{2} =$

$$= 1 - \frac{\cos(2\alpha + 60^\circ) + \cos(2\alpha - 60^\circ)}{2}$$

Відповідь:

14

$$3 - \sqrt{3} \tan \alpha = \frac{2\sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)}{\cos \alpha}.$$

14

Корисні тотожності

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha = \frac{1}{4}(3 + \cos 4\alpha)$$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\alpha = \frac{1}{8}(5 - \cos 4\alpha)$$

$$\sin^8 \alpha + \cos^8 \alpha = \frac{1}{32}(\cos^2 4\alpha + 14 \cos 4\alpha + 17)$$

7. Обчислити.

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha,$$

$$\text{якщо } \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Розв'язання.

$$1) \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha$$

$$2) \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ то } (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \frac{1}{2}, \text{ тобто}$$

$$\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + \sin 2\alpha$$

$$1 + \sin 2\alpha = \frac{1}{2}, \sin 2\alpha = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}, \text{ тоді}$$

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

Відповідь:

$$\frac{7}{8}.$$

8. Довести тотожність.

$$\frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - 1}{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha - 1} = \frac{2}{3}.$$

Доведення.

$$\frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - 1}{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha - 1} = \frac{1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha - 1}{1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\alpha - 1} =$$

$$= \frac{1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 1}{1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 1} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}.$$

Тотожність доведена.

9. Довести тотожність.

$$\sin^2(\alpha - 30^\circ) + \sin^2(\alpha + 30^\circ) - \sin^2 \alpha = 0, 5.$$

Доведення.

$$\begin{aligned} & \sin^2(\alpha - 30^\circ) + \sin^2(\alpha + 30^\circ) - \sin^2 \alpha = \\ &= \frac{1 - \cos(2\alpha - 60^\circ)}{2} + \frac{1 - \cos(2\alpha + 60^\circ)}{2} - \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} = \\ &= \frac{1 - 2 \cos 2\alpha \cos 60^\circ + \cos 2\alpha}{2} - \frac{1 - \cos 2\alpha + \cos 2\alpha}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

0, 5 = 0, 5. Тотожність доведена.

3) Використання ф-ли суми косинусів:

$$\cos A + \cos B = 2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

Путем $A = 2\alpha + 60^\circ$; $B = 2\alpha - 60^\circ$ маємо: $\cos(2\alpha + 60^\circ) + \cos(2\alpha - 60^\circ) = 2 \cos(2\alpha) \cos(60^\circ)$

4) Підставити знач: $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$

$$\cos(2\alpha + 60^\circ) + \cos(2\alpha - 60^\circ) = 2 \cos(2\alpha) \cos(60^\circ) = 2 \cos(2\alpha) \cdot \frac{1}{2} = \cos(2\alpha)$$

5) Підставити у початковий вираз $\sin^2(\alpha + 30^\circ) + \sin^2(\alpha - 30^\circ) = 1$

$$1 - \frac{\cos(2\alpha)}{2} + 1 - \frac{\cos(2\alpha)}{2} = 1$$

Поточність доведена.

④ Вчислений вираз з використанням формул подвійного кута

Обчислити $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$ якщо $\sin 2\alpha = \frac{3}{5}$

Розв'язання: 1) Використати поточність для $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

2) Вскільки $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ то: $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$

3) Використовуючи формулу подвійного кута для синуса:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \text{ маємо: } \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2} = \frac{3}{10}$$

4) Піднесення до квадрата $\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = \left(\frac{3}{10}\right)^2 = \frac{9}{100}$

5) Підставити у вираз: $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2 \cdot \frac{9}{100} = 1 - \frac{18}{100} = \frac{82}{100} = \frac{41}{50}$

Відповідь: $\frac{41}{50}$

⑤ Доведення поточності з використанням формул суми та різниці кутів

Довести поточність $\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$

1) Використати ф-лу добутку синусів: $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$

Путем $A = \alpha + \beta$; $B = \alpha - \beta$, маємо:

$$\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{2} [\cos((\alpha + \beta) - (\alpha - \beta)) - \cos((\alpha + \beta) + (\alpha - \beta))] = \frac{1}{2} [\cos(2\beta) - \cos(2\alpha)]$$

2) Спрощений вираз в дужках $(\alpha + \beta) - (\alpha - \beta) = 2\beta$; $(\alpha + \beta) + (\alpha - \beta) = 2\alpha$

3) Підставити назад у вираз: $\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{2} [\cos(2\beta) - \cos(2\alpha)]$

4) Використати α -лу подвійного кута для косинуса:

$$\cos(2\alpha) = 1 - 2\sin^2\alpha; \quad \cos(2\beta) = 1 - 2\sin^2\beta$$

5) Підставивши виразів у формулу:

$$\frac{1}{2}[(1 - 2\sin^2\beta) - (1 - 2\sin^2\alpha)] = \frac{1}{2}[2\sin^2\alpha - 2\sin^2\beta] = \sin^2\alpha - \sin^2\beta$$

Тотожність доведена

15

10. Довести тотожність. $\frac{\sin^2 3\alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 3\alpha - \cos 5\alpha \cos \alpha} = 2 \cos 2\alpha.$	Доведення. Оскільки $\sin^2 3\alpha = \frac{1 - \cos 6\alpha}{2}$, $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$, $\cos^2 3\alpha = \frac{1 + \cos 6\alpha}{2},$ $\cos 5\alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}(\cos 4\alpha + \cos 6\alpha), \text{ то}$ $\frac{\sin^2 3\alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 3\alpha - \cos 5\alpha \cos \alpha} = \frac{\cos 2\alpha - \cos 6\alpha}{1 - \cos 4\alpha} =$ $= 2 \frac{\sin 4\alpha \sin 2\alpha}{1 - \cos 4\alpha} = 2 \frac{2 \sin 2\alpha \cos 2\alpha \sin 2\alpha}{2 \sin^2 2\alpha} = 2 \cos 2\alpha.$ Тотожність доведена.
11. Обчислити. $\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3.$	Розв'язання. Врахуємо: $\sin^2 68^\circ = \frac{1 - \cos 136^\circ}{2}; \quad \sin^2 38^\circ = \frac{1 - \cos 76^\circ}{2}, \text{ то}$ $\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ = \frac{1}{2}(\cos 76^\circ - \cos 136^\circ) =$ $= \sin 106^\circ \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \sin 106^\circ.$ Тоді $\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3 =$ $= \frac{1}{2} \sin 106^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3 = 3.$
Відповідь:	3.
12. Обчислити. $\frac{3(\cos 20^\circ - \sin 20^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ}.$	Розв'язання. $\frac{3(\cos 20^\circ - \sin 20^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = \frac{3(\cos 20^\circ - \cos 70^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} =$ $= \frac{6 \sin 45^\circ \sin 25^\circ}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = 3.$
Відповідь:	3.
13. Обчислити. $(\operatorname{tg} 14^\circ + \operatorname{ctg} 28^\circ) \cos 14^\circ \sin 14^\circ.$	Розв'язання. $\operatorname{tg} 14^\circ = \frac{\sin 14^\circ}{\cos 14^\circ}; \quad \operatorname{ctg} 28^\circ = \frac{\cos 28^\circ}{\sin 28^\circ}, \text{ то}$ $(\operatorname{tg} 14^\circ + \operatorname{ctg} 28^\circ) \cos 14^\circ \sin 14^\circ =$ $= \frac{\sin 14^\circ \sin 28^\circ + \cos 14^\circ \cos 28^\circ}{\cos 14^\circ \cdot \cos 14^\circ \cdot \sin 14^\circ} \cos 14^\circ \sin 14^\circ =$ $= \frac{\cos 14^\circ \sin 28^\circ}{\cos 14^\circ \sin 28^\circ} = \frac{\sin 28^\circ}{2 \sin 28^\circ} = \frac{1}{2}.$
Відповідь:	$\frac{1}{2}$.