SWISH PARA ANSIEDAD SOCIAL Y HABLAR EN PÚBLICO

Protocolo completo en 3 pasos: Swish adaptado + Anclaje + Exposición gradual

El miedo al juicio y al pánico social no desaparece con "respirar hondo" o "pensar positivo". Requiere interrumpir los patrones neurológicos que lo sostienen — directamente.

PNL · Basado en los pRICHARD BANDLER

NEURO-SHIFT.CLUB

Por qué la ansiedad social no se resuelve con fuerza de voluntad

El pánico social no es debilidad ni falta de preparación. Es un **patrón neurológico asociado a disparadores específicos**:

🎤 Hablar en público

→ pánico automático

👥 Entrar a un evento solo

→ pánico automático

📹 Videollamada con cámara

→ pánico automático

🗣️ "Ahora presenta tú"

→ pánico automático

> Tu cerebro ejecuta estos patrones en **0.3 segundos**. Más rápido que tu consciencia. Por eso "respirar hondo" siempre llega tarde. El Swish interrumpe estos patrones automáticos y los reemplaza por respuestas nuevas.

El protocolo: 3 pasos en 14 días

A diferencia de la ansiedad genérica, la ansiedad social requiere un protocolo más completo que combine **3 técnicas**, no solo una.



Cada paso cumple una función distinta: el **Swish** cambia el patrón a largo plazo, el **Anclaje** te da control inmediato, y la **Exposición gradual** consolida el cambio en situaciones reales.

Paso 1: Swish adaptado para ansiedad social

1 Identifica tu disparador específico

No es "hablar en público" en general. Es una *imagen mental concreta*. Cierra los ojos. Recuerda la última vez que sentiste pánico social. *"¿Qué imagen apareció JUSTO antes de sentir ansiedad?"* Ejemplos: verte frente a una sala llena, levantarte para hablar, entrar solo a un evento. Hazla grande, brillante, JUSTO frente a ti.

2 Crea tu imagen deseada (versión social)

No se trata de verte "perfecto" o "sin nervios". Se trata de verte **conectado, presente y OK con ser imperfecto**. Vete hablando con calma, haciendo pausas, OK con un momento de silencio o una palabra olvidada. **Clave:** Vete desde fuera (disociado), como si vieras una película de ti mismo.

3 El Swish (7–10 repeticiones)

Imagen disparadora grande y brillante → imagen deseada pequeña y oscura en esquina inferior → expansión explosiva en menos de 1 segundo → di **"¡SWISH!"** con toda tu energía → abre ojos 5 segundos → repite. En ansiedad social necesitas **más repeticiones (7-10 vs 5-7)** porque el patrón está más arraigado.

Objetivo: Después de 7-10 repeticiones, el disparador original debería activar una sensación notablemente más neutra o incluso la imagen positiva directamente.

Paso 2: Anclaje de calma

El Swish cambia el patrón a largo plazo. El Anclaje te da control inmediato cuando aparece el pánico.

Crea tu anclaje (3-5 repeticiones)

Elige un **gesto ancla discreto** (que puedas hacer en público sin que nadie note):

- Presionar pulgar e índice de la mano izquierda
- Tocar el lóbulo de tu oreja
- Presionar tu muñeca con dos dedos

Evoca un momento de calma profunda → intensifica la experiencia (imágenes, sonidos, sensaciones) → cuando esté en su punto **MÁS INTENSO**, activa el gesto → mantén 5 segundos → suelta → rompe estado. Repite 3-5 veces.

Cómo usarlo en situaciones reales

Cuando sientas que el pánico empieza:

- Haz tu gesto ancla (presiona dedos, toca oreja)
- Respira profundo 2-3 veces
- Mantén el gesto hasta sentir que la calma regresa
- Continúa con lo que estabas haciendo

Nota: El anclaje NO elimina la ansiedad al 100%. Te da control suficiente para funcionar. Con práctica, se vuelve más potente.

Paso 3: Exposición gradual (14 días)

El Swish y el Anclaje preparan tu cerebro. La exposición consolida el cambio en situaciones reales.

Nivel 1–3 · Fácil (Días 3–5)

- Hacer una pregunta en una tienda
- Hablar en videollamada con cámara apagada
- Comentar algo en reunión pequeña (3-4 personas conocidas)

Nivel 4–6 · Moderado (Días 6–8)

- Videollamada con cámara encendida
- Hacer una pregunta en reunión de trabajo
- Ir a un evento social y hablar con 1 persona nueva

Nivel 7–9 · Difícil (Días 9–12)

- Presentar en reunión pequeña (5-10 personas)
- Dar tu opinión en desacuerdo con otros
- Ir solo a un evento de networking

Nivel 10 · Tu objetivo final (Días 13–14)

- Día 13: Preparación mental. Swish 5 veces. Anclaje.
- Día 14: Enfrenta tu situación objetivo (presentación formal, entrevista, evento)

Antes de cada exposición: **activa tu anclaje**.

Qué esperar durante los 14 días

Días 1–2

Swish + creación del Anclaje. El disparador original comienza a perder intensidad. Puede que la ansiedad siga en situaciones reales — es normal.

1

2

Días 3–8

Exposiciones de nivel bajo y moderado completadas. La ansiedad en situaciones cotidianas reducida **50–70%**. El anclaje se vuelve más efectivo con cada uso.

Días 9–12

Exposiciones difíciles. Incomodidad presente pero **manejable**. El cerebro empieza a recodificar estas situaciones como "superables, no peligrosas".

3

4

Días 13–14

Preparación y desafío final. Si aparece impulso residual de pánico, repite el Swish **mentalmente 3–5 veces** antes de la situación. El patrón se consolida.

Si en algún nivel te sientes paralizado, no es fracaso. Divide el nivel en pasos más pequeños o repite el nivel anterior hasta sentirte cómodo. La exposición debe ser incómoda, no traumática.

Troubleshooting

❌ "El Swish no funciona"

- Haz las imágenes más vívidas (colores, sonidos, detalles)
- Asegúrate de que el intercambio sea RÁPIDO (<1 segundo), no gradual

Aumenta repeticiones a **10–15 veces**

- Cambia la imagen deseada (hazla más atractiva para ti)

❌ "El anclaje no funciona en el momento"

- Refuerza el anclaje (repite el proceso de creación 5 veces más)

Úsalo **ANTES** de entrar a la situación, no durante el pico de pánico

- Combínalo con respiración: inhala 4, mantén 4, exhala 6

❌ "La exposición me paraliza"

- Divide el nivel en pasos más pequeños (ej: en vez de "reunión", primero "llegar y escuchar")
- Repite el nivel anterior hasta sentirte cómodo
- Usa disociación: imagínate viéndote a ti mismo hacerlo antes de hacerlo

❌ "Funciona en práctica pero no en situaciones reales"

- Practica el Swish usando la imagen de la situación real específica que enfrentarás

Activa el anclaje 5 minutos **ANTES** de la situación, no durante

- Haz mini-exposiciones más frecuentes (1 por día en vez de 1 cada 3 días)

Casos específicos

Casos según situación

🎤 Presentaciones formales

Disparador: verte frente a audiencia · Imagen deseada: hablando con pausas, contacto visual · Exposición: empieza con 3-5 personas

📹 Videollamadas / Reuniones

Disparador: ver tu propia cara o "¿alguien añade algo?" · Truco: oculta tu self-view · Imagen deseada: participando con naturalidad

👥 Networking / Eventos sociales

Disparador: entrar solo a evento lleno · Imagen deseada: acercándote a alguien · Exposición: ve con amigo primero, luego solo

💼 Entrevistas de trabajo

Disparador: pregunta difícil del entrevistador · Imagen deseada: tomarte pausa, OK con no saber algo · Anclaje: actívalo antes de entrar

Complementos opcionales

Disociación previa

Antes de cada exposición, imagínate viéndote a ti mismo en la situación (desde fuera, como película). Reduce la carga emocional antes de entrar.

Anclaje de confianza

Recuerda un momento en que te expresaste bien y te sentiste seguro → intensifica → en el pico, activa gesto → repite 3-5 veces → úsalo 5 min antes de la situación.

Recordatorios finales

01

La ansiedad social no tiene que desaparecer al 100%

El objetivo es que sea **manejable, no paralizante**. Cierto nivel de activación antes de hablar en público es normal e incluso útil.

02

Practica el Swish cada vez que aparezca el disparador

Durante las primeras 2 semanas, repítelo cada vez que surja. Después, tu cerebro lo ejecutará **automáticamente**.

03

El anclaje es tu salvavidas

Úsalo **sin vergüenza** cada vez que lo necesites. Activarlo antes de la situación es más efectivo que activarlo en el pico de pánico.

04

Celebra pequeñas victorias

Cada exposición completada es un logro, incluso si no salió "perfecta". Si sientes que un nivel es demasiado, retrocede uno. **No te fuerces al trauma.**

> → **Consigue el protocolo completo en neuro-shift.club**

Protocolo completo en neuro-shift.cl

NeuroShift | Protocolos de PNL para auto-aplicación | neuro-shift.clubBasado en técnicas de Richard Bandler · Material educativo que no sustituye terapia profesional para casos severos