

# SWISH PARA ANSIEDAD SOCIAL Y HABLAR EN PÚBLICO

Protocolo completo en 3 pasos: Swish adaptado +  
Anclaje + Exposición gradual

El miedo al juicio y al pánico social no desaparece con "respirar hondo" o "pensar positivo". Requiere interrumpir los patrones neurológicos que lo sostienen — directamente.

PNL • Basado en los pRICHARD BANDLER

NEURO-SHIFT.CLUB



# Por qué la ansiedad social no se resuelve con fuerza de voluntad

El pánico social no es debilidad ni falta de preparación. Es un **patrón neurológico asociado a disparadores específicos**:

 Hablar en público  
→ pánico automático

 Entrar a un evento solo  
→ pánico automático


 Videollamada con cámara  
→ pánico automático

 "Ahora presenta tú"  
→ pánico automático

Tu cerebro ejecuta estos patrones en **0.3 segundos**. Más rápido que tu consciencia. Por eso "respirar hondo" siempre llega tarde. El Swish interrumpe estos patrones automáticos y los reemplaza por respuestas nuevas.

# El protocolo: 3 pasos en 14 días

A diferencia de la ansiedad genérica, la ansiedad social requiere un protocolo más completo que combine **3 técnicas**, no solo una.



Cada paso cumple una función distinta: el **Swish** cambia el patrón a largo plazo, el **Anclaje** te da control inmediato, y la **Exposición gradual** consolida el cambio en situaciones reales.

# Paso 1: Swish adaptado para ansiedad social

## 1 Identifica tu disparador específico

No es "hablar en público" en general. Es una *imagen mental concreta*. Cierra los ojos. Recuerda la última vez que sentiste pánico social. "*¿Qué imagen apareció JUSTO antes de sentir ansiedad?*" Ejemplos: verte frente a una sala llena, levantarte para hablar, entrar solo a un evento. Hazla grande, brillante, JUSTO frente a ti.

## 2 Crea tu imagen deseada (versión social)

No se trata de verte "perfecto" o "sin nervios". Se trata de verte **conectado, presente y OK con ser imperfecto**. Vete hablando con calma, haciendo pausas, OK con un momento de silencio o una palabra olvidada. **Clave:** Vete desde fuera (disociado), como si vieras una película de ti mismo.

## 3 El Swish (7-10 repeticiones)

Imagen disparadora grande y brillante → imagen deseada pequeña y oscura en esquina inferior → expansión explosiva en menos de 1 segundo → di "**¡SWISH!**" con toda tu energía → abre ojos 5 segundos → repite. En ansiedad social necesitas **más repeticiones (7-10 vs 5-7)** porque el patrón está más arraigado.



**Objetivo:** Después de 7-10 repeticiones, el disparador original debería activar una sensación notablemente más neutra o incluso la imagen positiva directamente.

# Paso 2: Anclaje de calma

El Swish cambia el patrón a largo plazo. El Anclaje te da control inmediato cuando aparece el pánico.

## Crea tu anclaje (3-5 repeticiones)

Elige un **gesto ancla discreto** (que puedas hacer en público sin que nadie note):

- Presionar pulgar e índice de la mano izquierda
- Tocar el lóbulo de tu oreja
- Presionar tu muñeca con dos dedos

Evoca un momento de calma profunda → intensifica la experiencia (imágenes, sonidos, sensaciones) → cuando esté en su punto **MÁS INTENSO**, activa el gesto → mantén 5 segundos → suelta → rompe estado. Repite 3-5 veces.

## Cómo usarlo en situaciones reales

Cuando sientas que el pánico empieza:

- Haz tu gesto ancla (presiona dedos, toca oreja)
- Respira profundo 2-3 veces
- Mantén el gesto hasta sentir que la calma regresa
- Continúa con lo que estabas haciendo

**Nota:** El anclaje NO elimina la ansiedad al 100%. Te da control suficiente para funcionar. Con práctica, se vuelve más potente.

# Paso 3: Exposición gradual (14 días)

El Swish y el Anclaje preparan tu cerebro. La exposición consolida el cambio en situaciones reales.

## Nivel 1–3 · Fácil (Días 3–5)

- Hacer una pregunta en una tienda
- Hablar en videollamada con cámara apagada
- Comentar algo en reunión pequeña (3-4 personas conocidas)

## Nivel 4–6 · Moderado (Días 6–8)

- Videollamada con cámara encendida
- Hacer una pregunta en reunión de trabajo
- Ir a un evento social y hablar con 1 persona nueva

## Nivel 7–9 · Difícil (Días 9–12)

- Presentar en reunión pequeña (5-10 personas)
- Dar tu opinión en desacuerdo con otros
- Ir solo a un evento de networking

## Nivel 10 · Tu objetivo final (Días 13–14)

- Día 13: Preparación mental. Swish 5 veces. Anclaje.
- Día 14: Enfrenta tu situación objetivo (presentación formal, entrevista, evento)

Antes de cada exposición: **activa tu anclaje.**



# Qué esperar durante los 14 días



**Si en algún nivel te sientes paralizado**, no es fracaso. Divide el nivel en pasos más pequeños o repite el nivel anterior hasta sentirte cómodo. La exposición debe ser incómoda, no traumática.

# Troubleshooting

## ✗ "El Swish no funciona"

- Haz las imágenes más vívidas (colores, sonidos, detalles)
- Asegúrate de que el intercambio sea RÁPIDO (<1 segundo), no gradual

Aumenta repeticiones a **10-15 veces**

- Cambia la imagen deseada (hazla más atractiva para ti)

## ✗ "El anclaje no funciona en el momento"

- Refuerza el anclaje (repite el proceso de creación 5 veces más)

Úsalo **ANTES** de entrar a la situación, no durante el pico de pánico

- Combínalo con respiración: inhala 4, mantén 4, exhala 6

## ✗ "La exposición me paraliza"

- Divide el nivel en pasos más pequeños (ej: en vez de "reunión", primero "llegar y escuchar")
- Repite el nivel anterior hasta sentirte cómodo
- Usa disociación: imagínate viéndote a ti mismo hacerlo antes de hacerlo

## ✗ "Funciona en práctica pero no en situaciones reales"

- Practica el Swish usando la imagen de la situación real específica que enfrentarás

Activa el anclaje 5 minutos **ANTES** de la situación, no durante

- Haz mini-exposiciones más frecuentes (1 por día en vez de 1 cada 3 días)



# Casos específicos

## Casos según situación

### Presentaciones formales

Disparador: verte frente a audiencia · Imagen deseada: hablando con pausas, contacto visual · Exposición: empieza con 3-5 personas

### Videollamadas / Reuniones

Disparador: ver tu propia cara o "¿alguien añade algo?" · Truco: oculta tu self-view · Imagen deseada: participando con naturalidad

### Networking / Eventos sociales

Disparador: entrar solo a evento lleno · Imagen deseada: acercándote a alguien · Exposición: ve con amigo primero, luego solo

### Entrevistas de trabajo

Disparador: pregunta difícil del entrevistador · Imagen deseada: tomarte pausa, OK con no saber algo · Anclaje: actívalo antes de entrar

## Complementos opcionales

### Disociación previa

Antes de cada exposición, imagínate viéndote a ti mismo en la situación (desde fuera, como película). Reduce la carga emocional antes de entrar.

### Anclaje de confianza

Recuerda un momento en que te expresaste bien y te sentiste seguro → intensifica → en el pico, activa gesto → repite 3-5 veces → úsalo 5 min antes de la situación.

# Recordatorios finales

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                        |
| La ansiedad social no tiene que desaparecer al 100%<br>El objetivo es que sea <b>manejable, no paralizante</b> . Cierta nivel de activación antes de hablar en público es normal e incluso útil. | Practica el Swish cada vez que aparezca el disparador<br>Durante las primeras 2 semanas, repítelo cada vez que surja. Después, tu cerebro lo ejecutará <b>automáticamente</b> . | El anclaje es tu salvavidas<br>Úsalo <b>sin vergüenza</b> cada vez que lo necesites. Activarlo antes de la situación es más efectivo que activarlo en el pico de pánico. |

0

---

4

**Celebra pequeñas victorias**

Cada exposición completada es un logro, incluso si no salió "perfecta". Si sientes que un nivel es demasiado, retrocede uno. **No te fuerces al trauma.**

→ Consigue el protocolo completo en [neuro-shift.club](https://neuro-shift.club)

Protocolo completo en [neuro-shift.cl](https://neuro-shift.club)

---

NeuroShift | Protocolos de PNL para auto-aplicación | [neuro-shift.club](https://neuro-shift.club) Basado en técnicas de Richard Bandler · Material educativo que no sustituye terapia profesional para casos severos