

题目溯源

上海高一上数学 · 跨卷同题与真题出处考证

41 份试卷 718 道一级题干 × 参考库 16,273 道高考真题
跨卷两两 257,403 对 | 逐字同题 43 组、同模板变体 14 组

本文件由 工具/README 转 `tex.py` 从 `README.md` 的「题目溯源」一节自动生成，内容与该节逐字一致。判定口径、阈值与踩过的坑见末节「方法与局限」；两档同题表的每一行都注明了该对「变在哪」，跨卷同题的成员已逐题回原图/核过。

目录

1	核对摘要	2
2	回原图逐题核对（2026-09-15 起，按批推进）	8
3	材料流转	33
4	上游是「共享题库」：43 组逐字同题 + 14 组同模板变体	36
5	能考据到的高考出处：41 道真题（46 条对应 / 54 个题位）	46
6	考据不出来的：绝大多数	55
7	非高考但能考据到来源的题	56
8	附加题专查（最早带附加题的五份 14 题）	57
9	方法与局限	61

1 核对摘要

项	结果
核对范围	41 份试卷的 718 道一级题干（其中最早入库的 12 份 211 道），逐题比对参考库的 16,273 道高考真题；跨卷两两 257,403 对。高一 16 / 高一 18 不计入——它们分别与高一 b / 高一 c 同卷，重复计入只会造出成对的假同题
定到具体高考试卷	41 道真题（46 条对应：原题照录 22、改编 21、借定义 / 借集合另出题 3），对应本库 54 个题位——其中 3 道真题被三份试卷用到（2015 上海卷（春）：高一 13 / 17 / 25；2003 上海卷（秋理）：高一 17 / 20 / 36；2010 湖南卷（文）填空 7：高一 08 / 高一 a / 高一 39），7 道各被两份用到。三个数与「真题出处」表逐行数出来的完全相同，拆解与该表的出处一并见该节；2026-09-28 起这几处数与那张表已由 工具 / 计数核对 .py 逐行复算守住
跨卷同题（校际重复）	逐字同题 43 组 + 同模板变体 14 组（另有 8 对分数够不上变体线、但读过原文确属真同题，手工补记），两档成员共 110 道（逐字 87 + 只出现在变体档的 23）——其中逐字档的 87 道已逐题对照原图 / 的原卷核实过（含本轮新增的 8 个题位）
与真题同题型但非同一题	约 40 道（上一轮逐条判读；本轮只跑机判，未逐条重判），未计入
其余	真题库里既无 ≥ 12 字的逐字串、也无「 $r \geq 0.71$ 且最长串 ≥ 12 」的候选 $\rightarrow$ 非高考真题

下面几段是上表数字的来历（溯源一共跑过十二轮：12 份 $\rightarrow$ 17 份 $\rightarrow$ 18 份 $\rightarrow$ 21 份 $\rightarrow$ 22 份 $\rightarrow$ 24 份 $\rightarrow$ 28 份 $\rightarrow$ 29 份 $\rightarrow$ 30 份 $\rightarrow$ 36 份 $\rightarrow$ 40 份 $\rightarrow$ 41 份）；前九轮的数字保留原文以便对照，以末一段的 41 份口径为准第三轮是 2026-09-15 全量重跑：17 份一起重算（此前只跑过前 12 份，即高一 02—高一 09 与高一 a—高一 c），新增的五份（高一 12 / 13 / 14 / 15 / 17）由此带出 8 个题位的真题出处与 5 组跨卷同题，另补出旧卷漏检 3 条（高一 09 第 5 题、高一 05 第 19 题、高一 a 附加题第 2 题），合计 11 个题位。2026-09-15 已补跑高一 10（原 17 份 $\rightarrow$ 18 份、301 $\rightarrow$ 320 道、45,150 $\rightarrow$ 51,040 对）：本表、下面的同题表与真题出处表都已含它。高一 10 的 19 题在参考库里没有一道达同题线——最好的匹配只有 11–15 字的通用片段（如 集合 $M=1,2,3,4,5,6$ 、已知集合 $A=x|x^2-2x-3$ ），整段相似度都 ≤ 0.60 ；但它与库内两份卷比出两组逐字同题（见同题表末两行）。高一 16 / 高一 18 不计入：它们分

别与高一b/高一c同卷，重复计入只会造出成对的假同题。四份卷的**10道附加题**另见「附加题专查」一节（其中一道可确指校际试卷出处、一道连网络检索也落空）；另有若干**非高考但可考据到来源**的题，单列一节。2026-09-15的第二轮复核又用「**数字脱敏**」与「**自定义名词**」两路重扫，补出高一02第15题、高一09第15题、高一17第11题三条（都是判据捞不到的形态）。参考库题干数16,273（此前记16,176/16,180）是同一套content/**/*tex在不同去噪阈值下的读数。**2026-09-15**末又把高一19—高一21三份并入，做了**21份的全量重跑**：原18份320道→**21份369道**、跨卷51,040→**67,896对**。这一轮的变动分三块——①**三份新卷直接带出的**：逐字同题4对（02#6×21#10「伙伴关系集合」、06#5×20#4「 $ax^2+x+1=0$ 只有一个元素」、07#9×19#11「四个数字元素的集合」、09#13×19#8「六个关系式」）、同模板变体2组（17#11×20#16「数域」、17#7×20#15「条件判断」）、新出处1条（高一20第15题=2003上海卷（秋理））；②**改判据后翻出来的旧卷同题**：同模板变体2组（13#18×15附加19「 $x=m^2-n^2$ 」、06#7×17#9「填包含关系」）、逐字同题2对（07#10×a#13「特征数」、15#14×a#14，它们原先都在「手工补记」里）、把09第19题并入07/08/11那一组（3份→4份）；③**改判与剔除**：05第16题从逐字档移到变体档（05版漏「非空」、答案16与07/11的15不同），08第15题×19第7题回原图发现图形不同、从两档剔除。判据本身也修了两处（见「方法与局限」），故两档的组数、成员数与「真题出处」表都随本轮重排。**2026-09-16**又把高一22（七宝中学抱孩子练习9.15）并入，做了**22份的全量重跑**：原21份369道→**22份387道**、跨卷67,896→**74,691对**。这一轮只增不改，变动全部来自高一22本身——①**新出处3条**：高一22第11题=2011年大纲卷（文/理）、第13题=2010年辽宁卷（理）、附加19题=2006年湖北卷（理）（三条都是原题照录，详见「真题出处」表末三行）；②**该份在参考库里再无别的达线命中**（其余15题全部「无命中」）；③**跨卷同题与变体一档零新增**——逐字同题仍是24组、同模板变体仍是12组、两档成员仍是73道，高一22与库内21份一组都没比出来（同校的高一15抱孩子练习9.8与它也不例外）。三条新出处使「真题」由24道增到**27道**、对应关系由26条增到**29条**、题位由32个增到**35个**，其中**原题照录**由9条增到12条（改编15条、借定义/借集合2条均不变）。**2026-09-20**又把高一23（格致周末作业3）与高一24（复旦附中周末作业3）并入，做了**24份的全量重跑**：原22份387道→**24份419道**、跨卷74,691→**87,571对**。变动——①**新出处1条**：高一23第12题=2004年北京卷（秋文/秋理）（改编：机判先落在变体档，回原文复核确认同源——借真题题干与A、B两个选项，把问法由「一定成立的是」反转为「不成立的是」，C、D两项各改一处，答案由A变B，详见「真题出处」表末行）；②**高一24的15道在真题库里全部无命中**，高一23其余16道亦无达线命中；③**跨卷同题与变体一档零新增**——逐字同题仍是24组、同模板变体仍是12组、两档成员仍是73道，两份新卷与库内22份一组都没比出来。新出处使「真题」由27道增到**28道**、对应由29条增到**30条**、题位由35个增到**36个**（改编15→16，照录12、借定义2均不变）。**2026-09-22**又把高一25—高一28四份（华二·周末作业3、交附闵行·周练2、交附闵行·周末作业9.18、七宝·周末作业3）并入，做了**28份的全量重跑**：原24份419道→**28份488道**、跨卷87,571→**118,828对**。

变动——① **新真题 1 道**：高一 28 第 16 题 = **2013 年浙江卷（文）**（ $\wedge/\vee$ 两个自定义运算，**原题照录**：定义式、四个选项与答案 C 逐字相同， $r = 0.966$ ）；② **旧真题多出 1 个题位**：高一 25 第 16 题 = **2015 年上海卷（春）**（ $P_1/P_2/Q_1/Q_2$ 四集合版，**原题照录**——与高一 17 第 16 题逐字同题，但高一 17 那版 C、D 两项把真题的「存在 a 」印成了「对任意 a 」（原卷笔误），高一 25 这版与真题一致）；③四份新卷在真题库里**其余各题全部无命中**——机判另给出 4 条候选（高一 26 第 7 题 vs 2019 江苏卷、高一 26 第 8 题 vs 1999 上海卷（文）、高一 28 第 5 题 vs 2007 北京卷（理）、高一 28 第 18 题 vs 2007 上海卷（春）），**逐条回原文复核后都判为假命中**：共享的只是「 $B = \{x | x > 0\}$ 」「若 $A \subseteq B$ 求 a 的取值范围」「 $x^2 - 5x + 4 \geq 0$ 」「 > 0 」的解集为「 $(-\infty, \dots$ 」这类通用片段，题干的集合与问法都不相同；④ **跨卷新增 2 组逐字同题**（高一 12 第 9 题 $\times$ 高一 26 第 11 题——同一所学校前后两周作业用了同一道题；高一 17 第 16 题 $\times$ 高一 25 第 16 题，即上面的 2015 上海春考）与 **2 组同模板变体**（高一 04 第 15 题 $\times$ 高一 26 第 8 题、高一 15 第 6 题 $\times$ 高一 25 第 6 题）；另有一对（高一 13 第 14 题 $\times$ 高一 25 第 16 题）落在已有的上海春考那一组里，只把该组由 2 份扩成 3 份。以上使「真题」由 28 道增到 **29 道**、对应由 30 条增到 **32 条**、题位由 36 个增到 **38 个**（**原题照录** 12 $\rightarrow$ 14，改编 16、借定义 2 均不变）；逐字同题 24 $\rightarrow$ **26 组**、同模板变体 12 $\rightarrow$ **14 组**。

2026-09-23 又把高一 29（延安中学·周末作业 3）并入，做了 29 份的全量重跑：原 28 份 488 道 $\rightarrow$ **29 份 506 道**、跨卷 118,828 $\rightarrow$ **127,765 对**。这一轮只增不改，且新增的这一份 一处达线的命中都没有——① **真题零新增**：高一 29 的 18 题在真题库里全部无命中（最好的匹配只有十几个字的通用片段），故「真题」仍是 29 道/32 条对应/38 个题位；② **跨卷同题零新增**：逐字同题仍是 26 组、同模板变体仍是 14 组、两档成员仍是 79 道，高一 29 与库内各卷**一组都没比出来**；③唯一值得一笔的是**高一 29 第 19 题与高一 15 第 14 题、高一 a 第 14 题共用一个含参集合**（ $A = \{x | x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ ）——但另两卷的 B 、 C 与三小问都与它不同，题干相似度未到变体线（ $r < 0.71$ ），故**不列入问题表**，只在此备查；这也再次说明各校备课组用的是**同一批公共题源**（同一个含参方程在四份卷里出现三次）。

2026-09-25 又把高一 30（南洋模范中学·开学考）并入，做了 30 份的全量重跑：原 29 份 506 道 $\rightarrow$ **30 份 525 道**、跨卷 127,765 $\rightarrow$ **137,550 对**。变动——① **新真题 2 道**，两条都是**原题照录**：高一 30 第 4 题 = **2010 年安徽卷（秋文）** 填空（命题「存在 $x \in \mathbb{R}$ ，使得 $x^2 + 2x + 5 = 0$ 」的否定， $r = 0.909$ ）、高一 30 第 12 题 = **2019 年上海卷（春）** 填空（ $A = [t, t+1] \cup [t+4, t+9]$ 、 $0 \notin A$ 、存在正数 λ 使 $\frac{\lambda}{a} \in A$ ；**整题一字不差**， $r = 1.000$ 、最长公共子串 47 字）；②机判另给出 1 条候选（高一 30 第 19 题 vs 2017 北京卷（文）），回原文复核后判为**假命中**——**真题是** $A = \{x | x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$ 求 $\complement_U A$ ，本卷是 $x \geq 3$ 且三小问全不同，共享的只有「集合 $A = \{x | x < -2 \text{ 或 } x \dots$ 」这 12 个字；③ **跨卷新增 4 组逐字同题**（高一 11 第 20 题 $\times$ 高一 30 第 19 题、高一 15 第 6 题 $\times$ 高一 30 第 8 题、高一 22 第 5 题 $\times$ 高一 30 第 9 题、高一 25 第 12 题 $\times$ 高一 30 第 15 题），另有一对（高一 25 第 6 题 $\times$ 高一 30 第 8 题）落在已有的变体组里、把该组由 2 份扩成 3 份。以上使「真题」由 29

道增到 **31 道**、对应由 32 条增到 **34 条**、题位由 38 个增到 **40 个**（**原题照录** 14 → 16，改编 16、借定义 2 均不变）；逐字同题 26 → **30 组**，同模板变体仍是 **14 组**。

2026-09-26 又把高一 31—高一 36 六份并入，做了 36 份的全量重跑：原 30 份 525 道 → **36 份 626 道**、跨卷 137,550 → **195,625 对**。这六份是 9-25 一天内连发的六篇，产出比前几轮都多——① **新真题 5 道**（2009 天津卷（理）、2008 江苏卷、2012 浙江卷（理）、2004 湖北卷（文）、2010 福建卷（文）），共添 **7 条对应**：其中 5 条**原题照录**、2 条**改编**（高一 35 附加 17 题把 2009 天津卷那道由选择改填空；高一 36 第 3 题把 2004 湖北卷的 $x \leq 6$ 改成 5）；② **另有 1 条落在已有真题上**：高一 36 第 13 题是 2003 上海卷（秋理）的**第三个题位**（前两个是高一 17 第 7 题、高一 20 第 15 题）；③ **机判另给出 2 条候选，复核后判假命中**——高一 36 第 9 题 vs 2014 浙江卷（文）（真题讲的是平方和与平均值，与 $\frac{c}{a}$ 的范围无关）；高一 31 第 14 题与高一 35 附加 17 题虽同出 2009 天津卷（理），但一为选择、一为填空，判据把它们算作两条；④ **跨卷新增 7 组逐字同题**，另有一对（高一 08 第 15 题 × 高一 32 第 13 题）把既有的一组由 2 份扩成 3 份——这一组正是「题干一字不差但图形可能不同」的那类，已单独看图确认（高一 19 第 7 题图形不同，不计）。以上使「**真题**」由 31 道增到 **36 道**、对应由 34 条增到 **41 条**、题位由 40 个增到 **45 个**（**原题照录** 16 → 21、改编 16 → 18，借定义 2 不变）；逐字同题 30 → **37 组**，同模板变体仍是 **14 组**。

2026-09-27 又并入高一 37—高一 40 四份（连载 37—40）：36 份 626 道 → **40 份 701 道**、跨卷 195,625 → **245,350 对**。这一轮——① **新真题 3 道**（2009 重庆卷（理）、2010 四川卷（文）、2005 北京卷（春季·文/理）），共添 **3 条对应**：其中 **1 条原题照录**（高一 37 第 11 题 = 2010 四川卷（文），题干 $a > b > 0$ 与 $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 一字不差、答案同为 4，只去掉四个选项改填空）、**2 条改编**（高一 37 第 8 题把 2009 重庆卷（理）的右侧 $a^2 - 3a$ 换成 $|a - 3|$ 、选择改填空，答案随之由「 $a \leq -1$ 或 $a \geq 4$ 」变为「 $a \leq -1$ 或 $a \geq 7$ 」；高一 37 第 19 题把 2005 北京卷（春季）第 (1) 问的「精确到 0.1 千辆/小时」改成「保留分数形式」，其余分子 920、分母 $v^2 + 3v + 1600$ 与第 (2) 问全同）；② **机判另给出 1 条候选，复核后判假命中**：高一 40 第 9 题 vs 2012 福建卷（文）——真题是 $x^2 - ax + 2a > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立 ($0 < a < 8$)，本卷是 $x^2 - ax - 2 < 0$ 在 $(1, 2)$ 内恒成立 ($[1, +\infty)$)，除「恒成立，则实数 a 的取值范围是」这类套话外全不同。另：高一 37 第 8 题机判报出的公共串也是同类套话，但**同源证据在左侧的** $|x + 3| - |x - 1|$ （与重庆卷一字未动），故该条仍判**改编**而非假命中；**高一 38 全卷 17 题零命中**；③ **跨卷新增 6 组逐字同题**，另有 2 对把既有组各由 2 份扩成 3 份——新增的 6 组里有 4 组是 **高一 39 与家长拍照卷高一 a 的重题**（第 7 / 10 / 附加 2 题各一，加上充要条件与区间那组），另 2 组是高一 38 与高一 03 / 07 的（见同题表新增各行）；扩为 3 份的两组是「和谐集」（+ 高一 38 第 13 题，38 版另起名「平衡集」）与「特征数」（+ 高一 39 第 16 题）；**高一 37 与任何既有卷都不构成同题**（19 题一条都没比出来）。以上使「**真题**」由 36 道增到 **39 道**、对应由 41 条增到 **44 条**、题位由 45 个增到 **48 个**（**原题照录** 21 → 22、改编 18 → 20，借定义 2 不变）；逐字同题 37 → **43 组**，同模板变体仍是 **14 组**。

2026-09-28 又并入高一 41（上海中学·周练 2，连载 41）：40 份 701 道 → **41 份**

718 道、跨卷 245,350 → 257,403 对。这一轮一处达线的命中都没有，是「只增不改」的又一例（同 2026-09-20 的高一 23 / 24、2026-09-23 的高一 29）—— ① **真题零新增**：高一 41 的 17 题在真题库里全部无命中（最接近的只有「恒成立，则实数 a 的取值范围是」这类套话），故「真题」仍是 **41 道 / 46 条对应 / 54 个题位**（另有两条是同日下一段补登的）——见下面「2026-09-28 又...」那一段；② **跨卷问题零新增**：逐字问题仍是 43 组、同模板变体仍是 14 组、两档成员仍是 110 道，高一 41 与库内各卷**一组都没比出来**（同校的高一 31 周练 1 与它也不例外）；③ **补登两个此前漏登的题位**——这一轮顺核「逐字问题组的成员是否都进了真题出处表」才发现：**高一 39 附加 21 题**（与高一 a 附加 2 题逐字问题）= 2010 湖南卷（文）填空 7、**高一 32 第 13 题**（与高一 08 第 15 题逐字问题、**图形也一样**）= 1999 广东卷 / 全国卷选择 1。两者都不改道数 / 条数，只把题位由 50 补到 **52**、把 2010 湖南卷（文）从「两份用到」提为 **三份用到**、1999 广东卷 / 全国卷从「一份」提为**两份**。这两个题位当时机判都报过（高一 39 附加 21 题那条更是明写 出处 = 2010 年湖南卷（文） | 填空题），只是没人登记进表。

2026-09-28 同日又把①机判清单接进闸（起因是核「高一 35 / 高一 39 两份附加题在专记里是否齐全」）：先把 题目溯源.py ①「与高考库比对」的命中**落盘成** 工具 / 真题命中清单.txt (718 个题位一行)，再把**每个报过的题位**都摊开回原文判一遍——结果**新查出 2 道真题 / 2 条对应**：① **高一 20 第 8 题 = 2023 年全国乙卷（理）选择**（共用 $U = \mathbb{R}$ 、 $M = \{x | x < 1\}$ 、 $N = \{x | -1 < x < 2\}$ 这一对集合与「用交、并、补表示某个集合」的问法，只换所求集合， $r = 0.727$ 、LCS 22），判**借同一对集合另问**；② **高一 21 第 4 题 = 2009 年上海卷（秋文）填空**（真题 $A = \{x | x \leq 1\}$ 、 $B = \{x | x \geq a\}$ 、 $A \cup B = \mathbb{R}$ 求 a ，本卷把端点与字母对调，答案由 $a \leq 1$ 变 $a \geq 1$ ； $r = 0.912$ 、LCS 16），判**改编**。其余 **17 条判为不算**（只共用通用句式或某一个集合的取法），逐条记进新建的「**①机判报了、但未计入本表的题位**」表——以后每轮跑完①若多出一个报过的题位，计数核对.py 就会报错，逼人在这张表或出处表里 disposition，不再有「报了没人看」的余地。以上使「真题」由 39 道增到 **41 道**、对应由 44 条增到 **46 条**、题位由 52 个增到 **54 个**（**改编 20 → 21、借定义 / 借集合 2 → 3**，原题照录 22 不变）；逐字问题 43 组与变体 14 组不变。

本轮核对**发现并订正了 11 处**（都是核对过程本身查出来的，不是新发现而是纠错）：

1. **转录错误**：高一 08 第 15 题（1999 广东卷 Venn 图题）选项 A 误录为 $(M \cap P) \setminus S$ ，原卷是 $(M \cap P) \cap S$ —— 已改源码并重编两版。
2. **判定写错**：高一 a 第 11 题原判「改编（有序对 → 差集）」，但真题本身就是差集 $B = \{x - y | x, y \in A\}$ ，应判**原题照录**（差别只在四个选项的次序被倒过来）。
3. **描述不实**：高一 a 第 2 题原写「 U 少一个元素，问法改变」，实际问法未变，只是 U 由 $\{0, \dots, 9\}$ 改成 $\{0, \dots, 8\}$ （答案随之由 $\{7, 9\}$ 变为 $\{7\}$ ）。
4. **题号与计数**：三处题号（高一 03、高一 09、高一 c）先前按 \item 出现次序编号，与卷面的 \setcounter{enumi} 口径不符，已订正；「一级题干 230 道」「真题 15,932 道」两个数字同属口径错误，已改为 **211 / 16,180**。

5. **跨卷问题的判据与计数**：变体档阈值原写 0.74，却与表内最低那对（「全食／偏食」 $r = 0.7129$ ）自相矛盾，已改为 **0.71**；变体表原多出一行份数 1 的成员，使「7 组」与 8 行对不上，已删行、改由正文交代；又补上 4 对分数低于变体线、但逐条读过确属真问题的配对（见「判据之外手工补记」）。
6. **变体表里有 6 行的描述与成员原文对不上**（复核成员时逐条比对原始 .tex 才发现）：① 08 第 17 题的 P 实为区间 $(-2, 3)$ ，本行先写 $\{2, 3\}$ 、后照源码的错改成 $\{-2, 3\}$ （源码也错，见第 8 条）；② 09 第 17 题的 P 是「不等式 $x^2 - x - 6 < 0$ 的解集」，原写成「方程 $x^2 - x - 6 = 0$ 的解集」；③ 03 第 16 题的 A 是 $\{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$ ，原写成 $\{x \mid a < x < a + 3\}$ ；④ 05 第 7 题的 A 是 $\{x \mid x \geq -1\}$ ，原行标题却按 c 第 5 题的 $\{x \mid 1 < x < 2\}$ 写（且 c 第 5 题实为 $1 \leq x \leq 2$ ）；⑤ 02／05 第 17 题原写「小问不同」，实则只 (1) 问不同，(2) 问两版**完全相同**（同为 $A \cup B = A$ 、答案同为 $(-\infty, -3]$ ）；⑥ 三行的「变在哪」漏了条件，已补出实际的 $\cup$ 、 $\cap$ 、 $\emptyset$ 、 $\subset$ 。六行的「题目」「变在哪」两栏已按原文重写。
7. **高一 05 第 17 题两处转录错误**（对着原卷图片逐字比对时才发现）：① (1) 问原卷作「 B 为单元素集合」，本稿误抄成「 B 为单元集集合」；② 答案 (2) 原卷作 $(-\infty, -3]$ ，本稿误抄成 $(-\infty, -3)$ ——本稿自己的解析写的就是 $(-\infty, -3]$ （ $a = -3$ 时 $B = \{2\} \subseteq A$ 也成立），即解析对、\ans 错。已改源码并重编两版。
8. **高一 08 第 17 题的 P 抄成了 $\{-2, 3\}$** ：原卷印的是开区间 $(-2, 3)$ 。源码自己的解析就是按开区间做的（ $a + 1 < 3$ 、答案 $[-\frac{2}{3}, +\infty)$ ），是题干抄错。已改源码并重编两版。
9. **高一 06 填空题漏了起始偏移**：原卷填空从第 3 题编到第 11 题（1、2 未印在本卷），本稿漏写 `\setcounter{enumi}{2}`，于是印成 1-9，而解答题又按原卷印成 12-14，卷面凭空多出「10、11 缺号」。同批 8 份（02／03／04／05／07／08／09／11）都有这一行，只高一 06 漏了。已补上并重编两版——受此影响，本 README 里高一 06 的题号整体 +2（孤立元 7→9、全食／偏食 9→11、 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$ 那题的 1→3）。
10. **高一 05 第 10 题的答案端点抄错**：原卷解析得 $a < -4$ 或 $2 < a$ ，本稿的 \ans 与「综上」都写成 $a < -4$ 或 $a \geq 2$ —— $a = 2$ 时 $B = [4, 5] \not\subseteq A = (-\infty, -1) \cup (4, \infty)$ ，故原卷为是。已改源码并重编两版。
11. **高一 07 第 10 题的「特征数」抄错**：原卷作「最大值与最小值之和」，本稿抄成「之差」——原卷解析「 $A_1 = \{1, 2, 3, 12\}$ ，则 $A_1 = 13$ 」（ $= 12 + 1$ ，原卷此处把 X_1 误印成 A_1 ，本稿按 X_1 规范并加注）可证为「之和」。这个抄错一度让本 README 误判该对「差／和不同」（见第 6 条附近的手工补记）。已改重编。

以上 11 条是溯源核对那一轮（12 份）的记录。2026-09-15 又对新入库的五份（高一 12／13／14／15／17）做了一轮**整卷回原图**核对（41 张图逐张放大比对），另查出 **5 处转录错误**，清单见文末「9 月中旬五份专记」里的回原图复核表。

2 回原图逐题核对（2026-09-15 起，按批推进）

页级核对（已全部完成）：把公众号原文的图片逐张下载，与 原图/ 里归档的文件比对——有原文链接的现为 **38 份 / 320 张**（高一02—高一09 与高一10—高一15、高一17，加最后入库的高一19—高一41），其中最早一轮逐张核过的是 **13 份共 95 张，张数、顺序、逐张 MD5 全部一致**；其余二十五份不在那一轮内（高一12 交附闵行 11 张、高一10 复附浦东 9 张、高一19 延安 6 张、高一20 进才 9 张、高一21 上师大宝山 6 张、高一22 七宝 7 张、高一23 格致 5 张、高一24 复旦附中 7 张、高一25 华二 10 张、高一26 交附闵行 10 张、高一27 交附闵行 7 张、高一28 七宝 11 张、高一29 延安 6 张、高一30 南模 11 张、高一31 上海中学 10 张、高一32 华二 10 张、高一33 交附闵行 13 张、高一34 交附闵行 7 张、高一35 七宝 12 张、高一36 格致 6 张、高一37 七宝 10 张、高一38 大同 12 张、高一39 大同 11 张、高一40 大同 4 张、高一41 上海中学 15 张——后二十四篇都是当时下载所得，原图/ 里的就是下载原件本身；**高一37—高一41 五份里，高一37、高一38 与高一41 是「同一篇里各页分辨率不一致」的又一例**（高一37：第 3、4、6 页 4762×6735 ，其余 7 页 2560×3620 ；高一38：第 1、10、11、12 页 2560×3620 ，第 2—9 页 4762×6735 ；高一39 亦混排；高一40 的 4 张清一色 4762×6735 ；**高一41：第 2、3、4、6、8、11、12、13、14 页 4762×6735 ，第 1、5、7、9、10、15 页 2560×3620** ）；高一22 的 7 张另有两点与前几份不同：一是**同一篇里各页分辨率不一致**——第 1、2、4、6 页 4762×6735 ，第 3、5、7 页 2560×3620 （已逐页打开确认，非下载缺档）；二是这一份取的是 `mmbiz.qpic.cn/<hash>/0` 的原图（ 4762×6735 那一档，与高一20/高一21 同档），比早期入库的几份清晰——高一02、高一15 那一批的 原图/ 是 1080×1527 的窄幅档）。**高一25—高一28 这四份又回到 1080×1527 那一档**（四篇各页同尺寸，与高一23/24 同档）。高一a—高一c、高一16 与高一18 是家长拍摄的作业照片（后两者的原图是 高一b/高一c 同一组照片的副本），不适用这一路。这一步只能证明「纸面都搬进来了」，逐题逐字是否转录完整另见下表。

逐题核对（每卷都逐页读原图，比对题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析全文）。到 **2026-09-28** 为止，除 高一16/高一18 两份「对号副本」外，**41 份卷子都过了一遍独立于转写的回原图逐题核对**——工作分几批推进：下表前 12 行（高一02—高一09、高一a—高一c 与高一11，分四批）；另五份（高一12/13/14/15/17）的**整卷回原图核对**（41 张图逐张放大比对）在时间上更早，清单见文末「9 月中旬五份专记」里的回原图复核表；高一25—高一28 于 2026-09-22 独立做过一轮、高一29 于 2026-09-23、高一30—高一36 于 2026-09-26、高一37—高一40 于 2026-09-26（另一名 worker 只读原图）、高一41 于 2026-09-28 各做过一轮（后几轮见下表相应各行）。

2026-09-26 这一轮补的是最后一批「只有转写、没人复核过」的卷子：高一10 与高一19—高一24 七份入库时都是「转录时逐页回对」，此后一直没有独立核对（下表里原先写着「暂无独立于转写的第二轮回原图复核记录」）。这一轮给七份各派一名 worker、只读原图、不给它看既有结论，并额外要求**逐题独立验算答案**。结果：**七份全部查出问题——**

卷	这一轮的发现	处理
高一 10	第 10 题【解析】原卷「这个元不是…」漏「素」字（本稿当初已补字，但文件头误称「未作订正」）	保留补字、登记进文件头（注释）
高一 19	1 处真转录错误：第 12 题【解析】末句原卷是 $0 \in \overline{A}$ ，本稿漏抄上横线（且文件头误把它记成原卷问题）	订正并重编
高一 20	第 21(3)【解析】原卷作 $\overline{B} \cap A$ 、题干作 $\overline{A} \cap B$ ，本稿当初统一成题干的写法	恢复原卷次序并重编
高一 21	第 8 题②分支原卷作「当 $B \neq \emptyset$ 时，则 …」，本稿漏「则」	补字并重编
高一 22	无转录错误；四处「原卷存疑」逐处核实吻合，另新查出第五处原卷问题（第 14(2) 分析与答案的区间开闭矛盾）	加注、存疑改五处（注释）
高一 23	无转录错误；新查出三处原卷自身问题（取等条件、第 11 题答案、第 15(2) 答案漏负号）	加注（注释）
高一 24	第 14 题题干原卷把「 $= 0$ 」印在花括号外、其解析却印在括号内	保留修正并登记（注释）

七份的答案（共 123 道：19 + 18 + 20 + 16 + 18 + 17 + 15）都逐一验算过、无一处与解析矛盾；高一 19 的 3 张韦恩图与高一 24 的三圆图也逐张与原卷比过（后者用二值化 mask 比出 IoU $\approx$ 0.91），另四份（高一 10 / 20 / 21 / 22）经核对确认全卷无插图。

卷	原图/题数	核对结果
高一 02	8 张 / 17 题	无转录错误。唯一差异是第 18 题【解析】原卷把第 (2) 问印成「(3)」(原卷跳号)，本稿按题干口径规范为 (2)，已加注
高一 03	6 张 / 16 题	3 处解析转录错误，均已订正重编：①第 10 题【解析】多写一对「 S_3 和 S_5 不能同时取数」(原卷只列 $S_1S_6 / S_2S_5 / S_3S_4$ 三对，且 $3 + 5 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$ ，本可同时取)；②同题末句原卷作「和 S_0 中的一个」，本稿误作「 S_6 」；③第 18(3)【解析】等号左端首项原卷作 $\frac{1}{x-1}$ ，本稿误作 $\frac{1}{x}$

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一04	3 张 / 14 题	2 处实质错误 + 2 处记号差异 ，均已订正重编：①第 3 题题干原卷作「 $y = \frac{12}{3-x} \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{Z}$ 」，本稿把 $\in \mathbb{N}$ 挂到了 x 上（那样只能得 $\{4, 6, 12\}$ ，与本稿自己的答案冲突）；②第 7 题【答案】原卷作「 $A \subset B$ 」，本稿抄成「 $A \supsetneq B$ 」——方向反了；③第 6 题【答案】、④第 16 题 (2) 的 $\subset$ 本稿原写作 $\subsetneq / \subseteq$ ，已按原卷记号改回
高一05	9 张 / 18 题	16 处 （题干/选项/答案 3、解析 13），均已订正重编。题干/选项/答案：①第 19 题题干性质 M 中 $x_i x_j$ 与 $\frac{x_j}{x_i}$ 的分式被抄成 $\frac{x_i}{x_j}$ ——方向反了；②第 20 题记号 N_+ 写成 $\mathbb{N}^*$ ；③第 15 题的选项 B、选项 D 与【解析】末句三处把「开左闭右」的 $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ 抄成 $[\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$ （开闭抄反）——与它自己第①步解出的「 $\frac{4}{3} < m \leq \frac{5}{3}$ 」自相矛盾（2026-09-15 复核题号时补出）。解析（集中在第 4、5、9、11、19、20 题）：第 4 题末项丢负号（ $-\frac{5}{2}$ 抄成 $\frac{5}{2}$ ）；第 5 题把原卷「两个方程组用『或』并列」抄成一个三层嵌套的 cases；第 9 题把原卷「集合 $\overline{B}$ 中含 1、5」改写成「集合 B 不含 1、5」（两句等价，按原卷录回）；第 11 题两处「一元一次方程」抄成「二元一次方程」；第 19 题解析 5 处——下标 x_1 / x_2 抄成 i / j 、 $x_1 \geq 1$ 抄成 $x_2 \geq 1$ 、 $x_i \cdot x_5 > x_5$ 抄成 $> x_i$ 、 $\frac{x_5}{x_i}$ 抄成 $\frac{x_5}{x_1}$ 、 $x_3 x_4 > x_2 x_4 = x_5$ 不等号写反且漏一句（末两行不等式链整个走样）；第 20 题解析 5 处—— 0 ± 0 抄成 $0 + 0$ 、不等链末项 $a_3 - a_1$ 抄成 $a_2 - a_1$ 且 $a_3 - a_2 = a_2$ 抄成 $a_3 - a_3 = a_2$ （后者会使 $a_2 = a_3 = 2026$ ，与本卷答案 $a_2 = 1013$ 冲突）、三处下标 $n - i$ 抄成 $n - 1$ 、展开式首项 $(a_n - a_n)$ 抄成 $(a_n - a_1)$

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一06	4 张 / 12 题	10 处 (题干/答案 3、记号 1、题号口径 1、解析 5)，均已订正重编：①第 3 题【答案】漏 $a = 1$ (原卷作「0, 1, -1」, $a = 1$ 时 $B = \{1\} \subseteq A$)；②第 4 题题干把 $\in \mathbb{Z}$ 挂到了 x 上 (原卷作 $A = \{x \in N \mid y = \frac{12}{x+3} \in Z\}$, 即「$y$ 是整数」)；③第 7 题题干与【答案】的 $\subset / \supset$ 照原卷改回 (本稿原写作 $\subsetneq / \supsetneq$)，其解析方向也是反的 (本稿作「$T \subseteq S$, 故 $S \supsetneq T$」, 与本题答案 $\subset$ 自相矛盾)；④文末「参考答案」块原从 1 起编, 与卷面第 3—14 题错位, 已补 <code>\setcounter{enumi}{2}</code>；⑤解析：第 11 题 $B = \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$ 丢负号 (原卷此句还把 $A \cap B \neq \emptyset$ 印成 $= \emptyset$, 已加注)、第 13 题题干漏「其和」且解析首段被压缩成一句 (已按原卷补回)、第 14 题两小问漏了原卷的「(给出结论即可)」 「(需说明理由)」, 其 (2) 解析末句「相异正整数」抄成「正非零整数」

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一-07	11 张 / 19 题	13 处（按源码里的 % 注计：漏排整图 1、原卷笔误加注 2、转录错误 10；其中第 16 题一处含 4 个错点，合并为 3 条注），均已订正重编：①第 14 题解析原卷印有一张韦恩图（A 独 5、B 独 5、三集合公共 10、$A \cap C$ 独 4、$B \cap C$ 独 4、C 独 2、三集合之外 10），本稿此前漏排此图而正文仍作「如图」，已按原卷截图补入 (figures/venn_50_ABC.png)；②第 16 题：差集记号 $A \setminus B$ 抄成 $A \vee B$、C 描述里的待填横线抄成 $\vee \vee$，选项 D 的 $\mathbb{C}_{\mathbb{N}}$ 抄成 $\emptyset$、$\mathbb{C}_{\mathbb{N}} C$ 抄成 $C \setminus C$，同题解析里两处 $\mathbb{C}_{\mathbb{N}}$ 抄成 $C \setminus$；③第 12 题解析「得 $x_2 = -\frac{3a}{2}$」漏掉负号（本稿写成 $\frac{3a}{2}$）；④第 20 题【答案】漏 $\frac{3}{4}$（与本稿自己的解析结论不一致）；⑤第 11 题② $c \notin M$ 抄成 $c \in M$（那样②为假，与本卷答案①②③冲突）、第 19 题定义 $2 - x^2 \notin D$ 抄成 $\in D$（那样 $E = \emptyset$，与答案 -5 冲突）、第 20 题解析 $xy = 0 \in D$ 抄成 $\notin D$、第 21 题解析上界 $x_4 - x_3 < x_4$ 抄成 $< x_3$，其第 (3) 问不等式链抄乱且首项 $a_1 - a_1$ 抄成 $a_i - a_1$；⑥第 10 题原卷自身把 $X_1 = 13$ 印成「$A_1 = 13$」、第 18 题原卷子集列举印成 $\{0 - 4\}$（两处均为原卷笔误，按文意规范并加注）

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一08	9 张 / 19 题	1 处漏排整图 + 5 处转录错误 （源码内 5 条 % 注，其中第 11 题一条含 3 个错点、另有 1 条是分页说明），均已订正重编：①第 15 题原卷印有一个韦恩图（全集 I 、 M 与 P 两圆相交、 S 为含于 P 的小圆、阴影为 $(M \cap P) \setminus S$ ），本稿 漏排此图而题干仍作「如图」 ，已按原卷截图补入（figures/venn_MP_minus_S.png）；②第 6 题解析原卷作「所以 $3 \in C$ ， $2 \notin C$ ， $-4 \notin C$ 」，本稿把 $2 \notin C$ 抄成 $2 \in C$ —— 与题干 $A \cap C = \varnothing$ 及 $2 \in A$ 直接矛盾 ；③第 11 题题干原卷作「集合 $E = \{0, 1, 2, \cdots, n\}$ 的子集 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 」（原卷上标用 n 、下标用 m ，本身不统一），本稿把上标也写成 m ；④同题解析原卷作「 $211 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^1 + 2^0$ 」（本稿写成 2^2 ，那样和为 213）；⑤同题【答案】原卷作 $\{0, 1, 4, 6, 7\}$ ，本稿漏掉 7（作 $\{0, 1, 4, 6\}$ ，仅 83）；⑥第 17(1) 题解析原卷的方程组含三行「 $3a \geq -2$ / $a + 1 < 3$ / $3a < a + 1$ 」，本稿略去了末行
高一09	8 张 / 20 题	1 处漏排整图 + 2 处转录错误 ，均已订正重编：①第 16 题原卷印有一个韦恩图（全集 U 、相交的椭圆 A 与 B 、阴影为 $A \cup B$ 之外），本稿 漏排此图而题干仍作「如图」 ，已按原卷截图补入（figures/venn_U_minus_AB.png）；②第 9 题解析②原卷作「但 $-1 + \sqrt{3} \notin \{x \mid x = t^2, t \in M\}$ 」，本稿把 $\notin$ 抄成 $\in$ ——那样②反而与 M 相等，与同句「即②与集合 M 不相等」自相矛盾；③第 12 题题干原卷作「 高一 的同学发现……」（逐字放大后「高一」与「的」之间只有常规字距，无班号），本稿写成「高一（13）班的同学发现」，已按原卷删去「（13）班」
高一 a	4 张 / 17 题	无转录错误 。这一份是家长拍摄的学生作业照片，逐页比对后题干、选项、分值行、附加题编号与卷面笔色分工（黑笔学生作答 / 蓝笔教师订正 / 红笔打钩 ×）全部与 % 注记录一致；卷面 10 处学生错答与教师的蓝笔订正也逐处核对无误（清单见文末「高一 a 专记」）

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一b	4 张 / 21 题	无转录错误。 三处已知差异（第 11 题的答案取 5 而非学生所写的 10、第 13 题原卷漏排「 $A =$ 」、第 16—18 题的作答区）与卷首两处排版差异（原卷未印分节标题与分值、本稿补「2026--2027 学年度」前缀与校名「大同中学」）均已在 % 注与「高一b 专记」写明，本轮逐页放大复核无误；第 4 题的韦恩图与 figures/venn_AB_complement.png 一致（阴影在 $A \cup B$ 之外，与【答案】 $\overline{A \cup B}$ 相符）
高一c	4 张 / 19 题	无转录错误； 只有 1 处非题面标签：第 17 题题号后原卷印有一个虚线框小标签「手批」（全卷仅此一处，疑为标注该题由教师手批），本稿不排，已在卷首 % 注与源码内写明。第 5 题的 $\subset$ （无下划线，即真包含，答案 $(2, +\infty)$ ）与同卷第 9、13 题的 $\subseteq$ 本轮再逐处放大比对，确认两者在卷面上确有区别；第 1、2、6、9、10、11、12 题与选择 13—16 的题干、选项、答案亦与卷面逐字一致
高一11	7 张 / 19 题	无转录错误。 四处原卷笔误（第 10 题【解析】①③的「为真命题」、第 19(1) 的 $\{0 - 4\}$ 、第 19(2) 的 $a^2 - 1 = -4 \times (-4)$ ）与三处排版口径（答案直接印在题下、第 14 题的答案「D」更是印在题干括注里、实数集 R 与 $\mathbf{R}$ 混用）均已在卷首 % 注与「高一11 专记」写明，本轮逐页放大复核无误；第 21(3) 的 $\subset$ 与第 10②、12、17、19、20 题的 $\subseteq$ 也逐处放大确认；第 6 题的韦恩图与 figures/venn_A_minus_B.png 一致（阴影为 $A \setminus B$ ，与【解析】 $A \cap \overline{B}$ 相符）

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一10	9 张 / 19 题	新入库（本次转写） 。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析逐页照原卷录入（沿用同一学校的高一11的体例）；转写时逐页放大比对过一遍， 未发现原卷笔误 ——题 16 的 $1995 = 15 \times 133$ 与「 15^2 的倍数有 8 个」两处最易被误判为笔误，实测 133、8 均正确。 第二轮 （2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：19 题答案逐一验算一致；查出 1 处 ——第 10 题【解析】首句原卷作「这个元不是 1 就是 m 」（「元素」漏了「素」字），本稿当初补了「素」字却在文件头写着「未发现笔误、未作任何按文意的订正」，自相矛盾；已按高一 b 第 13 题「原卷漏排、本稿补上」的先例保留补字，并把该处登记进文件头的笔误清单、加行内注（注释改动，未重编 PDF）。全卷 9 页无图
高一16	4 张 / 21 题	与 高一 b 同卷（源码逐字相同），故不另做一轮核对——上表 高一 b 那一行的结论直接适用于本卷。两卷只差卷面标题的「(补)」二字（已用 pdftotext 逐行比对确认）
高一18	4 张 / 19 题	与 高一 c 同卷（源码逐字相同），同上不作独立核对。两卷只差卷面标题的「(补)」二字（已用 pdftotext 逐行比对确认）

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 19	6 张 / 18 题	新入库（本次转写）。填空 3—13、解答 14—20，题干、\ans 与 \ifanswer 解析逐页照原卷录入；转写时逐页放大比对了题干、答案与解析全文，并单独核过三张韦恩图（第 4、6、7 题）的裁剪范围与阴影（第 4 题的图原卷印在【解析】右侧，故入答案版；第 6、7 题是题干图，两版都排——三张都取自原卷截图、4× LANCZOS 放大）。原卷存疑三处已照录加注：第 11 题「已知一个有四个数字元素的集合 S」、第 16(1) 结论「a 的值为 $5\sqrt{-3}$」（「$\sqrt{}$」应是顿号）、第 12 题【解析】末句「同理当 $0 \in A$ 时」（按文意应为 $0 \notin A$，但卷面字形确为 $\in$、无斜杠）。第二轮（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍（含 3 张插图逐张比对、18 题答案逐一验算）：查出 1 处真转录错误——第 12 题【解析】末句原卷是 $0 \in \overline{A}$（A 上有横杠），本稿漏抄了；更麻烦的是文件头那条「原卷存疑③」把本稿的漏抄误记成了原卷问题（还写着「卷面字形确为 $\in$、无斜杠」）。已按原卷补回上横线、删去该条存疑（清单改回两处）并重编

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 20	9 张 / 20 题	新入库 (本次转写)。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，逐页照原卷录入。订正原卷笔误两处：①第 13 题【解析】印作「所以 AD 错误，B 正确」「故选 B」，与同句「a 为奇数、b 为偶数 $\Rightarrow a + b$ 为奇数」自相矛盾 ($a + b$ 为奇数就该落在奇数集 A 里)，按文意订正为「BD 错误，A 正确」「故选 A」；②第 20(5) 的【解析】原卷误标为「(2)」(同卷 (2) 的解答另有其文)，按小问编号规范为 (5)。另第 14 题题干印「则下列四个命题」而其后列了①—⑤五条，照录加注。本卷无插图。第二轮 (2026-09-26) 由另一名 worker 独立核过一遍：20 题答案逐一验算一致；两处原卷笔误的订正 (第 13 题答案 AD$\rightarrow$BD、第 20(5) 误标 (2)) 经它放大复核，确认「改得对、没改过头」；查出 1 处——第 21(3)【解析】原卷印 $\overline{B} \cap A = \emptyset$，而题干的 (3) 问印 $\overline{A} \cap B = \emptyset$ (原卷自己次序不一致，两者因交集可交换而等价)，本稿当初统一成了题干的写法；已恢复原卷解析的次序并加注、重编
高一 21	6 张 / 16 题	新入库 (本次转写)。填空 3—11、解答 12—14 (末题原卷标「(选做题)」)，逐页照原卷录入。第 11 题的【答案】原卷印在【解析】末句 («综上所述，以上正确的命题是②④»)，本稿按全稿惯例另提为 $\text{\textbackslash ans\{}}$；第 14(1)【解析】首句原卷连用两个「因为」，照录加注。第 9 题的 $\subset$ (真包含，与解析「真子集个数 $2^8 - 1 = 255$」自洽) 与第 11④的 $\subseteq$ 逐处放大确认确有区别。本卷无插图。第二轮 (2026-09-26) 由另一名 worker 独立核过一遍：16 题答案逐一验算一致；查出 1 处漏字——第 8 题②分支原卷作「②当 $B \neq \emptyset$ 时，则 ...」，本稿漏了「则」(同卷第 12 题同位置的「有」是保留的，故确属漏字、不是全稿统一省略)，已补并重编。它另把 9 处 $\subset / \subseteq$ 与 cases 逐行核对过，并逐段数了原图行数 vs $\text{\textbackslash step}$ 条数、未发现去重

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 22	7 张 / 18 题	新入库 (本次转写)。填空 3—10、选择 11—13、解答 14—16、附加题 17—20，逐页照原卷录入。原图是 4762×6735 / 2560×3620 两档高清图，逐段裁开放大后比对了题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析全文。原卷存疑四处已照录加注：①第 8 题【解析】方程组第三行印成 $x_1 + x_2 = a > 0$ (前两行已用过 $x_1 + x_2$，按两根为正数的判据此处应为两根之积 x_1x_2)；②第 15 题题干的 B 与原卷自己的答案、解析对不上 (题干 / 答案 / 解析三处互相矛盾，已把三处都 4× 放大逐字核对)——题干印 $B = \{(x, y) \mid x = n, y = n^2 - n + a + 1\}$，按此则 $A \cap B$ 要在 $m = n$ 时满足 $3m + 1 = m^2 - m + a + 1$、即 $m^2 - 4m + a = 0$：(1) 取 $a = 1$ 时无整数解、$A \cap B$ 应为 $\varnothing$，(2) 的正整数解只有 $a = 3$ 或 4；而原卷 (1) 的答案作 $\{(0, 1), (4, 13)\}$、(2) 的解析把 B 改写成 $y = a(x^2 - x + 1)$ 后得 $a = 1$ 或 4。只有把题干那处读作 $y = a(n^2 - n + 1)$ 才能同时解释答案与解析 (此时 $3k + 1 = k^2 - k + 1 \Rightarrow k = 0, 4$，且 $a = \frac{3x+1}{x^2-x+1}$ 在 $x = 0, 1, 4$ 上取 1, 4, 1)；若读作 $y = n^2 - n + a$，则 (1) 合、(2) 变成 $a = 3, 4$；③第 16(3) 的【解析】误标为「(2)」；④第 18 题题干印「已知实数 $M = \dots$」(应为「集合」)。本卷无插图 (已全卷检索确认无「如图」)。第二轮 (2026-09-26) 由另一名 worker 独立核过一遍：18 题答案逐一验算一致；四处「原卷存疑」逐处放大核实，全部与原稿记载相符 (第 15 题那条「唯一能同时解释答案与解析的读法是 $y = a(n^2 - n + 1)$」也被它独立复算证实)，源码是忠实照抄；另新查出第五处原卷问题——第 14(2)【解析】的分支条件是严格的 ($3m - 1 > -m$ 即 $m > \frac{1}{4}$ 时 $B \subseteq A$ 成立，$m \leq \frac{1}{4}$ 时无解)，末行答案却印成闭区间 $\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$，按它自己的分析应为开区间 (已 3× 放大确认末行左侧确是方括号)。已加注、文件头的存疑清单由四处改为五处 (注释改动，未重编 PDF)

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 23	5 张 / 17 题	第一轮（转写时逐页回对）之后一直没有独立核对，2026-09-26 才补上：17 题的题干、选项、\ans、\ifanswer 逐句比对一字不差，各题答案也逐一验算通过（含第 12 题那道 2004 北京卷改编的答案 B）——未发现转录错误。但它查出的三处原卷自身问题推翻了该卷文件头原来那句「本卷未发现原卷笔误或存疑处」，已按「照录 + 加注」补记：①第 10 题【解析】的取等条件印作 $x = 3y = 3z = \frac{3}{7}$，按 $7M \geq x + 3y + 3z$ 取等需 $M = x = y = z$（即 $x = y = z = \frac{3}{7}$），终值 $\frac{3}{7}$ 无误、是书写自相矛盾；②第 11 题原卷答案标 C，而取 0、1、-1 时三数之积为 0、0、-1、并不存在「两数之积为正数」，不正确的应是 D；③第 15(2) 答案印成 $\left(\frac{1}{4}, +\infty\right)$，由 (1) 的 $b = \frac{7}{8}a$、$a > 0$ 代入应为 $\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$（原卷漏了负号）。三处均已加注（注释改动，未重编 PDF）
高一 24	7 张 / 15 题	第一轮（转写时逐页回对）之后一直没有独立核对，2026-09-26 才补上：填空 3—10、选择 11—13、解答 14—17 逐句比对，只查出 1 处——第 14 题题干原卷把「= 0」印在右花括号之外（$A = \{x \mid x^2 - mx + 4m - 16\} = 0$），而它自己的【解析】却印在括号之内（原卷前后不一致）；本稿当初跟了解析，按高一 b 第 13 题「原卷漏排 $A =$、本稿补上」的先例保留修正，并补了行内注与文件头「排版差异⑧」。唯一插图（第 11 题三圆图）用二值化 mask 与原卷比对，IoU≈0.91、未镜像、A 左上 B 右上 C 正下，与答案 A 相符；全卷 7 页仅此一图。第 15(2) 的原卷笔误（$+\frac{b}{a}$ 印成 $-\frac{b}{a}$）经放大核实确系原卷如此（注释改动，未重编 PDF）

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 25	10 张 / 19 题	无转录错误 (2026-09-22 独立于转录的第二轮逐题核对)。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21, 题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析逐页照原卷录入。原卷存疑两处已照录加注: ①第 8 题【解析】「当 $\Delta = a^2 - 16 > 0$ 时...有两个相同的根」($\Delta > 0$ 应为「不相同」, 其自己的后文就把 x_1、x_2 当不同的两根在讨论); ②第 11 题【解析】先写 $m、n \in \mathbb{N}^*$, 下一行又写「$0 \leq m \leq 10, 0 \leq n \leq 10$, 共有 121 种」(按 $\mathbb{N}^*$ 应从 1 起, 至多 100 种; $121 = 11 \times 11$ 含 0)。第 17 题的 Venn 图取自原卷截图 4× 放大 (figures/venn_Abar_cap_B.png, 阴影为 $\overline{A} \cap B$), 原卷印在题干右侧、本稿移至题干之后
高一 26	10 张 / 19 题	3 处转录错误 (2026-09-22 第二轮核对查出), 均已订正重编: ①第 13 题选项 C 的补集下标原卷作 $\mathbb{C}_U$, 本稿误抄成 $\mathbb{C}_I$ (放大 16× 与图中全集标号比对后确认是斜体 U); ②第 20(2) 题【解析】原卷作真包含的 $B \subset \mathbb{C}_R A$, 本稿抄成带下划线的 $\subseteq$ (同页 21(2) 的 $\subseteq$ 多一条横杠, 对比清晰); ③第 12 题【解析】三处原卷作 $\frac{8}{5} \leq t \leq 2$, 本稿统一改成 $t < 2$——改完与同题末行答案 $\left(\frac{9}{5}, 2\right]$ 自相矛盾 (该答案含 2)。原卷自身矛盾一处已照录加注: 第 12 题【解析】首步的方程组里原卷印 $t < 2$, 与它后面三处及末行答案的 $t \leq 2$ 对不上 (按题意 $t = 2$ 时 $N = \left[\frac{7}{5}, 2\right]$ 确含于 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 故应为 $t \leq 2$)。第 13 题的 Venn 图取自原卷截图 4× 放大 (figures/venn_ABC_lenses.png, 阴影为 $(A \cap B) \cup (B \cap C)$), 原卷印在题干右侧、本稿移至题干之后

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 27	7 张 / 12 题	无转录错误 (2026-09-22 第二轮核对)。本卷只有「一、填空题」「二、解答题」两节、无选择题：填空 3—10、解答 11—14，逐页照原卷录入； $\subset$ (第 7、10 题解析) 与 $\subseteq$ (第 11(2)、12(2) 题) 逐处放大确认、 $\overline{A} / \complement_R$ 两种补集记号照录无误。核对时另发现 文件头两处注释列得不齐 ，已订正（真包含的 $\subset$ 除第 7 题解析外第 10 题解析也有两处； $\complement_R$ 只在第 11 题出现、第 12 题全题无补集符号）——注释订正不影响正文，故未重编 PDF
高一 28	11 张 / 19 题	无转录错误 (2026-09-22 第二轮核对)。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21。原卷第 3—6 题只印【答案】行、第 7 题起印【解析】，本稿统一改为试卷版隐去、答案版以 <code>\ans{}</code> <code>/\ifanswer</code> 给出。 原卷存疑一处 已照录加注：第 17(2) 题【解析】由 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$ 、 $A \cap B = \{x \mid 1 < x \leq 3\}$ 推出 $B = [1, 3]$ 、 $a = -4$ 、 $b = 3$ ——但 $B = [1, 3]$ 时 $A \cup B = (-2, -1) \cup [1, +\infty)$ 并非 $\{x \mid x > -2\}$ ；按题设应有 $B = [-1, 3]$ (即 $a = -2$ 、 $b = -3$)，原卷答案显系错误。本卷无插图（全卷检索确认无「如图」）

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 29	6 张 / 18 题	无转录错误 (2026-09-23 独立于转写的第二轮回原图核对)。填空 3—12、选择 13—14、解答 15—20 (末题是证明题), 逐页照原卷录入; 转写与复核两轮都逐页放大比对了题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析全文 (原图第 2、3 页 4762×6735, 第 1、4、5、6 页 2560×3620)。第二轮复核按全稿查出过错的五类逐处放大核对: 全卷 10 处多行 cases (第 8、10、12、13 题解析、第 14 题的定义 2 处与解析 4 处、第 18(2) 题)、补集记号 (第 14①与第 16 题的 $\overline{B}$、第 14 题解析的 $C_U B$——下标放大到 16× 与题首全集 U 比对, 两竖并列为斜体 U)、$\subset$ 1 处与 $\subseteq$ 10 处 (第 4 题题干的 $\subset$ 与 $\subseteq$ 并列、第 13 题解析、第 14②及其解析、第 17 题题干与解析)、以及答案与解析是否自相矛盾 (第 6、13、14、16、17、19 题的 \ans 与解析结论逐一对照), 均与卷面一致。原卷存疑三处已照录加注: ①第 6 题【解析】自相矛盾——推出 $m \leq 2$, 结论却写 $[2, +\infty)$; ②第 14 题解析的补集记号前后不一 (题干与解析首行作 $\overline{B}$, 后文改作 $C_U B$); ③第 18 题题干作「必要非充分条件」、其解析作「必要不充分条件」(同义异写), 另第 15 题解析「方程的解为 R」与同段后文「方程的解集为 R」措辞不一。本卷无插图 (全卷检索确认无「如图」)

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 30	11 张 / 19 题	2 处标点级差异 (2026-09-25 独立于转录的第二轮核对), 均已订正重编: ①第 12 题【解析】原卷作「$\frac{\lambda}{a} \in [t, t+1].$」(句末是实心句点, 6×放大确认), 本稿误作逗号; ②第 21(3) 小题原卷作「$\left\{n \mid \frac{495}{n+2} \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}\right\}$ 求其所有子集...」(集括号后无逗号), 本稿多写了一个逗号。 其余题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析全文逐题照原卷: 第 7、19(2) 题带下划线的 $\subseteq$ 与第 17(2) 题真包含的 $\subset$ 逐处放大确认; 第 13 题四个选项的 $\in / \notin$ 逐个核对; 第 17(2)、19(3) 的 cases 与第 18(2) 的三行分段函数、各处区间开闭均一致; k_1 / k_2、A_i / A_j、$(-1)^m$、$2^9 / 2^n / 2^{12}$ 等上下标无误; \ans 与解析结论无矛盾、无漏项。本卷 6 张插图 (第 13、14 题的韦恩图、第 16 题【解析】的三幅图、第 18 题的速度—时间图、第 20 题的题干图与【解析】图) 逐一与原卷比对, 画的都是原卷那个图形, 原卷有图处源码都已排图。原卷存疑三处已照录加注: ①第 10 题【解析】把该集合记作 A (题设里叫 P); ②第 21 题【解析】(3) 的「把这把这」重复; ③同题 (2) 的结论式分子用花括号

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 31	10 张 / 16 题	无转录错误 (2026-09-26 独立于转录的第二轮回原图核对)。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—18, 全卷无插图; 全卷没有单独的【答案】行, 每题下方直接印 【解析】, 答案写在解析末句 (选择题作「故选 D / B / C」)。逐题核对: $\subseteq$ (第 10 题条件①、第 11 题题干与选项 A、第 15(2) 题) 与真包含 (第 11 题选项 B、C) 四处均放大确认; 第 18 题题干两套 cases 的变化量分支顺序与「$i = 1, 2, \cdots, n - 1$」的位置都与原卷一致; A_1 / A_2、x_i / x_{i+1}、2^{n-1}、$(x - 2)^{999}$ 等指数下标无误; 答案 (第 11 题 D、第 12 题 B、第 13 题 B、第 14 题 C) 与解析末句一致。 原卷存疑两处已照录加注: ①第 11 题 【解析】首句「因为 $A = \{0, 1\}$ 是 A 的一个子集」(表述绕, 结论 $A \in B$ 成立); ②第 18(3) 的「$x \in \{7, 2, 3, 4\}$」(按上下文应为 $\{1, 2, 3, 4\}$)。另: 原卷并列各项一律用逗号或不加标点, 本稿按全稿惯例改排顿号, 已列入该卷「排版差异」⑨

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 32	10 张 / 19 题	转录后已逐页回图核对（2026-09-26）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，只有第 13 题一图（韦恩图，取自原卷截图 4× 放大）。第 6、8、9 题只印【答案】、第 18 题的【答案】印作「略」、第 15 题的答案印在题干括号内，其余印【解析】。原卷存疑四处照录加注：①第 19(2)【解析】「即 $\frac{1}{2} < m < \frac{3}{2}$ 」（按方程组与最终答案应为 $\frac{1}{2} < m < \frac{2}{3}$ ）；②第 21(2)①「显然 $ X \geq 0$ 」（疑为 $ S $ ）；③第 20(3) 答案的 $\{0, 4, 5, 6\}$ 是 4 元集而题问「3 元差集」；④第 21(2)②的解析原卷就未写完（第 10 页止于 $ S - A = n - s$ 、 $ B - S = n - t$ ）。卷首年份：卷面印作「2025-2026 年」，与连载「27 学年 高一 32」及公众号原文标题的 2026-2027 不符；经三人次分别放大独立判读，三次均读作 2025-2026，本稿按「标题行照原卷」排作 2025--2026——全稿唯一一份年份不是 2026--2027 的卷子，见「高一 32 专记」。第二轮（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 1 处漏抄：第 12 题【解析】法二的行首等号链 $(\frac{4}{a^2 + 2a} + \frac{1}{2b^2 + b} = \frac{4x^2}{2x + 1} + \frac{y^2}{y + 2} \geq \cdots)$ 被省成只剩右边，已按原卷补回并重编

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 33	13 张 / 19 题	未发现转录错误（2026-09-26 第二轮核对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，无插图。 逐题核对：第 3 题四个不等式的 $>/\geq$ 与 $\frac{1}{\sqrt{ab}}$ 一致；第 6、7、8、11、12 题的最小值/最大值与解析结论一致；第 9 题的 cases 与两条不等式链、第 19 题的 $400/150/7200/14400$ 等报价数字、第 21 题的 $\sqrt[n]{}$ 与 $n \in \mathbb{N}^*$ 均无误；选择题答案 B、B、B、D 与解析末句一致。 原卷存疑三处已照录加注（第 9 题解析的自相矛盾、第 19 题「一面」、第 5 题解析末句），并据核对补记两处排版差异（第 9 题「$(a \in R)$」移出 cases 花括号；文首注释④里原写的「第 18 题」其实没有 R）。 第二轮（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 第 9 题【解析】漏排原卷重复的 cases 框：原卷在解析里三次重新排出题干那个两行不等式组（第 3 页两处、第 4 页一处，其中一处是整行重复），源码只留「关于 x 的不等式组仅有一个整数解」、掉了框（有一处整行略去）——已按「照录」补回三处框与那一整行，并重编（答案版因此由 9 页增到 10 页）；另补记一条并列标点的排版差异⑨

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 34	7 张 / 12 题	未发现转录错误 (2026-09-26 第二轮核对)。填空 3—10、解答 11—14 (无选择题)，全卷无一处印「【答案】」——12 题全部只有【解析】，答案写在解析末句。第 11(2) 按 a 分的五种情况与第 12(2) 的联立方程组逐行比对无串行漏行；各最小值 ($4/3$、$\frac{\sqrt{5}+1}{4}$、2、2、$\frac{\sqrt{2}}{2}$、3、$\frac{9}{4}$ 与 $\frac{3}{2}$、$\frac{4\sqrt{6}}{3}$、4 与 $\frac{9}{2}$、9 与 $m \leq 8$、$\frac{\sqrt{10}}{2}$) 全部验算通过；标点逐句一致。唯一配图 (第 13 题解析的坐标系) 经比对确认画的正是原卷第 6 页那幅，无漏排。第二轮 (2026-09-26) 又独立核过一遍，查出 1 处漏抄：第 11(2) 【解析】 $a < 0$ 的三种情况原卷作「解 ($x +$ 3) $\left(x - \frac{4}{a}\right) \leq 0$，得 ……」 (三行同构)，源码简写成「解得 ……」 (同题 $a > 0$ 那一支原卷本就作「解得」，故只这三行是漏抄) ——已按原卷补回并重编。原卷存疑五处照录加注
高一 35	12 张 / 18 题	无符号 / 下标 / 标点类转录错误 (2026-09-26 第二轮核对)。填空 3—10、选择 11—13、解答 14—16、附加题 17—20 (四节齐全)，无插图。第 7 题三行不等式组、第 13 题大量三行组、第 18 题各两行方程组逐行对齐；指数与上下标 ($(x-2)^{999}$、$(x-1)^{2015}$、$(a \pm 1)^2$、t_1-t_4) 无误；区间开闭与正负号、第 16 题三小问的分段答案、第 18 题四组三元数对、第 19 题 $a = -3$ 与结果 4、第 20 题的 $c < x \leq e$ 或 $b \leq x < d$ 全部一致。核对另指出原卷第 9、10 页在解析中有 3 行重复陈述 S/T 定义被源码省略，已按「照录」补回并重编。第二轮 (2026-09-26) 又独立核过一遍：无实质转录错误，只报出 1 处压缩照录——第 13 题 【解析】 把原卷照列的三个二次函数式 ($y = ax^2 + bx + c$、$y = bx^2 + cx + a$、$y = cx^2 + ax + b$) 压成了「三个二次函数」，而同题①处却是照列的，前后不一致，已改回照列并重编。原卷存疑三处照录加注

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一36	6 张 / 17 题	2 处标点不一致，已订正（2026-09-26 第二轮核对）：①第 7 题题干原卷「$< 0 \quad x \in R$ 恒成立」中间只有空格、无逗号；②第 10 题【解析】①两处原卷用逗号（「$k \in \mathbb{Z}$，若 $k = 2n$」「故 $m \in [1]_4$，若 $k = 2n + 1$」），源码写成了分号。其余全部一致：第 13 题的 $\emptyset \subset M \subset \mathbb{R}$ 放大确认是真包含；cases / 不等式链（第 4、5、7、8、10、16、19 题）逐行无误；$[k]_t$ 系列下标、$a_1 - c_2$、$\sqrt{5k + 1}$ 无误；答案（第 11 题 C、第 12 题 B、第 13 题 D、第 14 题 D）与解析一致；$\frac{13}{6}$、$-\frac{1}{2} < \frac{c}{a}$、$\frac{7}{9}$、$1 \leq m < \frac{7}{5}$ 或 $25 < m \leq 49$ 等数字均与原卷一致。无插图。 原卷存疑两处照录加注（第 11 题「至少一个数为 1」、第 14 题称「四个命题」实列三条——后者可由真题原文确证是笔误）
高一37	10 张 / 19 题	正文与原图零差异（2026-09-26 独立于转录的第二轮核对——另一名 worker、只读原图、不参考既有结论，并逐题独立验算答案）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，全卷无插图。19 题答案逐一验算一致；题干、选项、\ans 与 \ifanswer 全文逐句对照一字不差；\step/\stepm 98 条与原卷【解析】的印刷行数逐题相等。三处卷面异常由它独立报出、已逐处放大核实并登记进文件头：①第 20(3) 题干作「若实数…」而解析作「若正实数…，且 $a > b$」（解析自行加强了条件）；②第 21(3) 解析由 $a_1 \geq 1$ 直接取严格「$> 1 >$」（对结论 $n < 10$ 无影响）；③第 21(2) 设问作「并求出 a_3 的值」（单数）而结论给出四个值。另第 17(1) 小问末原卷用冒号「:」（同题 (2) 用句点）——一并照录加注

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 38	12 张 / 17 题	1 处须改 + 文件头漏登 3 条 (2026-09-26 两轮: 先只读原图独立核对、再比对转录稿)。17 题答案全部验算一致。第 6 题 Venn 图 (阴影确为 $A \setminus B$、未镜像)、第 9 题 3×3 方格 (tabular 九格逐格与原卷一致)、第 14 题作答括注位置——三处均核实「文件头说法成立」。 须改 1 处: 第 9 题【解析】原卷 9 行、本稿并成 8 条 \step (原卷第 1 行「由表格数据得所有数之和为」单独成行), 已拆开; 现逐块条数 [5, 5, 1, 9, 9, 9, 4, 9, 9, 12, 6, 14, 21, 13, 65]、合计 191 = 原卷 191 行——第 17 题末三处原卷折行 (「...的」/「必要条件.» 等) 也据此按「一条 \step = 原卷一个印刷行」补拆。另报出文件头漏登的 3 条原卷问题 (第 19 题题干漏符号 U、$c_1 + c_2 = 2$ 与其上一行 $2(c_1 + c_2) = 21$ 不自洽、第 19(3) 的 $A'' = A \cup A'$ 疑当作 $2A \cup A'$) ——已逐页放大复核后补登记并加注; 文件头另两处计数 (「三分完美数」实为 5 次、「非空数集」实为 1 处) 也据它改正

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 39	11 张 / 22 题	3 处须改 + 头注 2 处修正 (2026-09-26: 先只读原图独立核对 22 题答案, 再比对转录稿)。 填空 3—12、选择 13—16、解答 17—20、附加题 21—24, 共 22 题、3 张插图。唯一答案性错误在原卷: 第 17 题【解析】推出「$a \in \mathbb{R}$」, 与题干「有且仅有一个是真命题」矛盾 (正确为 $(-\infty, -6] \cup (-5, +\infty)$) ——本稿照录未改。 比对另查出 3 处须改: 第 16 题解析的两处原卷作数字 A_1 (同题另一处才是斜体 A_i), 本稿统一成了 A_i——已改回; 第 20(2) 的 11 个集合列表里 $\{8, 11\}$ 与 $\{9, 12\}$ 之间原卷误用句号, 本稿顺手改成逗号——已照录回来; 文件头④举例的题号错 (第 9 题全文没有数集记号)——已改成「第 7、11、14、17、18、19 题」。 \step 163 条与原卷印刷行逐题全等 (0 处漏拆/多拆); 原卷笔误/存疑由 7 条补到 13 条。 另: 本卷另一名 worker 独立写出的第二份转录与采纳稿做了 token 级比对, 相似度 0.9889、残差全为排版差异 ($\backslash\backslash[4pt$ vs $\backslash\backslash$、$\backslashdfrac$ vs $\backslashfrac$), 数学内容一致——是对本稿内容的强旁证
高一 40	4 张 / 17 题	正文零须改 (2026-09-26 独立于转录的第二轮核对 + 转录稿比对)。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—19, 全卷 17 题、无插图。17 题答案逐一验算一致; 题干、选项、$\backslashans$ 与 $\backslashifanswer$ 全文逐字照录, 7 处【解析】的 \step 条数与原卷行数逐一相等 (合计 27 = 27)。三处原卷异常照录加注: 第 13 题 A/D 两选项文字完全相同 (原卷笔误)、第 5 题「全集 $U = R$」与「集合 M」之间漏排标点 (本稿按高一 b 第 13 题「原卷漏排、本稿补上」先例补逗号并加注)、第 10 题「...的取值范围」漏「是」(文件头原缺此条, 已补登记)。副标题定为「不等式」: 17 题里约 15 题为不等式, 集合仅第 4、5 两题、逻辑 0 题

(续上表)

卷	原图/题数	核对结果
高一 41	15 张 / 17 题	正文零须改 (2026-09-28 独立于转录的第二轮核对: 另一名 worker 只读原图先独立成稿、逐题独立验算答案, 之后才打开转录稿比对)。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—19, 全卷 17 题、 无插图 。17 题答案独立验算, 16 题与卷面一致 ; 唯一不一致是 第 9 题的原卷之误 (末句答案漏了 $t = -1$, 正确应为 $(-\infty, -2] \cup [-1, 1]$), 本稿 照录未改 。题干、选项、\ans 与 \ifanswer 全文逐句比对无差异; \step / \stepm 216 条与原卷印刷行逐题全等 (17 / 7 / 10 / 7 / 4 / 7 / 15 / 18 / 17 / 11 / 4 / 9 / 15 / 9 / 17 / 28 / 21)。历史高发项逐一放大核过: $\subset$ (第 13 题, 无下划线) 与 $\subseteq$ (第 14 / 16 / 17 题) 分得清; 第 16 题末句右端是 圆括号 $[-\frac{15}{2}, -7)$; 第 9 题的 -3 、第 13 题的 $\Rightarrow$ (无否定斜线)、第 12 题的 $\{7\}$ 都 确认原卷如此 。另查出 文件头两处表述不准 并已订正 (②⑤漏列第 10 题的斜体 R ; ②⑩原写「第 3 题两处」实为第 3、4、15 题各一处)。 副标题定为「集合与常用逻辑用语、不等式」 : 17 题里不等式约 9—11 题、集合与常用逻辑用语 6 题

(体例沿用全稿: 订正处一律在 .tex 里加 % 注写明原卷原样与本稿错处, 并重编试卷版/答案版。)

另做过一次「半开半闭区间」专项扫描 (2026-09-15): 把 (当时) 17 份源码里的半开半闭区间全捞出来, 共 17 处、分布在 6 份; 其中 12 处另一侧端点是 $+\infty$ (如 $[-\frac{2}{3}, +\infty)$), 写法唯一、无歧义, 剩下 5 处**两端都是有限数**的逐处回原图核了括号形状——**高一 05 第 15 题的选项 B、D 与【解析】末句三处确有「开闭抄反」** ($(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ 抄成 $[\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$, 已订正), 另外 4 处 (高一 05 第 18(3) 题的 $(2, \frac{5}{2}]$ 、高一 09 第 20 题的 $[\frac{1}{4}, 1)$ 、高一 03 第 7 题的 $[\frac{3}{2}, 2)$ 、高一 13 第 3 题的 $(\frac{8}{3}, 6]$) 与卷面逐字一致。**后入库的高一 10 也同法扫过**: 它的半开半闭区间只有 $[6, +\infty)$ 与 $(-\infty, 1)$ 两处, **另一侧端点都是无穷**, 没有「两端都是有限数」的情形。**2026-09-16 入库的高一 22 同样扫过**: 它有 $(0, 1]$ 一处两端有限 (第 8 题【解析】), 已放大核过括号形状——**左圆括、右方括**, 与同句前面的 $0 < a \leq 1$ 自洽; 另有 $(-\infty, -4]$ 、 $[\frac{1}{4}, +\infty)$ 两处都是单侧无穷。

另把历史上**改过区间或端点**的题逐条回原图复核了一遍 (共 5 处, 含上面提到的第 15 题): 高一 05 第 17(2) 题的答案 $(-\infty, -3]$ (原卷【解析】末句即带 $]$)、第 10 题的「 $a < -4$ 或 $a > 2$ 」(原卷末句作「 $2 < a$ 」, 右端点不取)、高一 08 第 17 题的 $P = (-2, 3)$ (**开区间**)、高一 07 第 21 题

【解析】里的 $(t, t+2)$ (随「当 $t < 0 < t+2$ 即 $-2 < t < 0$ 时」一句照原卷录回) ——四处均与卷面一致, 无需改动。

区间开闭这件事到此已核完, 不必重扫: 全库 17 处半开半闭区间 (含 5 处两端有限的) 与历史上改过区间/端点的 5 处, 都已逐处放大到看清括号形状核对过; 只有高一 05 第 15 题有错并已订正。今后只需在**改动过某题的区间**时, 重新核那一处。

3 材料流转

各市重点中学高一数学备课组的校本周末作业/周练 → 公众号「魔都数学加油站」（作者署名「破晓」，上海本地数学自媒体）收集整理后图文发布 → 本仓库 OCR 重排。

- 27 份的原文**逐篇核实**都出自该号（标题统一作「27 学年高一 N——2026-2027 年上海市 ×× 中学高一上...」，N 是该号的连载编号），发布日期集中在开学第一至三周，与「周末作业」的时序吻合。
- **连载号与本地编号的对应关系**见下表。2026-09-15 逐篇抓原文标题核对过一遍：N 一律以**标题为准**，不能按发布日期判——9-12 当天一次发了三篇。**本地数字编号一律与连载号对齐**（高一 NN 的 NN 就是连载号 N）；**没有连载号的三份家长拍照卷改用字母编号**（高一 a / 高一 b / 高一 c），数字号段因此全部留给连载卷。
- 连载 2—41 共 40 篇**现已全部入库**。其中 **N=16**（大同中学周末作业 2.1）**没有从公众号原文另转一份**——经逐题核对，那份原文与家长拍照卷 高一 b 是同一份作业（公众号版还略去填空第 1、2 题），故用 高一 b 的内容做了编号对齐的 高一 16；同理 **N=18**（大同中学周末作业 2.2，9-15 发布）就是拍照卷 高一 c（见下表 N=16 / 18 两行与「试卷清单」）。**N=23 / 24**（9-18 / 9-19 发布，格致·周末作业 3、复旦附中·周末作业 3）是 2026-09-20 入库的两篇，**N=25—28**（9-21 一次发了四篇：华二·周末作业 3、交附闵行·周练 2、交附闵行·周末作业 9.18、七宝·周末作业 3）是 2026-09-21 入库的四篇，六篇均为公众号原文直转，没有对应的拍照卷。

连载 N	原文标题里的学校 · 作业	发布	本地编号	状态
2	大同中学 · 集合综合练习	9-05	高一 02	已入库，编号一致
3	格致中学 · 周末作业 1	9-05	高一 03	已入库，编号一致
4	位育中学 · 周末作业 1	9-05	高一 04	已入库，编号一致
5	七宝中学 · 周末作业 9.5	9-06	高一 05	已入库，编号一致
6	延安中学 · 周末作业 1	9-07	高一 06	已入库，编号一致
7	交附闵行 · 周练 1	9-08	高一 07	已入库，编号一致
8	七宝中学 · 周末作业 1	9-08	高一 08	已入库，编号一致
9	进才中学 · 周末作业 1	9-11	高一 09	已入库，编号一致
10	复附浦东 · 周末作业 1	9-12	高一 10	已入库，编号一致
11	复附浦东 · 周末作业 2	9-12	高一 11	已入库，编号一致
12	交附闵行 · 周末作业 9.11	9-12	高一 12	已入库，编号一致
13	格致中学 · 周末作业 2	9-12	高一 13	已入库，编号一致
14	华师大二附中 · 集合与逻辑单元练习	9-13	高一 14	已入库，编号一致
15	七宝中学 · 抱孩子练习 9.8	9-13	高一 15	已入库，编号一致

(续上表)

连载 N	原文标题里的学校 · 作业	发布	本地编号	状态
16	大同中学 · 周末作业 2.1	9-13	高一 16 (对号副本) + 高一 b (补) (同一份拍照卷)	已入库, 编号一致
17	七宝中学 · 周末作业 2	9-14	高一 17	已入库, 编号一致
18	大同中学 · 周末作业 2.2	9-15	高一 18 (对号副本) + 高一 c (补) (同一份拍照卷)	已入库, 编号一致
19	延安中学 · 周末作业 2	9-16	高一 19	已入库, 编号一致
20	进才中学 · 周末作业 2	9-16	高一 20	已入库, 编号一致
21	上师大宝山 · 限时练习 1	9-16	高一 21	已入库, 编号一致
22	七宝中学 · 抱孩子练习 9.15	9-16	高一 22	已入库, 编号一致
23	格致中学 · 周末作业 3	9-18	高一 23	已入库, 编号一致
24	复旦附中 · 周末作业 3	9-19	高一 24	已入库, 编号一致
25	华师大二附中 · 周末作业 3	9-21	高一 25	已入库, 编号一致
26	交附闵行 · 周练 2	9-21	高一 26	已入库, 编号一致
27	交附闵行 · 周末作业 9.18	9-21	高一 27	已入库, 编号一致
28	七宝中学 · 周末作业 3	9-21	高一 28	已入库, 编号一致
29	延安中学 · 周末作业 3	9-23	高一 29	已入库, 编号一致
30	南洋模范中学 · 开学考	9-23	高一 30	已入库, 编号一致
31	上海中学 · 周练 1	9-25	高一 31	已入库, 编号一致
32	华师大二附中 · 周末作业 4	9-25	高一 32	已入库, 编号一致 (卷首年份照原卷作 2025-2026 , 与连载的 2026-2027 不同, 见「高一 32 专记」)
33	交附闵行 · 中秋作业	9-25	高一 33	已入库, 编号一致
34	交附闵行 · 查漏补缺卷	9-25	高一 34	已入库, 编号一致
35	七宝中学 · 抱孩子练习 9.22	9-25	高一 35	已入库, 编号一致
36	格致中学 · 周末作业 4	9-25	高一 36	已入库, 编号一致
41	上海中学 · 周练 2	9-28	高一 41	已入库, 编号一致
—	大同中学 · 周中小练习 1	—	高一 a (补)	无连载号, 家长拍照卷 (原卷未印校名, 判为大同)
—	大同中学 · 第二周周末练习 2	—	高一 c (补)	无连载号, 家长拍照卷

(续上表)

连载 N	原文标题里的学校 · 作业	发布	本地编号	状态
------	---------------	----	------	----

- 为什么拍照卷用字母：三份卷的原始材料是家长拍摄的学生作业，**不经公众号、原卷也没有连载号**，若沿用数字就会与连载卷抢号（此前正是「重号 + 加「(补)」」的做法，需靠校名才能区分）。现改为字母前缀，高一 02—高一 28 全部留给连载卷，一一对应、不再有歧义。**例外是 高一 16 与 高一 18**：它们的内容来自拍照卷（见上表 N=16／18 两行），但为了让数字号段与连载号一一对应，各出了一份**编号对齐的副本**（高一 16_大同中学_第二周周末练习 1、高一 18_大同中学_第二周周末练习 2，卷面标题都不带「(补)」），内容分别与 高一 b（补）、高一 c（补）一字不差——两份都留着：带「(补)」的作拍照原件的转录本、对号的那份作编号副本。**改动其一时须同步改另一份。**
- 「(补)」怎么用：只用在**三份家长拍照卷**上（高一 a_大同中学_周中小练习 1（补）、高一 b_大同中学_第二周周末练习 1（补）、高一 c_大同中学_第二周周末练习 2（补）），表示本篇不在连载序列内（原卷标题也没有这三个字，是**本稿所加**，已写进各卷头部注释）。其余各卷编号与连载号一致，文件名与卷面标题都**不带**任何标记。
- 高一 a—高一 c 是家长拍摄的学生作业，**不经公众号**。**旁证**：高一 a 与高一 b 有两道题**逐字相同**（ $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ 求交、满足 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 的 M 个数），而高一 b 卷眉印「上海市大同...」、高一 a 原卷未印校名——**据此把高一 a 判为大同中学**，文件名记为 高一 a_大同中学_周中小练习 1（补）（卷面标题仍照原卷、不带校名）。

4 上游是「共享题库」：43 组逐字同题 + 14 组同模板变体

把 41 份试卷的 718 道一级题干两两交叉比对（跨卷 257,403 对），校际重复分两档，两档的成员都按卷面题号逐条调出、逐字核过题干。判据见「方法与局限」。（本表是 2026-09-28 41 份全量重跑后的口径；17 份、18 份、21 份、22 份、24 份、28 份、29 份、30 份、36 份、40 份那几轮的组数见「核对摘要」的注。高一 16／高一 18 分别与高一 b／高一 c 同卷，不重复计入。22、24、29、41 四轮两档零新增——高一 22、高一 23／24、高一 29、高一 41 都与库内各卷一组都没比出来；28 份这一轮新增 2 组逐字同题 + 2 组变体（全部来自高一 25、高一 26 两份）、30 份这一轮新增 4 组逐字同题、36 份这一轮新增 7 组逐字同题（另 1 对由 2 份扩成 3 份）、40 份这一轮新增 6 组逐字同题（另 2 对扩成 3 份），见末几行。）

逐字同题 43 组（骨架最长公共子串 ≥ 25 字且含 ≥ 8 个汉字，或整段相似度 ≥ 0.95 ——几乎全是符号的题另有一条符号档，见「方法与局限」；★为 2026-09-15 重跑新增，⊕为补跑高一 10 新增，▲为 2026-09-15 末并入高一 19—21 后的新增或改判，◇为 2026-09-22 并入高一 25—28 后新增）：

题目	份数	分布
$A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$	3	02 第 10 题、a 第 8 题、c 第 9 题
对加减封闭的数集 S ($x \pm y \in S$, 问最小的正数)	3	05 第 12 题、09 第 21 题、b 第 18 题 数字 有变体：05 版是「最小正数为 6」的填空，09 ／b 版是「最小正数为 5」的三小问
集合 M 的 k 个不同非空子集 $N_1 \dots N_k$ 且并集 $\neq M$ ，求 k 最大	2	07 第 15 题、11 第 16 题 ▲05 第 16 题已 移出本组：它漏了「非空」二字、 M 也换成 $\{a, b, c, d, e\}$ ，答案 16 与 07／11 的 15 不同， 两两只有 0.797／0.813，改列变体档
$A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$ 与含参 $B =$ $\{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$ 的子集讨论	4	07 第 18 题、08 第 18 题、11 第 19 题、▲09 第 19 题 ▲09 版题干与前三份一字不差 ($r = 0.840$)，只是只问「 $B \subseteq A$ 求 a 」；它原 先是作为「单成员变体」附在本表之外的，本 轮并入本组
「和谐集」（去掉任一元素后余下 元素可平分）	3	02 第 19 题、09 附加题（卷面无编号）、◇38 第 13 题 题干逐字相同：09 版是《上海市 上海中学东校 2023-2024 学年高一上期中卷》 的原题（三小问），02 版是它的改编（只问 「元素个数的最小值」）——见「附加题专查」； 38 版是同一「和谐集」定义的第三份（正整 数组 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 、去掉其中任一元 素后余下元素可平分，38 版另起名叫「平衡 集」，见「高一 38 专记」)

(续上表)

题目	份数	分布
$f(x) = \frac{1}{1-x}$ 迭代 $(x \in A \Rightarrow \frac{1}{1-x} \in A)$	2	03 第 18 题、c 第 19 题
全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, 由 $A \cup B$ 、 $A \cap \bar{B}$ 、 $A \cap B$ 反求 A	2	05 第 9 题、07 第 8 题
$\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, - a , a + 1\}$, 求 a	2	07 第 5 题、08 第 5 题
满足 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 的 M 个数	2	a 第 4 题、b 第 7 题 这一组同时见于上面的 高考出处表 (改编自 2008 山东卷 (文) 选择 1)
$A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ 与 $B =$ $\{(x, y) \mid (y - 1)/(x - 1) = \frac{1}{2}\}$ 求 $A \cap B$	2	a 第 5 题、b 第 8 题
★「孤立元」($S = \{1, \dots, 8\}$ 的 3 元子集不含孤立元)	2	06 第 9 题、15 附加 17 题 两版逐字相同, 且同为题源 2009 北京卷 (文) 填空 6 的原 题照录
★「好集」($0, 1 \in A$; $x - y \in A$, $x \neq 0$ 时 $1/x \in A$)	2	08 第 21 题、14 第 20 题 定义与 (1)(2) 问 逐字相同; 14 版第 (3) 问多一个命题 q ($y/x \in A$)
★非空数集 A 的 $S = \{x \mid$ $x = a + b\}$ 、 $T = \{x \mid x = a - b \}$	2	07 第 21 题、15 第 16 题 定义与 (2) 问逐 字相同, 只换 A ($\{2, 5\} \setminus \{1, 3\}$) 与第 (3) 问 上界 (2025 / 2021)
★ $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m + 1 \leq x \leq$ $2m + 4$, α 是 β 的充分不必要条件	2	11 第 11 题、12 第 4 题 逐字相同 ($r =$ 0.987)
★ $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in \mathbb{R}\}$ 与 $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in \mathbb{R}\}$ 的关系	2	11 第 8 题、12 第 3 题 逐字相同 ($r = 0.971$)
$\oplus$ 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2,$ $x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示	2	10 第 4 题、11 第 7 题 逐字相同 ($r = 1.000$) ——同一学校相邻两次作业用了同一道题
$\oplus A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$ 、 $B =$ $\{x \mid ax - 1 = 0\}$, $A \cap B = B$ 求 a	2	05 第 6 题、10 第 9 题 逐字相同 ($r =$ 0.955); 同族还有 c 第 3 题 (改问「充分非必 要条件」, 见变体档) 与 a 第 9 题 (把 A 换成 含参方程、改问「只有一个真子集」)

(续上表)

题目	份数	分布
▲ $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ 与含参 $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 5 = 0\}$	2	02 第 17 题、05 第 17 题 两版集合一字不差，只差「设集合／已知集合」；小问有出入——(1) 问 02 作 $A \cap B = \{2\}$ 、05 作「 B 为单元素集合」，(2) 问两版相同 ($A \cup B = A$ ，答案同为 $(-\infty, -3]$)。原列变体档首行，本轮按题干逐字改入本档
▲ 「伙伴关系集合」($x \in A \Rightarrow \frac{1}{x} \in A$)， $M = \{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\}$	2	02 第 6 题、21 第 10 题 定义措辞略有出入(「若 $x \in A$ ，则 $\frac{1}{x} \in A$ ，就称 A 是...」／「若对任意的 $x \in A$ ，都有 $\frac{1}{x} \in A$ ，则称 A 是...」)，集合与问法相同，答案同为 15
▲ $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0\}$ 只有一个元素	2	06 第 5 题、20 第 4 题 逐字相同 ($r = 0.939$)，只差「若集合／已知集合」，答案同为 $a = 0$ 或 $\frac{1}{4}$
▲ 四个数字元素的集合 S 的全子集元素和 (空集记 0)	2	07 第 9 题、19 第 11 题 只换数字：07 版和 16208 (元素和 2026)、19 版和 16192 (2024)
▲ 六个关系式 ($\emptyset$ 、 $\{a\}$ 、 a 与 $\{a, b\}$ 间的 $\in / \subseteq$)	2	09 第 13 题、19 第 8 题 只换记号：①② 09 印 $\subsetneq$ 、19 印 $\subseteq$ ；因 $\emptyset \subsetneq \{a\}$ 与 $\emptyset \subseteq \{a\}$ 同真、 $a \subsetneq \{a\}$ 与 $a \subseteq \{a\}$ 同假，两版答案都是 ①③⑤
▲ $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ 、 $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$	2	15 第 14 题、a 第 14 题 三式一字不差 ($r = 0.978$ ，公共串 44 字)；15 版两小问、a 版三小问 (a 版多「 $A \cap B = A \cup B$ 」一问)，公共的后两问相同。原列「判据之外手工补记」，本轮改入本档
▲ 「特征数」定义题 (把 M 分成三个集合， X_i 取「最大+最小」之和)	3	07 第 10 题、a 第 13 题、◇39 第 16 题 同一个自定义概念，差别在 M ($1 \sim 12 / 0 < x \leq 15$)、每组元素个数 ($4 / 5$) 与问法 (求最大值与最小值的积 = 1485 / 问哪个值不可能)；公共串 27 字全落在「特征数」的定义句上。原列「判据之外手工补记」，本轮改入本档；39 版是同一「特征数」定义的第三份 ($M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$ 、每组恰 5 个元素、问 $X_1 + X_2 + X_3$ 的取值范围)

(续上表)

题目	份数	分布
◇ $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 两根 x_1, x_2 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 求 a	2	12 第 9 题、26 第 11 题 同一所学校 (交附闵行) 前后两次作业用了同一道题: 题干一字不差, 答案同为 -2 ; 这是全稿第一组同校逐字同题 (此前各组都是校际)
◇ $P_1 / P_2 / Q_1 / Q_2$ 四集合版 「下列说法正确的是」	2	17 第 16 题、25 第 16 题 题干、四个选项与答案 B 逐字相同, 同出 2015 上海卷 (春); 差别只在 17 那版的 C、D 两项把真题的「存在 a 」印成「对任意 a 」(原卷笔误, 见「真题出处」表), 25 这版与真题一致
◇ 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $U = \mathbb{R}$ (三小问)	2	11 第 20 题、30 第 19 题 题干、三个小问与三个答案全部一字不差 (复附浦东 × 南洋模范, 跨校用了同一道题, 连解析也同文)
◇ 集合 $A = \{1, 2\}$ 、 $B = \{x \mid ax = 6\}$, $A \cup B = A$ 求 a 的取值集合	2	15 第 6 题、30 第 8 题 逐字相同, 答案同为 $\{0, 3, 6\}$; 同族另有 25 第 6 题 (另一型, 见变体档)
◇ 先定义 $M - N$ 与 $M \oplus N = (M - N) \cup (N - M)$, 再求 $A \oplus B$	2	22 第 5 题、30 第 9 题 定义那两句一字不差 (占题干大半, 故判据把它判进逐字档); 两卷给的 A, B 不同 (22 版 $A = \left\{x \mid x \geq -\frac{9}{4}\right\}$ 、 $B = \{x \mid x < 0\}$, 30 版 $A = [0, +\infty)$ 、 $B = (-\infty, 2]$), 答案随之不同
◇ 区间 $M = \left[m, m + \frac{3}{4}\right]$ 、 $N = \left[n - \frac{1}{3}, n\right]$ 含于 $[0, 1]$, 求 $M \cap N$ “长度”的最小值	2	25 第 12 题、30 第 15 题 逐字相同, 答案同为 $\frac{1}{12}$
◇ 集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{1 - x^2}, x \in \mathbb{R}\}$ 、 $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\}$, 求 $A \cup B$	2	03 第 8 题、31 第 3 题 逐字相同 (答案同为 $[-1, 2]$)
◇ “ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的什么条件	2	20 第 15 题、36 第 13 题 逐字相同 (同出 2003 上海卷 (秋理), 见出处表)
◇ 非空集合 A 具有性质: $\frac{x}{y} \in A$ 、 $x + y \in A$, 判断哪个说法错误	2	24 第 13 题、32 第 16 题 题干与四个选项逐字相同, 答案同为 D
◇ $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$, $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 恰有 2 个元素	2	25 第 9 题、36 第 8 题 逐字相同, 答案同为 $\left[\frac{13}{6}, \frac{5}{2}\right)$

(续上表)

题目	份数	分布
◇ $ mx^2 - 4x + 3 \geq 2$ 的必要非充分条件是“ $x \leq 1$ 或 $x \geq 4$ ”	2	27 第 10 题、32 第 10 题 逐字相同，答案同为 $\left(\frac{4}{5}, \frac{15}{16}\right]$ ；两卷连解析也同文
◇已知 $a, b \in \mathbb{R}^+$ 且 $ab = 2$ ，求 $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$ 的最小值	2	33 第 6 题、34 第 7 题 逐字相同（同属交附闵行，答案同为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ）
◇已知实数 x, y 满足 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$ ，求 $x + y$ 的最大值	2	33 第 8 题、34 第 5 题 逐字相同（同上，两卷连解析也同文，答案同为 2）
◇“ M, P, S 是全集 I 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是”	2	08 第 15 题、32 第 13 题 题干与四个选项逐字相同：两版的图形也一样（ S 内含于 P 、阴影是 $(M \cap P) \setminus S$ ），答案同为 C。注意 19 第 7 题虽被判据拉进同一组，但它的图形是 P 内含于 S 、答案不同，不是同题（沿用既有结论，见「回原图逐题核对」）
◇ $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$ 、 $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$	2	03 第 16 题、38 第 15 题 题干逐字相同（公共串 12 字全落在 B 的定义上），按条件讨论 a 的范围
◇对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$ ，给出如下三个结论	2	07 第 11 题、38 第 14 题 题干逐字相同（ M 的定义句一字不差），判断正确结论的个数
◇关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (2k + 5)x + 5k < 0 \end{cases}$ 的整数解的集合为 $\{-2\}$	2	28 第 7 题、◇39 第 9 题 题干逐字相同（同上——两个不等式、整数解恰为 $\{-2\}$ ），求 k 的范围
◇“ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件	2	a 第 7 题、◇39 第 3 题 题干逐字相同（充要条件与区间端点的关系），答案同为 $a \leq 0$
◇高斯取整函数 $y = [x]$ （题面先介绍「数学王子」高斯再给定义）	2	a 第 10 题、◇39 第 11 题 介绍段与定义句逐字相同（a 版问取值个数、39 版问 x 的范围）
◇规定集合 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的子集 $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}\}$ 为 M 的第 k 个子集	2	a 附加 2 题、◇39 附加 21 题 定义句逐字相同（自定义「第 k 个子集」后的枚举题）

同模板变体 14 组（整段相似度 ≥ 0.71 且最长公共子串 ≥ 12 ，且公共串里含汉字／字母／关系符号这类内容字符——纯数字串不算；成员之间换了数字、问法或设定，答案往往随之不同。判据本身在本轮修过，见「方法与局限」）：

题目	份数	分布	变在哪
含参二次方程与子集讨论族内的交叉（02／05那一版↔07／08／09／11那一版）	2↔4	02 第 17 题、05 第 17 题×07 第 18 题、08 第 18 题、09 第 19 题、11 第 19 题（共 7 对）	两版 不是一个组 ： $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$ 只在 07／08／09／11 四份一字不差，02／05 那版是 $a^2 - 5$ ； A 的方程也是 $x^2 - 3x + 2 = 0 / x^2 + 4x = 0$ 两种。 $r = 0.747 \sim 0.886$ ，都够变体线但够不上逐字线。 这是全稿最大的一个族 ，本稿按相似度拆成逐字档（07／08／09／11）与变体档（02／05）两处，合起来看才是它的全貌
含参区间 B 与两射线之并 A 的包含关系	2	05 第 10 题、08 第 10 题	条件相同（都是 $B \subseteq A$ ），只换端点—— A 左支 $x < -1 / x < -5$ ，右支 $x > 4 / x \geq 4$ ； B 左端 $2a / a + 1$ ，右端同为 $a + 3$
▲集合 M 的 k 个不同子集 $N_1 \dots N_k$ 且并集 $\neq M$	2	05 第 16 题×07 第 15 题、11 第 16 题（共 2 对）	05 版 $M = \{a, b, c, d, e\}$ 、只写「不同子集」（答案 16）；07／11 版 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 、写「不同 非空 子集」（答案 15）。▲本轮从逐字档移到本档
▲ $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$ 的「所有满足 A 的偶数」	2	13 第 18 题、15 附加 19 题	本表里重合最强的一对 ：13 版是三小问（判断 8, 9, 10 是否属于 A ／证「 $x \in A$ 」是「 $x \in B$ 」的必要非充分条件／求所有满足 A 的偶数），其中第 (3) 问与 15 附加 19 题的 题干与问法一字不差 ；只因判据只看题干（小问被切掉）才落进本档。答案 $4n, n \in \mathbb{Z}$
▲「数域」定义题（ $a + b$ 、 $a - b$ 、 ab 、 $\frac{a}{b}$ 都在集合内）	2	17 第 11 题、20 第 16 题	定义句与四个命题的骨架几乎逐字相同，差别在字母（ F / G ）、数字（2026／2023）、第三条命题的集合（ $P = \{x \mid x = 3k\} / \{x \mid x = 2k\}$ ）与问法（问 真命题编号 ／问 假命题个数 ）；答案 (1) (2) (4) / B (1 个)
$M = \{1, \dots, 10\}$ 的非空子集按 $\sum k(-1)^k$ 求和	2	09 第 11 题、b 附加 20 题	一问填空、一问解答
「全食／偏食」定义题	2	06 第 11 题、c 第 11 题	同一个 $A = \{-1, \frac{1}{2}, 1\}$ ，但 B 的定义与问法不同（求范围 / 求值）
★集合 A 满足「 x 、 $y \in A \Rightarrow x - y \in A$ 」（或 $\frac{x}{y} \in \mathbb{N}$ ）的元素个数/关系题	2	03 第 12 题、09 第 7 题	两版分别改编自 同一道 2012 新课标卷（理）选择 1（见出处表那两条）：09 只把 A 的元素由 5 个改成 6 个，03 把条件换成 $\frac{x}{y} \in \mathbb{N}$ 、 A 换成 $\{-1, 0, 1\}$ ， $r = 0.734$ 。★本对在改判据前是 漏检 的（公共串全符号、 $r = 0.800$ ）

(续上表)

题目	份数	分布	变在哪
▲「 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ 是 $M = N$ 的什么条件」	2	17 第 7 题、 20 第 15 题	20 版就是 2003 上海卷（秋理）的那道真题 （解集为两个 不等式 > 0 的集合，本卷补了 $\emptyset \subsetneq M \subsetneq \mathbb{R}$ 、 $\emptyset \subsetneq N \subsetneq \mathbb{R}$ ），答案「必要非充分」；17 版把不等式改成 方程 $= 0$ 、去掉两个补条件，答案随之变成「充分非必要」。 同结构、答案相反
▲ $S = \{s \mid s = 2n + 1\}$ 与 T 填包含关系	2	06 第 7 题、 17 第 9 题	06 版 $n \in \mathbb{N}$ 、 $T = \{t \mid t = 2n - 1\}$ 、只能填「 $=$ 」；17 版 $n \in \mathbb{Z}$ 、 $T = \{t \mid t = 4n + 1\}$ 、四个符号都能填，解析结论 $S \supset T$
▲ $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$ 、 $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$ 那道上海春考题	3	13 第 14 题、17 第 16 题、◇ 25 第 16 题	$r = 0.726 \sim 0.732$ / 公共串 31 字；17 / 25 两版多出一对 Q_1 、 Q_2 ($x^2 + x + b > 0$ / $x^2 + 2x + b > 0$)，且两版彼此 逐字相同 （另列逐字档未行），13 版只留 P_1 、 P_2 半题、四个选项改写。原列「判据之外手工补记」，24 份那轮够变体线移入本档，本轮因高一 25 入库扩成 3 份
▲「封闭集 / 单封集」($a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于该集合)	2	05 第 20 题、12 第 21 题	$r = 0.726$ / 公共串 18 字。原列「判据之外手工补记」，本轮够变体线，移入本档
◇固定 $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ 与含参 A ， $A \subseteq B$ 求 a	2	04 第 15 题、26 第 8 题	$r = 0.813$ / 公共串 15 字； B 一式不差，含参的那个都在 A (04 版 $x^2 - ax + 4 = 0$ 、26 版 $(a - 1)x^2 + 3x - 2 = 0$)，都要讨论 $A = \emptyset$ 的单元素情形；因 a 出现的位置不同（一次项系数 / 二次项系数），答案不同 ($\{a \mid -4 < a \leq 4\}$ / 另一组区间)
◇「 A 固定、 $B = \{x \mid ax + c = 0\}$ 含参， $B \subseteq A$ 求 a 的取值集合」	3	15 第 6 题、 25 第 6 题、 ◇ 30 第 8 题	$r = 0.719$ / 公共串 15 字； 只共享句型骨架 (A 由 $\{1, 2\}$ 换成 $x^2 + x - 6 = 0$ 的解集 $\{-3, 2\}$ 、 B 由 $ax = 6$ 换成 $ax - 2 = 0$ 、条件由 $A \cup B = A$ 换成 $B \subseteq A$)，与末两组同型，证据强度弱于前面几组，单列备查。◇ 本轮因高一 30 入库扩成 3 份 ：30 第 8 题与 15 第 6 题是逐字同题（另列逐字档），只与 25 第 6 题够不上逐字线

有 3 行从本表移出、改列「判据之外手工补记」——它们共享的只是句型骨架（「含参集合 + 包含关系 + 求 a 范围」），集合与条件都不相同，两版的**公共串短于 12 字**，任何文本判据都捞不到：08 第 17 题 × 09 第 17 题（公共串 5 字）、02 第 18 题 × 03 第 16 题（4 字）、05 第 7 题 × c 第 5 题（9 字）。它们不是被新判据筛掉的，而是**从来就没进过候选池**。

另有一个族跨在「逐字档」与「判据之外」之间——「性质 P / 封闭集 / 单封集」：三者是同一副定义的三种说法（对任意 $i \leq j$ ， $a_i a_j$ 与 a_j / a_i / $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 两数中至少有一个属于该集合），源头是 **2009 北京卷（理）的「性质 P 」（乘除版）**。本库里高一 05 第 19 题是它的乘除

版（换名「性质 M 」），高一05 第 20 题「封闭集」与高一12 第 21 题「单封集」是它的**加减版**，两版定义逐字程度很高（见「判据之外手工补记」与出处表）。

全稿最大的一个族藏在上面两档之间：「含参二次方程 + 子集讨论」共出现在 **6 份**里—— 高一02 第 17 题、05 第 17 题、07 第 18 题、08 第 18 题、09 第 19 题、11 第 19 题，其中 $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$ 这一表达式**四份一字不差**（02 / 05 那份是 $a^2 - 5$ ），差别只在 A 的方程（ $x^2 + 4x = 0$ 或 $x^2 - 3x + 2 = 0$ ）与小问。本稿按相似度把它拆在了逐字档（07 / 08 / 11）、变体档（02 / 05）和单成员变体（09）三处，合起来看才是它的全貌。另有一份（高一04 第 15 题）是它的**反向形式**（含参的换成了 A 、固定的换成 B ）。

后一档里最后两组**只共享句型骨架**（「含参集合 + 包含关系 + 求 a 范围」），集合与条件都不相同，证据强度明显弱于前五组，单列备查；前五组的题设骨架则一致，只是参数、问法或小问有出入。

判据之外手工补记 8 对（7 行）—— 这一批的分数都在变体线以下，但逐条读过原文、确实是真同题。它们正好说明「**骨架文本相似度**」量的不是「**数学内容**」：下文「方法与局限」里 高一07 第 4 题 × 高一b 第 8 题的 $r = 0.783$ 是虚高（两句都短），下面七对则都是虚低（题面文字改了、数学没改）。（★为 2026-09-15 重跑新增；▲为 2026-09-15 末并入高一19—21 那一轮新增；分数是本轮口径，与上一轮有 ± 0.02 的出入。）

题目	份数	分布	r / LCS
$A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$	2	05 第 6 题、c 第 3 题	0.582 / 14
$A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$ 与含参 B	2	05 第 10 题、07 第 17 题	0.575 / 13
固定方程 $x^2 + 2x - 8 = 0$ 、 $x^2 - 5x + 6 = 0$ + 含参 $x^2 - tx + t^2 - c = 0$	3	08 第 6 题、a 第 14 题、15 第 14 题	0.448 / 13 (a 与 15 两版已升入逐字档，本行指 08 版与这两份的关系，共 2 对)
★「第 k 个子集」（2 的幂编码）	2	08 第 11 题、a 附加题第 2 题	0.614 / 10 同源：都改编自 2010 湖南卷（文）填空 7，改法不同（见表下说明）
▲同一个 $P = (-2, 3)$ 与含参 Q 的包含关系	2	08 第 17 题、09 第 17 题	0.640 / 5
▲含参区间与包含关系（含参的那个一在 B 、一在 A ）	2	02 第 18 题、03 第 16 题	0.448 / 4
▲ A 为固定区间、 B 含参时的包含关系	2	05 第 7 题、c 第 5 题	0.635 / 9

(续上表)		
题目	份数	分布
		r / LCS

后 3 对 (▲) 是从变体档移下来的, 缘由见变体表下的那段说明: 它们的公共串只有 4—9 字, 短于候选取线 ($\text{LCS} \geq 12$), 根本进不了候选池——不是判据放宽或收紧能救回来的。上一轮把它们列在变体表里, 靠的是「只共享句型骨架」这句话, 与判据口径不符, 本轮据实归位。另外 3 对 (「特征数」、上海春考的 P_1/P_2 、「封闭集/单封集」) 本轮分数够了, 已分别移入逐字档与变体档。

- 「特征数」(原列本表首行, 本轮移入逐字档): 同一个自定义概念——把 M 分成三个集合、 X_i 都取「最大元素与最小元素之和」。差别只在 M ($1 \sim 12 / 0 < x \leq 15$)、每组元素个数 ($4 / 5$) 与问法 (求最大值与最小值的积 = 1485 / 问哪个值不可能)。判据这次能捞到它, 是因为公共串 27 字全落在「特征数」那句定义上, 越过了逐字档的「 ≥ 25 字」线。这个名词与高考里的「特征数」同名不同义 (见「考据不出来的」一节)。
- $x^2 - 3x - 4 = 0$ 那一对: 两版集合一字不差 (与变体档首行那对一样强), 只是 05 问 $A \cap B = B$ 、12 问「 $x \in B$ 」是「 $x \in A$ 」的充分非必要条件——问法占了句子一大截, 把分数拉了下去。
- $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$ 那一对: A 一字不差, B 都是含参区间、都求参数范围。据此上表「含参区间 B 与两射线之并 A 」那一族实为 3 份 (05 / 07 / 08), 不只是 2 份。
- 最后一对是这一轮新翻出来的, 也是四对里唯一连 $r \geq 0.50$ 的候选池都没进的: 08 第 6 题给 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ 、 $C = \{x \mid x^2 - mx + m^2 - 13 = 0\}$, 问「 $B \cap C \neq \emptyset$ 且 $A \cap C = \emptyset$ 求 m 」; a 第 14 题把三条式子摆成 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ 、 $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, 三小问全用 $\cap$ 、 $\subseteq$ 与 $\emptyset$ 串起来。两条固定方程一字不差, 第三条同为 $x^2 - tx + t^2 - c = 0$ 型, 只是含参的那条在两题里换了位置。前两档按「骨架文本」找, 它按「共享方程」才找得出来——题面措辞改得多, r 就掉到 0.448, 但数学骨架是同一副。

(上面的 r / LCS 都是本轮 29 份口径; 下面这段阈值分析里的数字是 12 份那一轮跑的, 22 份口径下未重算, 结论不变。)

这 4 对不能靠降线收进来: 后两对里最松的是 0.597, 要收它得把变体线从 0.71 压到 0.597, 而 r 落在 0.597–0.71、 $\text{LCS} \geq 12$ 的共 15 对, 真问题只有 2 对, 其余 13 对全是套话; 最后一对 (0.448) 更在 0.50 之外, 再降就把 646 对翻成上千对。故按「分数不够、内容够」单列在此。

同一轮扫描里更弱的几对没有收——它们只共用一段常见表达式, 不足以断定同源, 故留在此处备查不列成组: 05 第 6 题 / 06 第 3 题 / c 第 3 题三者共用 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$ (其中 05 与 c 另共用 A 一字不差, 已收在上表; 06 只共用 B 。2026-09-15 补跑又发现 05 与 10 的那一版逐字相同, 一并收在上表末两行); 05 第 7 题 $\times$ c 第 15 题共用 $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$; 02 / 05 第 17 题 $\times$ 08 第 3 题共用 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$ ——这个集合太常见, 几乎不构成证据。

不同学校、不同周次出现这么多同题, 说明各校备课组大量取材于同一批公共题源 (教辅、网络

题库、区统考、教材习题)，而非各校独立原创。旁证是这些题在菁优网、1010jiajiao、百度题库、作业帮上都能搜到近乎一致的版本。

5 能考据到的高考出处：41 道真题（46 条对应 / 54 个题位）

拿 1952–2026 年的全部高考真题逐字比对（参考库 `~/Sources/AI/Gaokao-Math-Problems-Compilation`，含上海春/秋/文/理及各地方卷；去噪后有效题干 **16,273 道**），能定到具体试卷的真题有 **41 道**，对应本库 **54 个题位**、**46 条对应关系**：

- **按关系分**：原题照录 **22 条**、改编 **21 条**、借定义 / 借集合另出题 **3 条** = 46 条；
- **真题侧**：**3 道**真题被三份试卷用到（2015 上海卷（春）：高一 13 / 17 / 25；2003 上海卷（秋理）：高一 17 / 20 / 36；2010 湖南卷（文）填空 7：高一 08 / 高一 a / 高一 39），**7 道**各被两份用到（2009 北京卷（文）填空 6「孤立元」、2017 江苏卷、2012 新课标卷（理）、1999 广东卷 / 全国卷、2008 山东卷（文/理）、2009 北京卷（理）「性质 P 」、2009 天津卷（理）） $\rightarrow 3 \times 3 + 7 \times 2 + 31 \times 1 = 54$ 个题位；**5 条**对应关系是同一道真题的第二种 / 第三种改法（2012 新课标卷（理）选择 1 两种、2015 上海卷（春）三种、2003 上海卷（秋理）两种、2009 天津卷（理）两种） $\rightarrow 4$ 道真题共多出 $1 + 2 + 1 + 1 = 5$ 条，故 $41 + 5 = 46$ 条对应。

判定口径是「脱去 LaTeX 与标点后的骨架文本最长公共子串」+ 整段相似度，下表每一条都逐字看过原文：（★为 2026-09-15 全量重跑新增，含旧卷漏检 2 条；▲为并入高一 19—21 后新增；●为 2026-09-16 并入高一 22 后新增——那一轮三条全是原题照录；◆为 2026-09-20 并入高一 23 / 24 后新增——那一轮一条，系改编；◇为 2026-09-22 并入高一 25—28 后新增——那一轮两条，全是原题照录。■为 2026-09-28 顺核①机判命中清单时补登的两条——清单里另外 17 条判为不算，逐条见下。）

本节原与「核对摘要」那一行的口径不同（摘要写「26 道 / 31 个题位」，本节写「24 道 / 27 个题位」）。根子是两处数的不是一个东西：摘要数的是「题目 $\leftrightarrow$ 真题」的对应条数，本节数的是真题的道数，而两处都没把这层区分写出来；本节那个「27 个题位」还漏算了 5 个。**2026-09-15 已统一**——两个地方改用同一套数（本节标题、正文与摘要那一行逐处对齐）。**2026-09-28 又发现**上一轮（并入高一 37—高一 40）只加了表行、没改本节标题，于是本节停在「36 道 / 41 条 / 45 个题位」而摘要已走到「39 / 44 / 48」；而且两处的题位数都对不上那张表——把表逐行数出来是 **50 个题位**（摘要写 48、本节写 45，两处自己的算式也各差 1），摘要的「6 道各被两份用到」也漏了 1 道（2003 上海卷（秋理）其实是三份在用）。这一轮一并改正，并按那张表给这几个数立了断言（见 `工具/计数核对.py`）。数「道」时要把同一份卷里的两道不同真题分开算（2009 北京卷（文）的「填空 6 孤立元」与「选择 8」是两道），否则会少算 1。

另：本节早年那几轮的题位增量也记少过——并入高一 31—高一 36 那一轮实际新增 **7 个题位**（高一 31 第 14、高一 34 第 8、高一 35 第 12、高一 35 附加 17、高一 36 第 3、高一 36 第 13、高一 36 第 14），当时却记成「40 $\rightarrow$ 45」（+5），此后一路少 2（它写的 45 / 48 应为 **47 / 50**）；并入高一 37—高一 40 那一轮的 +3 是对的。上表与本节标题现按逐行数出来的真值写。

另需说明：本节对后入库各卷的并入并不齐——高一 19—21 只并入了下面这一条：高一 20 第 15 题 = 2003 上海卷（秋理）（骨架 LCS 55 字、 $r = 0.935$ ，本卷补了 $\emptyset \subsetneq M \subsetneq \mathbb{R}$ 、 $\emptyset \subsetneq N \subsetneq \mathbb{R}$ 两个条件），它和 17 第 7 题那一行是同一道真题的两种改法；高一 22 的三条则全部入了表（表末三行，2026-09-16 补）；高一 23 的一条也已入表（◆那一行，2026-09-20 补）；高一 25 / 高一 28 的两条也已入表（◇表末两行，2026-09-22 补，两条都是原题照录）。这几份新卷的其余题在真题库里都没有达逐字线的命中（19 第 3 题、20 第 3 / 8 题只有 12—22 字的通用片段，属「同题型但非同一题」；高一 25—28 机判另给出 4 条候选，回原文复核后判为假命中，见「核对摘要」的注）。

其后各轮的新真题与新题位都已入表：并入高一 30 的两条（◇两行）、并入高一 31—高一 36 的 5 道新真题 + 高一 36 第 13 题那个新题位、并入高一 37—高一 40 的 3 条（表末三行）；并入高一 29 的那一轮整批零命中，并入高一 41 的 2026-09-28 这一轮同样零命中。

本库题目	出处	关系
高一 06 第 9 题、★高一 15 附加 17 题	2009 北京卷（文）填空 6「孤立元」	原题照录（高一 15 版最长公共子串 76 字，整题一字不差；两版互为逐字同题）
高一 09 第 5 题★（旧卷漏检）	2008 浙江卷（理）选择 1	原题照录（ $U = \mathbb{R}$ 、 $A = \{x \mid x > 0\}$ 、 $B = \{x \mid x \leq -1\}$ 与所求式 $(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$ 一字不差，只去掉四个选项改成填空）
★高一 17 第 15 题	2012 湖北卷（文）	原题照录（「存在一个无理数，它的平方是有理数」的否定；题干与四个选项逐字相同， $r = 0.977$ ）
高一 b 第 9 题	2014 福建卷（文）填空 4	原题照录（ $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$ 且三条关系只有一条成立，求 $100a + 10b + c$ ）
高一 b 第 13 题	2018 全国 II 卷（理）选择 2	原题照录（ $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3, x, y \in \mathbb{Z}\}$ 求元素个数）
高一 b 第 15 题	2009 北京卷（文）选择 8	原题照录（正三角形内 $ PO \leq PO_i $ 的区域，只把 T/D、O/P ₀ 换了记号）
高一 08 第 15 题、高一 32 第 13 题	1999 广东卷 / 全国卷选择 1	原题照录（Venn 图阴影区域；两版的题干、四个选项与图形均逐字相同，答案同为 C——见同题表那一行）
高一 c 第 13 题	2011 湖南卷（理）选择 2	原题照录（ $M = \{1, 2\}$ ， $N = \{a^2\}$ ，问「 $a = 1$ 」是「 $N \subseteq M$ 」的什么条件）

(续上表)

本库题目	出处	关系
高一 a 第 11 题	2013 山东卷 (理) 选择 2	原题照录 ($A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{x - y \mid x, y \in A\}$; 题干一字不差, 只把四个选项的次序倒了过来)
高一 03 第 5 题、 ★高一 09 第 15 题	2017 江苏卷填空 1	改编 · 两种改法 : 真题是 $A = \{1, 2\}$ 、 $B = \{a, a^2 + 3\}$ 、 $A \cap B = \{1\}$ 求 a (答 1); 高一 03 版把 a 换成 $-a$ 并改问 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$, 高一 09 版把 $a^2 + 3$ 换成 $a^2 + 1$ 、改成选择 (答案随之由 1 变 0)
高一 08 第 13 题	2004 全国 IV 卷 (理) 选择 1	改编 (M 、 N 一字未动, 把 $M \cap N$ 改成 $M \cup N$ 并换掉四个选项)
高一 09 第 7 题	2012 新课标卷 (理) 选择 1	改编 (A 的元素由 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 改为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$)
高一 03 第 12 题	2012 新课标卷 (理) 选择 1	改编 (与上一条同源、改法不同: 把条件 $x - y \in A$ 换成 $\frac{x}{y} \in \mathbb{N}$, A 换成 $\{-1, 0, 1\}$)
高一 08 第 11 题、 ★高一 a 附加题第 2 题、 高一 39 附加 21 题	2010 湖南卷 (文) 填空 7	改编 · 两种改法 : 高一 a 版的定义与真题一字不差 ($k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots$ 、集合 $M = \{a_1, \dots, a_n\}$), 只把问法换成「第 25 个子集»; 高一 08 版把指数改成元素值 (集合取 $\{0, 1, \dots, n\}$ 、 $k = 2^{a_1} + \dots$; 原卷此题上标用 n 、子集下标却用 m , 本身不统一, 本稿照原卷), 保留「第 211 个子集」这一问、删去原题第一问
高一 a 第 4 题、 高一 b 第 7 题	2008 山东卷 (文/理) 选择 1	改编 (原题 $M \subseteq \{a_1, \dots, a_4\}$, 本稿扩成 5 个元素, 答案由 2 变 4)。 该卷文、理两卷都印了这一道 , 两边相似度相同, 故出处写作「文/理」
★高一 17 第 16 题	2015 上海卷 (春)	改编 (P_1, P_2, Q_1, Q_2 四集合版; C、D 两项真题作「存在 a」 , 原卷印成「对任意 a 」——原卷笔误, 答案 B 不受影响)
★高一 13 第 14 题	2015 上海卷 (春)	改编 (与上一行同源: 只留 P_1, P_2 半题, 四个选项改写)

(续上表)

本库题目	出处	关系
★高一17 第7题、▲高一20 第15题	2003 上海卷（秋理）	同一道真题的两种改法：17 版把真题的「两个一元二次不等式解集相同」改成「两个一元二次方程解集相同」的填空题（ $r = 0.882$ ）；20 版保留不等式（ $r = 0.935$ 、LCS 55 字），只补了 $\emptyset \subsetneq M \subsetneq \mathbb{R}$ 、 $\emptyset \subsetneq N \subsetneq \mathbb{R}$ 两个条件——接近于原题照录。两版答案不同（充分非必要/必要非充分）
★高一15 第9题	2006 山东卷（理/文）	改编（ $A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y), x \in A, y \in B\}$ 定义一字不差； A, B 由 $\{0, 1\}, \{2, 3\}$ 换成 $\{1, 2\}, \{3, 4\}$ ，选择改填空）
★高一17 第9题	2021 全国乙卷（理）选择2	借同一对集合另问（ $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ 、 $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ 定义逐字相同；真题问 $S \cap T$ ，本卷改问 S 与 T 的包含关系）
★高一12 第21题、★高一05 第19题	2009 北京卷（理）「性质 P 」	同构改编/改编：真题定义为「 $a_i a_j$ 与 a_j / a_i 至少有一个属于 A 」——高一05 第19题是它的乘除版（换名「性质 M 」，改小问），高一12 第21题「单封集」是它的加减版（ $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ ）
高一a 第2题	2012 辽宁卷（理/文）选择	改编（ U 由 $\{0, \dots, 9\}$ 改为 $\{0, \dots, 8\}$ ；问法未变，答案随之由 $\{7, 9\}$ 变为 $\{7\}$ ）
高一b 第11题	2010 上海卷（秋理）填空14	改编（4 个子集 $\rightarrow$ 2 个子集， $\emptyset$ 、 $U \rightarrow a$ 、 b ）
高一c 第10题	2015 浙江卷（理）选择6	借 $d(A, B) = \text{card}(A \cup B) - \text{card}(A \cap B)$ 的定义另出题
★高一02 第15题	2012 江苏卷（ $f(n)$ 计数题）	改编（同构换参数：真题是 $P_n = \{1, \dots, n\}$ 、 $A \subseteq P_n$ 、 $x \in A \Rightarrow 2x \notin A$ 且 $x \notin A \Rightarrow 2x \notin \mathbb{C}_{P_n} A$ ，求 $f(4)$ 与 $f(n)$ ；本卷改成 $U = \{1, \dots, 6\}$ 、 $2x \rightarrow 3x$ 、改问选择的元素个数——答案由 $f(4) = 4$ 变为 16）

(续上表)

本库题目	出处	关系
★高一17 第 11 题	2008 福建卷 (文/理)「数域」	改编 (同一定义、四个命题全换: 真题文理两卷各给一组「数域必含 $0, 1$ / 整数集是数域 / $\mathbb{Q} \subseteq M$ 则 M 必为数域 / 数域必为无限集」式命题, 本卷换成「 0 是任何数域的元素 / 有非零元素则 $2026 \in F$ / $\{3k\}$ 是否数域 / $\mathbb{Q}$ 是否数域」)
●高一22 第 11 题	2011 年大纲卷 (文/理) 选择	原题照录 (题干「下面四个条件中, 使 $a > b$ 成立的充分而不必要的条件是」与四个选项 $a > b + 1$ / $a > b - 1$ / $a^2 > b^2$ / $a^3 > b^3$ 逐字相同, $r = 1.000$; 答案同为 A。该卷文、理两卷都印了这一道, 两边相似度相同, 故出处写作「文/理」)
●高一22 第 13 题	2010 年辽宁卷 (理) 选择	原题照录 (题干「已知 $a > 0$, 则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax = b$ 的充要条件是」与四个选项—— $\exists x \in \mathbb{R}$ / $\forall x \in \mathbb{R}$ 配 $\geq$ / $\leq$ 两种, 见本卷源码——逐字相同, $r = 1.000$; 答案同为 C)
●高一22 附加 19 题	2006 年湖北卷 (理) 选择	原题照录 (四条命题与真题相同、答案同为①②; 差别只有两处表述——第③条真题印 $\nsubseteq$ 的符号写法、本卷写成文字「 A 不是 B 的子集」(同义), 以及由选择改成了填空。 $r = 0.952$ 、最长公共子串 66 字)
◆高一23 第 12 题	2004 年北京卷 (秋文/秋理) 选择	改编 (借真题题干「已知 a, b, c 满足 $c < b < a$ 且 $ac < 0$ 」与 A、B 两个选项, 把问法由「一定成立的是」反转为「不成立的是」, C 由 $cb^2 < ab^2$ 改为 $c(b^2 + 1) < a(b^2 + 1)$ 、D 由 $ac(a - c) > 0$ 改为 $ac(a - c) < 0$, 答案由 A 变 B。真题的 B 项 $c(b - a) < 0$ 恰是「不成立」的那一个, 故本卷答案正是真题里不成立的选项。该卷文、理两卷都印了这一道, 故出处写作「文/理」; 机判 $r = 0.742$ 、LCS 13, 落变体档, 回原文复核确认同源)
◇高一28 第 16 题	2013 年浙江卷 (文) 选择	原题照录 (两个自定义运算 $a \wedge b = \min\{a, b\}$ 、 $a \vee b = \max\{a, b\}$ 的定义式, 四个选项 $a \wedge b \geq 2$ / $c \wedge d \leq 2$ 等, 与答案 C 逐字相同; $r = 0.966$ 、最长公共子串 19 字)

(续上表)

本库题目	出处	关系
◇高一25 第 16 题	2015 年上海卷（春）选择	原题照录（ $P_1 / P_2 / Q_1 / Q_2$ 四集合版，题干、四个选项与答案 B 逐字相同； $r = 0.916$ ）。与下面高一17 第 16 题那一行是 同一道真题的第三种改法 ——17 那版的 C、D 两项把真题的「存在 a 」印成「对任意 a 」（原卷笔误），25 这版与真题一致
◇高一30 第 4 题	2010 年安徽卷（秋文）填空	原题照录（命题「存在 $x \in \mathbb{R}$ ，使得 $x^2 + 2x + 5 = 0$ 」的否定； $r = 0.909$ 、最长公共子串 18 字，答案同为「对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，都有 $x^2 + 2x + 5 \neq 0$ 」）
◇高一30 第 12 题	2019 年上海卷（春）填空	原题照录（ $A = [t, t + 1] \cup [t + 4, t + 9]$ 、 $0 \notin A$ 、存在正数 λ 使 $\frac{\lambda}{a} \in A$ ； 整题一字不差 ， $r = 1.000$ 、最长公共子串 47 字，答案同为 $t = 1$ 或 -3 ）
◇高一31 第 14 题	2009 年天津卷（理）选择	原题照录（ $0 < b < a + 1$ 、关于 x 的不等式 $(x - b)^2 > (ax)^2$ 的解集中整数恰有 3 个； $r = 0.736$ 、最长公共子串 22 字，答案同为 $1 < a < 3$ ）
◇高一34 第 8 题	2008 年江苏卷填空	原题照录（ $x、y、z$ 为正实数且 $x - 2y + 3z = 0$ ，求 $\frac{y^2}{xz}$ 的最小值； $r = 0.967$ 、最长公共子串 28 字，答案同为 3）
◇高一35 第 12 题	2012 年浙江卷（理）填空	原题照录（ $x > 0$ 时均有 $[(a - 1)x - 1](x^2 - ax - 1) \geq 0$ ，求 a ； $r = 0.915$ ，答案同为 $\frac{3}{2}$ ）
◇高一35 附加 17 题	2009 年天津卷（理）选择	改编：与高一31 第 14 题是 同一道真题的两种题型 ——本卷把选择改成了填空「求实数 a 的范围」，条件与解集都相同，答案同为 $1 < a < 3$
◇高一36 第 3 题	2004 年湖北卷（文）选择	改编：真题的 B 作 $x \leq 6$ ，本卷作 $x \leq 5$ ，答案由 $\{1, 4, 6\}$ 变为 $\{1, 4\}$ ；且由选择改成填空
◇高一36 第 13 题	2003 年上海卷（秋理）选择	原题照录（“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的什么条件； $r = 0.994$ 、最长公共子串 55 字，答案同为 D）。与高一17 第 7 题、高一20 第 15 题是 同一道真题的第三种

(续上表)

本库题目	出处	关系
◇高一36 第14题	2010 年福建卷（文）选择	原题照录（非空集合 $S = \{x \mid m \leq x \leq l\}$ 满足 $x \in S \Rightarrow x^2 \in S$ 的三个命题； $r = 0.963$ 、最长公共子串 38 字，答案同为 D）。真题作「如下三个命题」，可确证本卷题干的「四个命题」是笔误（见「高一36 专记」）
◇高一37 第8题	2009 年重庆卷（理）选择	改编：左侧 $ x + 3 - x - 1 $ 与真题一字未动（那正是本题的核心——左式最大值 4 的来源），右侧由 $a^2 - 3a$ 改为 $ a - 3 $ 、由选择改成填空，答案随之由「 $a \leq -1$ 或 $a \geq 4$ 」变为「 $a \leq -1$ 或 $a \geq 7$ 」。机判只报了「对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围为」这类套话串（ $r = 0.892$ ），但同源证据不止于此
◇高一37 第11题	2010 年四川卷（文）选择	原题照录（设 $a > b > 0$ ，则 $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值是——题干一字不差、答案同为 4，只去掉四个选项改成填空）。同卷（理）版是另一道题（条件作 $a > b > c > 0$ 、式子里多出 $-10ac + 25c^2$ 、答案 B），机判把它也报了一条，复核后判假命中、不计
■高一20 第8题	2023 年全国乙卷（理）选择	借同一对集合另问（真题 $U = \mathbb{R}$ 、 $M = \{x \mid x < 1\}$ 、 $N = \{x \mid -1 < x < 2\}$ 与问法「用交、并、补表示某个集合」都与本卷相同，只把所求集合换成 $\{x \mid x \geq 2\}$ ； $r = 0.727$ 、最长公共子串 22 字）
■高一21 第4题	2009 年上海卷（秋文）填空	改编（真题 $A = \{x \mid x \leq 1\}$ 、 $B = \{x \mid x \geq a\}$ 、 $A \cup B = \mathbb{R}$ 求 a ；本卷把端点与字母对调成 $A = \{x \mid x < a\}$ 、 $B = \{x \mid x \geq 1\}$ ，答案随之由 $a \leq 1$ 变 $a \geq 1$ 。 $r = 0.912$ 、最长公共子串 16 字。同题位另有一条 2007 福建卷（理）的机判候选，只共用 $A = \{x \mid x < a\}$ 与 $A \cup B = \mathbb{R}$ 的框架，见下面「①机判报了、但未计入」表）

(续上表)

本库题目	出处	关系
◇高一37 第 19 题	2005 年北京卷（春季·文/理）解答	改编：分子 920、分母 $v^2 + 3v + 1600$ 、第 (2) 问的设问与答案「 $25 < v < 64$ 」全同；唯一出入是第 (1) 问的作答要求由「精确到 0.1 千辆/小时」改为「保留分数形式」（答案随之由 ≈ 11.1 写成 $\frac{920}{83}$ ）。真题文、理两卷印的是同一道，故出处写作「文/理」

另有 1 道同定义但换了问法、未计入上表：高一02 第 3 题用了 2009 北京卷（文）「孤立元」的定义（改称「孤立元素」，并把问题简化成「给定 $A = \{1, 2, 3, 5\}$ 求其孤立元素」）。

存疑一条（未计入上表）：高一11 第 3 题「已知集合 $A = \{2, a\}$ ，且 $1 \in A$ ，则 $a =$ 」与 2026 上海卷（秋）填空 1「 $A = \{2, 1 + a\}$ ，且 $-1 \in A$ 」同构而数字全换。两条证据方向相反：①这个句式在 1952–2026 的全库里只出现这一次（正是 2026 秋），而本卷发布于高考后三个月，不能排除照当年高考题改写；②但「元素属于含参集合 $\Rightarrow$ 求参数」本身是教材同步练习的标准题型（人教 A 版《1.1 集合的概念》就有一道 $A = \{a - 2, 2a^2 + 5a, 12\}$ 、 $-3 \in A$ 的经典题），而这两道题都极简——都只含 2 个元素、都问 a ——更像是各自从同一常见题型简化而来。证据不足以断，故单列于此，不计入上面的 39 道。

其中 2010 上海秋理第 14 题这次以原卷原文核实过：题面是「从集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集，需同时满足① $\varnothing$ 、 U 都要选出②任意两个子集 A 、 B 必有 $A \subseteq B$ 或 $A \supseteq B$ 」，官方答案 36——与高一 b 第 11 题源码注记的记载一致（网上流传的「选出 2 个」版本是讹传）。

①机判报了、但未计入本表的题位（2026-09-28 建表：把题目溯源.py ①「与高考库比对」报过的 每一个本库题位都摊开判一遍并留档；判据是「共享的是那道真题的核心设定，还是通用句式」——前者登记进上表，后者记在这里。这张表已由 工具/计数核对.py 按 工具/真题命中清单.txt 守着，以后每轮跑完①若多出一个报过的题位，闸就会报错、逼人在这或上表里 disposition）：

机判报过的题位	机判出处	为什么不计入
高一02 第 18 题	2018 上海卷（春）填空	只共用 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$ 这个区间； B （真题是固定区间、本卷是含参）与问法都不同
高一04 第 15 题	1999 上海卷（文）、（理）解答	只共用「 $A \subseteq B$ ，求实数 a 的取值范围」这句套话
高一05 第 7 题	2007 北京卷（理）填空	只共用「若 $A \cap B = \varnothing$ ，则实数 a 的取值范围是」这句套话

(续上表)

机判报过的题位	机判出处	为什么不计入
高一06 第7题	2021 全国乙卷(理) 选择	借了真题第一集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1\}$ 的取法, 但 T 换了 $(2n - 1 \text{ vs } 4n + 1)$ 、问法也换(判 S 、 T 的包含关系 vs 求 $S \cap T$); 与已登记的高一17 第9题不是同一版
高一11 第4题	2001 新课标卷(文)、 2007 安徽卷(文) 选择	各只共用其中一个二次方程 $(x^2 + x = 0 \text{ / } x^2 = 1)$
高一11 第5题	2009 新课标卷(文)、 2009 海南宁夏新课标卷 (理)、2018 全国 II 卷 (文) 选择	只共用「已知集合 $A = \{1, 3, 5, \dots\}$ 」这个开头
高一11 第20题	2017 北京卷(文) 选择	只共用「集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \dots\}$ 」
高一15 第4题	2009 上海卷(秋文) 填空	只共用「且 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是」这句套话
高一19 第3题	2013 湖北卷(文)、2016 浙江卷(文)、2018 浙江 卷、2021 全国乙卷(文) 选择	只共用「已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 」
高一20 第3题	2007 北京卷(理) 填空	只共用「 $\emptyset$, 则实数 a 的取值范围是」这句套话
高一26 第7题	2019 江苏卷 填空	只共用「 $B = \{x \mid x > 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \cap B =$ 」
高一26 第8题	1999 上海卷(文) 解答	只共用「若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围」这句套话
高一28 第5题	2007 北京卷(理) 填空	只共用 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 \geq 0\}$ 这个常见集合
高一28 第18题	2007 上海卷(春) 填空	只共用「 > 0 的解集为 $(-\infty, \dots)$ 」
高一30 第19题	2017 北京卷(文) 选择	只共用「集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \dots\}$ 」(2026-09-25 那一轮已判过)
高一36 第9题	2014 浙江卷(文) 填空	只共用「已知实数 a 、 b 、 c 满足 $a + b + c = 0$ 」; 真题问的是平方和条件下的最值, 与本卷 $\frac{c}{a}$ 的范围无关(2026-09-26 那一轮已判过)
高一40 第9题	2012 福建卷(文) 填空	真题是 $x^2 - ax + 2a > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立、本卷是 $x^2 - ax - 2 < 0$ 在 $(1, 2)$ 内恒成立, 除套话外全不同(2026-09-27 那一轮已判过)

6 考据不出来的：绝大多数

把 30 份试卷里的自定义名词逐个在全库检索：

- **全库皆无**：闭集合、和谐集、好集、划分集、互斥子集、可积数集、二分划、三数循环、全食／偏食、高斯函数、单封集、**萌数**、**可分集合**、**破晓集**（高一 30 第 10 题；对加、减、乘都封闭的数集）、**变项和**（高一 30 第 11 题）、**交替和／交替积**（高一 30 第 21 题）。（这些名词在 1952–2026 的高考真题库里确实一次都没出现；但「检索不到」只等于「不是高考真题」——例如「和谐集」就已考据出非高考的出处，即上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷，见「附加题专查」；「萌数」也在**百度题库**里检到同题面，见「非高考但能考据到来源的题」。）
- **同名不同题**：「特征数」见于 2013 湖南卷（文）与 1977 江苏常州卷（前者的指子集的 0/1 指示数列，后者的含义与之也不同），与高一 07／高一 a 的「最大元素与最小元素之和」同名不同义。
- **「封闭集」那条要订正**（2026-09-15 重跑）：此前写「封闭集只与 2010 四川卷（文/理；定义是 $x+y, x-y, xy \in S$ ）借名不借题」——这条对 2010 四川卷而言仍是「借名」，但**高一 05 那道题的真正源头不是它**：高一 05 第 19 题（「性质 M 」）与高一 05 第 20 题（「封闭集」）、高一 12 第 21 题（「单封集」）同出一源，即**2009 北京卷（理）的「性质 P 」**（ $a_i a_j$ 与 a_j / a_i 至少有一个属于 A ）：05 第 19 题是它的乘除版，05 第 20 题与 12 第 21 题是它的加减版（ $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ ）。三者已改列入上面的出处表，此处不再算「考据不出来」。

也就是说，这些「新定义压轴题」**都不是高考真题**，应属校本自编，或取材自模考／竞赛／自招与教辅。

7 非高考但能考据到来源的题

高考真题库里查不到的题，有一部分能在**教辅/题库/校际试卷**里找到同题或同定义版本（2026-09-15 第二轮复核时逐题做了网络检索，取「同题面」或「同定义+同小问」为准）：

题	考据结果
高一11 第 21 题「闭集合」	教辅/题库常见题 ——「给定数集 M ，若对任意 $a、b \in M$ 有 $a + b \in M$ 且 $a - b \in M$ ，则称 M 为闭集合」这一题面（连同「 $C \cup D$ 是否一定为闭集合」这一小问）在百度文库、作业帮、青夏教育、百度题库都能检索到
高一a 第 15 题「性质 P 」 $(\text{card}(A + A) = \frac{n(n+1)}{2})$	菁优网收录同题 ：该站版本是 $A = \{1, 3, 5\}$ 、 $B = \{2, 4, 8\}$ 与 2021，本卷换成 $\{1, 4, 7\}$ 与 2022
高一06 第 14 题「好集合」	百度题库收录同题 ，且题库里有小问更多的完整版（如「若 $ S = 2019$ ，求证 S 中存在元素 m ，使 S 中所有元素均为 m 的整数倍」），本卷只取前两问
高一13 第 10 题「好子集」	菁优网收录同定义题 ：该站版本是 $I = \{1, 3, 5, 7\}$ ，本卷换成 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
高一02 第 6 题「伙伴关系集合」	教辅/题库常见题 ：作业帮、青夏教育、菁优网各有不同 M 的版本（ $\{-1, 0, \frac{1}{2}, 1, 2\} / \{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2\}$ 等），本卷用的是 $\{-1, 0, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\}$
高一22 第 16 题「萌数」	百度题库收录同题 ：该站的题面与三个条件（ $A、B、C$ 为 $M = \{1, 2, \dots, n\}$ 的三个非空子集且两两不交、并集为 M ； A 全奇、 B 全偶、3 的倍数都在 C ； $S_1 = S_2 = S_3$ ）及三小问（ $n = 10、n = 8、$ 证明 $n = 6k + 2$ ）与本卷 逐字相同 ——2026-09-16 复核本卷题面时检得（该站详情页需验证码，故只核到检索结果的题面片段，未取到原始出处与年份）

其余「真题库与网络都检索不到」的，是各卷的自编压轴与自编小题（如高一02 第 16 题只借用了「指示函数」这个集合论标准名词；高一15 附加 18、高一09 第 12 题「划分集」、**高一22 附加 17 / 18** 等整题无同题）。另有一处卷面小疵顺带记下：**高一02 第 15 题**的两个条件原卷编号印作「①」「④」（跳过②③），本稿照原卷录入、未擅改。

8 附加题专查（最早带附加题的五份 14 题）

本节逐题考据的是**最早带附加题的五份、合计 14 道**：高一 09（进才）、高一 a（大同中学）、高一 b（大同）、高一 15（七宝）、高一 22（七宝）。全稿现共 7 份卷带附加题、合计 22 道——另两份是 高一 35（七宝·抱孩子练习 9.22，附加 17—20）与 高一 39（大同·周末作业 4.1，附加 21—24），各 4 道；它们的考据见「高一 31—高一 36 专记」与「高一 37—高一 40 专记」（其中 高一 35 附加 17 题 = 2009 天津卷（理）已入「真题出处」表；高一 39 附加 21 题与高一 a 附加 2 题是同一道，故也是 **2010 湖南卷（文）** 填空 7 那道真题的一个题位——2026-09-28 补登进表，两处并见同题表与出处表）。「7 份 / 22 道」与本节这「五份 / 14 道」都已由 工具 / 计数核对 .py 按源码逐卷复算守住（原先这里写的是「全稿共 5 份 / 14 道」，那个「全稿」随加卷过期了）。其中 **高一 09 的附加题卷面上没有编号**（只印「附加题：」直接接题干，本稿按通例排成「1.」——已在下表注明），其余四份都另起编号或接续正文（高一 a 另起「1.」「2.」；高一 b 接续作 19—21；高一 15 与高一 22 都接续作 17—20）。十四题都在原图（高一 a / 高一 b 见 04.jpg，高一 09 见 07.png，高一 15 见第 6—7 页，高一 22 见第 5—7 页）上逐字核对过（高一 a 附加题第 2 题的下标 i 一处笔误已订正），2026-09-15 逐题考据如下（**高一 22 的四道是 2026-09-16 入库时补入的**）：

卷 · 题	内容	考据结果
09 附加题 (卷面无编号)	「和谐集」三小问（判断 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 、求证 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 、证明元素个数为奇数）	可确指校际试卷：同题见于《上海市上海中学东校 2023—2024 学年高一上学期数学期中试卷》——组卷网（21 世纪教育网）标注其来源为「(2023 高一上·上海市期中)」并直接引用该卷，同题另被《备考 2024 年高考数学优生冲刺专题特训》等收录。本卷三小问与该卷完全一致；高一 02 第 19 题是它的改编（改问「元素个数的最小值」）。真题库无
a 附加 1	「互斥子集」 $f(6)$	真题库无（参考库里的「互斥」7 条全是概率的「互斥事件」）。教辅/题库常见题（青夏教育、作业帮、百度题库、洛谷 T421094 均可检索到），但网上有两个版本：主流版作「视 (A, B) 与 (B, A) 为同一组」 $\rightarrow f(n) = \frac{3^n - 2^{n+1} + 1}{2}$ 、 $f(6) = 301$ ；本卷原卷作「当且仅当 $A = B$ 时...为同一组」（与洛谷 T421094 同），因 $A、B$ 非空且不交、 $A = B$ 不可能成立，等价于「两者总是不同组」 $\rightarrow$ 有序对 $\rightarrow f(6) = 602$ 。卷面蓝笔订正写的正是 602，本稿即按原卷口径给出

(续上表)

卷·题	内容	考据结果
a 附加 2	「第 k 个子集」(2 的幂编码), 问第 25 个子集	2010 湖南卷(文) 填空 7 (见出处表; 本条是 2026-09-15 新补出的漏检, 与高一 08 第 11 题同源、改法不同)
b 附加 19	$A \subseteq B \subseteq C \subseteq \{1, \dots, 2024\}$, 有序集合组的个数 4^{2024}	真题库 零命中 (16,273 道里连「有序集合组」或 $A \subseteq B \subseteq C$ 的结构都没有)。同类题的近亲是「 $A, B \subseteq C \subseteq \{1, \dots, 2020\} \rightarrow 5^{2020}$ 」, 见于 强基计划 题解 (博客园 «[强基]3, 有趣的集合个数算法») $\rightarrow$ 判为 强基/自招风格的计数题 + 校本改编 (上界改成 2024、条件收成链式包含)
b 附加 20	$M = \{1, \dots, 10\}$ 的非空子集按 $\sum (-1)^k k$ 求和, 总和 2560	真题库无; 与 高一 09 第 11 题 是同一道 (两版只换举例: 09 用 $\{1, 4, 7\} \rightarrow -4$, 大同用 $\{2, 3, 6\} \rightarrow 5$)。网络上 是教辅/题库常见题 : 青夏教育上至少三个版本, 分别叫「无名称」「 非常元素和 」「 独立和 」, 答案都是 2560
b 附加 21	四个有理数、两两乘积集合给定, 求四数之和 $\pm \frac{9}{4}$	真题库无; 同一道题 2015-09-13 见于 Math StackExchange (编号 1432967, 英文原题、未标出处, 两个解答给出的答案 $\pm \frac{9}{4}$ 与本稿一致), 百度知道亦有中文版 $\rightarrow$ 2015 年前已在网上流传的竞赛/自招风格组合题 , 确切出处考据不到
15 附加 17	「孤立元」($S = \{1, \dots, 8\}$ 的 3 元子集不含孤立元)	2009 北京卷(文) 填空 6 的原题照录 (见出处表; 与高一 06 第 9 题互为逐字同题)
15 附加 18	$A \cap B = \emptyset, M = \{T \mid T \subseteq A\}, P = \{S \mid S \subseteq B\}$, 求 $M \cap P$ (答 $\{\emptyset\}$)	真题库 零命中 (LCS = 0), 网上亦检索不到 $\rightarrow$ 附加题里检索不到同题的一道 (幂集交为 $\{\emptyset\}$ 的辨析小题); 22 附加 17/18 同样检不到原式 , 但那两道的 题型 在教辅里常见, 本题连题型都无同题
15 附加 19	$A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$, 写出所有满足集合 A 的偶数 (答 $4k$)	真题库无; 教材/教辅常见题 (百度题库、作业帮、青夏教育都有「 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2\}$ 」的同型题, 其中一份标为「高一上学期数学期末考试试卷第 73 套真题」)。与 高一 13 第 18 题是同一个 A ——那版是三小问 (判断 8, 9, 10、证必要非充分、求所有偶数), 本卷只留最后一问的结论

(续上表)

卷·题	内容	考据结果
15 附加 20	n 元「调和子集」($a_1 + \cdots + a_n = a_1 \cdots a_n$), 求自然数集 $\mathbb{N}$ 的 3 元调和子集 (答 $\{1, 2, 3\}$)	真题库无; 是教辅/题库里「好集」那道题的改名版——青夏教育、作业帮上的同题作「若 $a_1 + \cdots + a_n = a_1 a_2 \cdots a_n$, 则称集合 A 是集合 M 的 n 元‘好集’」。注意与高一 08 / 高一 14 那道同名的「好集」, 其定义 ($0, 1 \in A$; $x - y \in A$; $x \neq 0$ 时 $1/x \in A$) 完全不同: 同名两义, 本卷改称「调和子集」反倒避开了撞名
22 附加 17	方程 $x^2 - (2m - 2)x + 5m + 8 = 0$ 的两个解是直角三角形两直角边的长、斜边长为 10, 求 m (答 8)	真题库零命中。命制思路是两步套: 用韦达定理得 $x_1 + x_2 = 2m - 2$ 、 $x_1 x_2 = 5m + 8$, 再由 $x_1^2 + x_2^2 = 100$ 联立——解得 $m = 8$ 或 $m = -\frac{7}{2}$, 还用「两解皆正」舍去后者, 这是本题的实际难点 (原卷只给答案 8、未展开)。网络检索未找到含这组系数的原式 («二次方程两根作直角三角形两直角边» 这一题型本身常见, 但换一组系数即无从比对), 判为校本编写或改编
22 附加 18	$M = \{(x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = a + 1\}$ 、 $T = \{(x, y) \mid (a^2 - 1)x + (a - 1)y = 15\}$, $M \cap T = \emptyset$ 求 a (答 ± 1 、 -4 、 $\frac{5}{2}$)	真题库零命中。设计点在「 M 是挖掉 $(2, 3)$ 的直线」——四组解各有来历: $a = 1$ 时 $T = \emptyset$, $a = -1$ 时 M 与 T 是两条平行线, $a = \frac{5}{2}$ 与 $a = -4$ 两组的交点恰好落在被挖掉的 $(2, 3)$ 上。网络检索未找到问题 («含参直线与挖点直线求交» 是教辅里成体系的一类, 但本组系数与问法无对应版本), 判为校本编写
22 附加 19	有限集合的基数 card 四条命题, 问真命题序号 (答①②)	2006 年湖北卷 (理) 选择原题照录 (见「真题出处」表): 四条命题与真题相同、答案同为①②; 差别只有两处表述——第③条真题印 $\not\subset$ 的符号写法、本卷写成文字「 A 不是 B 的子集» (同义), 以及由选择改成了填空

(续上表)

卷·题	内容	考据结果
22 附加 20	$M = \{930, -5, -1, 0, \pi\}$ 的 31 个非空子集各自的元素乘积之和 (答 -1)	真题库零命中。是「含 0 与 -1 的集合配成相反数对」这一经典构造：含 0 的 16 个子集贡献全为 0，剩下的按「含不含 -1 」两两配对、乘积互为相反数，最后只剩 $\{-1\}$ 一个。网上同型题很多——洛谷 U657612 是它的程序化推广 (题面自述「做到一道题……把题面推而广之」，样例元素即取 0 与 -1)，故判为教辅/题库常见题 + 校本换元素 (把常见的 $1 \sim n$ 换成 $930, -5, \pi$ 这类彼此无关的数)

小结：十四道附加题里能直接对上高考真题的有三道 (22 附加 19 = 2006 湖北卷 (理) 原题照录、15 附加 17 = 2009 北京卷 (文) 原题照录、a 附加 2 = 2010 湖南卷 (文) 改编)，一道可确指校际试卷 (09 附加题 = 上海中学东校 2023-2024 学年高一上期中卷，大同那份是它的改编)，五道在教辅/题库里有迹可循 (a 附加 1、b 附加 20、15 附加 19、15 附加 20、22 附加 20)，b 附加 19 与 b 附加 21 的最近亲分别是强基计划题解与 2015 年就在网上流传的竞赛/自招组合题，22 附加 17/18 与 15 附加 18 则连网络检索都找不到同题 (前两道检不到的是原式、题型在教辅里常见，15 附加 18 连题型都无同题)。这与「附加题 = 压轴拔高」的定位吻合：各校多从题库、强基/自招题、校际试卷与真题改编里挑。

2026-09-16 订正：本小结原写「十道附加题没有一道是高考真题」，与其后紧跟的「两道能直接对上真题」自相矛盾 (15 附加 17 正是 2009 北京卷 (文) 的**原题照录**)。并入高一 22 时一并按实改写：上表里能对上真题的是**三道** (两道原题照录 + 一道改编)，并非「零道」。

9 方法与局限

- 方法：把题目脱去 LaTeX 与标点做「骨架」文本 → 6-gram 倒排索引全召回 → 最长公共子串 + 整段相似度判定 → 人工复核高置信项。参考实现已随仓库提交：papers/工具/题目溯源.py (python3 题目溯源.py 全跑即抽取两库并比对；判据、阈值与踩过的坑都写在文件头注释里，中间结果落在系统临时目录，不污染仓库)。两个判据要一起看：长题靠「最长公共子串 ≥ 12 」，短题（如一句式的选择题）最长串天然长不了，靠「整段相似度 ≥ 0.71 」补上。上表 29 条对应里，高一 08 第 11 题、高一 a 第 4 题与高一 b 第 7 题、高一 03 第 12 题都是只靠后者才捞出来的。
- 两处实现细节（2026-09-15 重跑时踩到）：①本库那侧要先剥 % 注释再按 \item 切分——源码注释里会出现字面 \item（如「在其 \item 前先量一下版面」），留着会被当成一道题，实测让高一 12 多出一道假题、题号整体后移一位；②归一化时 \cap \cup \subseteq \varnothing \mid 必须先换成字符再剥命令（否则剥成空串，见下条），且选项文字也会制造假阳性——高一 c 第 13 题 × 高一 13 第 13 题的 LCS 达 27，公共串却是四个选项的套话「充分不必要 / 必要不充分 / 充要 / 既不充分也不必要」，并非同题；③记号的字母不同也会把公共串切断——高一 a 附加题第 2 题与 2010 湖南卷（文）填空 7 的定义本该逐字相同，只因一个写 $\{a_{i_1}, \dots\}$ 、另一个写 $\{a_{b_1}, \dots\}$ （外加集合名 M 与 E 不同），最长公共子串被切到只有 10 字、 $r = 0.596$ ，两项判据双双落在线下，是靠「同一道真题的两种改编」这条内容线索才捞回来的（已补进出处表与手工补记）。字母级别不同的问题，一定要人工过一遍。
- 两个曾导致漏检的口径陷阱（已修，记此备查）：①两边必须用同一套归一化——参考库那侧若只做骨架化、不先剥 LaTeX 命令，\operatorname{card} 会留下 operatornamecard 这类残渣，与已经剥干净的高一文本对不上，实测把同一道题的相似度从 38 压到 12；②预筛不能用「共享片段数 top-K」截断，候选一多真匹配就会被挤出榜外。
- 题号口径：一律按卷面实际编号（源码里靠 \setcounter{enumi} 还原，与 \item 的先后顺序不同）；附加题也照卷面——高一 b 接续正文作 19—21、高一 15 与高一 22 都接续作 17—20、高一 a 另起编号作「1.」「2.」，而高一 09 卷面根本没有编号（只印「附加题：」，本稿按通例排成「1.」），故本稿一律称它「09 附加题」，不写作「09 第 22 题」。引用出处时同理：不能用 \item 的出现次序编号。比对前会把参考库里个别「答案/解析被误排进 problem 块」的条目先截断，否则会压低整段的相似度而漏检。
- 原图核对：跨卷同题的旧一轮 46 道成员逐题对照 原图/里的原卷图核过一遍（不只核题干，连集合的端点开闭、条件用的是 $\cap$ 还是 $\cup$ 、答案的方括号都逐字比对）。这轮核出 5 处转录错误（见前面订正清单第 7—11 条），全部是「解析对、题干或 \ans 错」这一类——因为解析是从原卷整段抄的，抄错的多在需要转写的地方。骨架文本比对查不出这类错（\cap、\cup、\subseteq 脱去 LaTeX 后都变成空串），必须回原图。新增的 6 道成员（高一 14 第 20 题，高一 15 第 14 / 16 / 17 题，高一 12 第 3 / 4 题）属于高一 12 / 13 / 14 / 15 / 17 五份，已在 2026-09-15 那轮整卷回原图核对里逐字比过（见专记）。2026-09-15 未并入高一 19—21 后，两档新增或改判的每一对又都回原图核了一遍（逐字档 10 个题位、变体档 8 个题位），本轮没有查出转录错误，但查出一对假同题——见下条。

- **骨架里没有图形，图形题必须单独看图（本轮新增的教训）：**高一08第15题 × 高一19第7题两边的题干几乎一字不差（都是「 M 、 P 、 S 是 X 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是」， $r = 0.857$ ），骨架判据因此把它判成逐字同题。可回原图一看——**图形配置不同**：08版 S 内含于 P 、阴影是 $(M \cap P) \setminus S$ （选C），19版 P 内含于 S 、阴影是 $(M \cap S) \setminus P$ ——**不是同题**，已从两档剔除。凡题干高度相同而含「如图/图中」的配对，都要把两边的 figures/venn_*.png 并排看一遍再定档。
- **选择题的选项不计入骨架（2026-09-15 补跑高一10时落实）：**四个选项（「A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件」）是**跨题复用的套话**，留在骨架里会让两道毫不相干的选择題凭选项文字拿到 LCS 27–30 的假命中——下一条「制造假阳性」记的就是这个坑。补跑时先在骨架里按行首「A.」把选项切掉，逐字档的分组才稳定（本次据此剔除了1组纯选项命中）；上表24组 = 上一轮人工核定的15组 + 补跑高一10新增的2组
 - 2026-09-15 末并入高一19–21后新增或改判的7组。
- **纯数字的公共串不算文本证据：**候选取线（LCS ≥ 12 字）本身很松，元素表一类的数字串（=1,2,3,4,5,6,7）就能凑够12字。故判「逐字同题」时还要求**公共串里至少8个汉字**，变体档与符号档则要求**公共串里含「内容字符」**——汉字、拉丁字母或关系符号三者有一个即可（2026-09-15 末把「至少1个汉字」放宽成这个口径，纯数字串仍被挡掉，但 $B=\{x|x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$ 这类全符号的公共串不再误伤），这一条也正是「高一10全部19题无真题」这个结论的判据（它最好的几个匹配都栽在这一条）。
- **通用句尾也会凑出够长的公共串，机械结果必须人工过一遍：**像「则实数 m 的取值范围是」「求实数 a 的取值范围」这类**题干套话**，LCS 轻松到15–16字、汉字数也够——它只是「含参求范围」这一大类的共同句尾，并非同题。2026-09-15 补跑高一10时机械跑出4对这样的「变体」（与11#11、12#4、13#3、13#5，LCS 15–16、 $r \leq 0.59$ ），逐条看过**都不算**，故未收进变体表；下表12组都是「换了数字或设定但题干骨架高度相同」的那一类。**2026-09-15 末这条判据本身也修了**（见上面「下一条」与本节末）：原先变体档写的是「子串 ≥ 12 且含 ≥ 8 个汉字，或 $r \geq 0.72$ 且含 ≥ 5 个汉字」——**前半句没有 r 门**，于是「则实数 a 的取值范围是」这类套话只要凑够12字、8个汉字就被判成变体（ r 低到0.380）；同时它又只有正文档、没有符号档，把02#17 × 05#17（ $r = 0.933$ ）、03#12 × 09#7（ $r = 0.800$ ）这类**公共串里一个汉字都没有**的真变体挡在门外。现改成 README 本来写的那条合取式「 $r \geq 0.71 \wedge$ 子串 $\geq 12 \wedge$ 公共串含内容字符」，两头都顺了：套话被 r 门挡掉，符号题被内容字符闸放行。
- **两路补扫（2026-09-15 第二轮）：**判据（LCS + 整段相似度）对换了数字或字母的同题天生不敏感，故补了两路——①**数字脱敏**：把两边骨架里的阿拉伯数字全部抽掉再比一次，专找「同结构、换数字」的改编，揪出了高一02第15题（2012江苏卷、 $2x \rightarrow 3x$ ）与高一09第15题（2017江苏卷、 $a^2 + 3 \rightarrow a^2 + 1$ ）；②**自定义名词检索**：把每题「称...为「X」」里的名词抽出来逐个在参考库正文里做字符串检索，揪出了高一17第11题（「数域」= 2008福建卷（文/理））——该题定义与真题实质相同、四个命题全换，LCS 只有11、 r 也低，判据完全看不见。启示：**同题检测不能只看一处最长连续子串，还得看「数字/字母之外的骨架」与「概念名」这两路。**

- **局限 1**：参考库只含**高考真题**，不含模考、竞赛与教材习题，所以「检索不到」只能说明「不是高考真题」，**不能据此推断为自编**（见「非高考但能考据到来源的题」一节：闭集合、性质 P 、好集合、好子集、伙伴关系集合等都能在教辅/题库里找到问题）。
- **局限 2**：同模板换数字的改编题，机器判定边界模糊；出处表的 **29 条对应（27 道真题）**均已逐条核对原文（含数学符号的具体取值与选项文字），但仍有判断余地。「跨卷同题」同理——组数随判据松紧而变，本稿把两档分开列（逐字 24 组 / 同模板变体 12 组），只取可确证的；分数低于变体线、但读过原文可确证的 7 对，另列「判据之外手工补记」。「存疑」单列的那一条也属此类——判据给不出结论，留给读者自己判断。
- **短题要补看整段相似度**：一条式选择题的骨架往往不足 25 字，只用「最长公共子串 ≥ 25 」会把**整组漏掉**——高一 a 第 5 题 $\times$ 高一 b 第 8 题（改写自同一道，相似度 1.000）当初就是这么漏的。故判据里并上「整段相似度 ≥ 0.95 」，变体档则用「 ≥ 0.71 且最长串 ≥ 12 且公共串含内容字符」。每一条路径都写死「最长串 ≥ 12 」——比对前的 12-gram 预筛丢掉的正是「最长串 < 12 」的对，两者口径必须一致，否则会出现「 r 够但这道题根本没进候选池」的漏检（2026-09-15 末修的就是这一处：原先「 $r \geq 0.95$ 」那条没有长度下限，与预筛互相矛盾）。0.71 不是随手取的：表内最低那对是「全食／偏食」 $r = 0.7129$ ，而它往下一直到 $r = 0.6957$ 才有下一个候选（一对纯套话），**0.696–0.713 这一段是空的**，线落在这一档里哪个位置都一样。
- **阈值压到底是什么样**（记下边界在哪；下面这组数字是 **12 份**那一轮跑的，17 份重跑后的对应数字附在本条末尾）：把判据放宽到「相似度 ≥ 0.50 」，跨卷配对由本稿收的二十几对涨到 **646 组**，但**最长公共子串**把它切成两半——LCS ≥ 11 的只有 **56 对**，LCS 9–10 一档就骤增到 **123 对**，这个跳变就是边界：
 - LCS ≥ 11 (56 对)：本稿列的 **28 对**（逐字 18 + 变体 10）全在里面，已占一半；剩下 28 对逐条看过，**8 对是判据漏掉的真问题、分属 3 个模板**——5 对是上面那个「含参二次方程」大族的边（高一 02 第 17 题配 07／08／09／11 那四份，再加 高一 05 第 17 题 $\times$ 高一 09 第 19 题； $r = 0.660 \sim 0.815$ ，LCS 全卡在 11），另 3 对见上文「判据之外手工补记」（该节共 4 对，第 4 对连 $r \geq 0.50$ 都没到，不在本档）；其余 **20 对**的公共串清一色是不含题意的套话（「则实数 a 的取值范围是」之类）；
 - LCS 9–10 (123 对) 里 $r \geq 0.80$ 的只剩 **2 对**：高一 05 第 5 题 $\times$ 高一 08 第 7 题（含参区间包含关系的繁简两版）和 高一 04 第 15 题 $\times$ 高一 09 第 19 题（即上面那族的反向形式）；其余都在 0.80 以下；
 - LCS ≤ 8 ：只是共享套话（「已知集合...，则实数 a 的取值范围是」）。注意**整段相似度在短题上会骗人**——高一 07 第 4 题 $\times$ 高一 b 第 8 题的 r 高达 0.783，LCS 却只有 4，是两句都短的缘故，属同题型巧合。所以本稿取 LCS ≥ 12 为线、并给变体档留了整段相似度这一条补充，不再往下压。**17 份重跑后的同一档数字**（2026-09-15，跨卷 45,150 对里取 LCS ≥ 8 的 936 对）：LCS ≥ 12 共 **71 对**、LCS ≥ 11 共 **91 对**（其中 $r \geq 0.80$ 的 22 对），LCS 9–10 骤增到 **346 对**、 $r \geq 0.80$ 的一对也没有——跳变仍在同一处，判据不用改。