
A
Clinical profile composition of CGM groups
ARI 0.039 [0.020, 0.068]
G1 (n = 188) lower, 120 mg/dL
G2 (n = 182) intermediate, 147 mg/dL
G3 (n = 88) higher, 185 mg/dL
85 (45%)
66 (35%)
37 (20%)
82 (45%)
28 (15%)
72 (40%)
25 (28%)
17 (19%)
46 (52%)
C1
C2
C3
Clinical profile
Participants within CGM group (%)
60
40
20
0
B
Clinical differences across CGM groups
Age
BMI
Waist-to-hip ratio
TG/HDL ratio
C-peptide
0.00
0.05
0.10
Rank-based effect size (η²)
separate scale, 0.30 to 0.55
HbA1c
0.3
0.4
0.5
Rank-based effect size (η²)
C
Prediction of clinical profiles
Macro AUROC (cross-validated)
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
Paired gain in AUROC +0.055 [0.017, 0.094]
0.605
0.649
0.660 (no stored CI)
Chance (0.50)
HbA1c alone
CGM alone
HbA1c + CGM
D
Prediction of clinical variables from CGM
Age
BMI
Waist-to-hip ratio
TG/HDL ratio
C-peptide
HbA1c
0.0
0.2
0.4
0.6
Cross-validated R² [95% CI]