Statistische Ergenschaffen von Schätzern	
Dy.: 1) Die ZV & = & (X, x) hußt Châtre tris den	
Parameter In fall it : X - F = R	
2) Deight crwartungstren fix D, Pall Fix all DED	
(asymptotisch)	
2) I heißt convartungstru für I , Palls für alle I & H	
$\mathcal{E}_{\mathfrak{G}} \hat{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}_{\mathfrak{G}} \left(\mathcal{E}_{\mathfrak{G}} \hat{\mathfrak{G}}_{\mathfrak{G}} \right) $	
3) Gilt zurätzhel Varp V = 0 für alle de d, 10	
hyst ô (varianz-) konsistent fix d.	
By. 1) Mitt chwest X ober 7 Ven Xn, Xn 15 f crowstungs	, –
true Schätze für den Erwartungwert n.	
truer Schätzer für den Erwartungwert n. En 7 50, pr für alle pe R, und konsistenter	
Schätze für p : $Var_{p}X = \frac{5^{2}}{n} = \frac{5^{2}}{n} = 0$ (für $6^{2} \in [0,\infty)$)
2) Emp. Vourant 52 der Hen My. Kn est wartungs.	
trener und kousistanter Schätzer für du Varianz 62 der	
2V X,, X,: E5252 = 52 fin alle 62 4. Vov252 horse 0	