Hemofilie

Hluboká 2015




Příčina choroby


- Hemofilie A deficit faktoru VIII
- Hemofilie B deficit faktoru IX

- Dědičnost vázaná na chromozom X
- XhY hemofilik
- X^hX^h hemofilička
- XhX přenašečka

Struktura faktorů



Struktura faktoru VIII



Léčba

Substituční léčba

- On demand
 - Léčba jen při krvácení
 - Vhodné hlavně pro starší hemofiliky s již existujícím kloubním postižením
- Preventivní
 - Pravidelná aplikace 3x týdně (u hemofilie B 2x týdně)
 - Jasná volba pro těžké hemofiliky před rozvojem těžké artropatie

Léčba

Historický vývoj

- Burské oříšky apod.
- Substituční léčba
 - Čerstvě zmražená plazma
 - Kryoprecipitát koncentrát faktoru VIII "manufakturní" výroba
 - Koncentráty průmyslově vyrobené od zdravých dárců
 - Koncentráty průmyslově vyrobené od zdravých dárců, protivirově ošetřené

Léčba

Současnost

 Rekombinantní faktor VIII – vyrobený bez potřeby použití dárcovské plazmy

Blízká budoucnost

- Rekombinantní faktory s prodlouženým poločasem
 - U hemofilie A aplikace cca. 2x týdně
 - U hemofilie B aplikace cca. 1y týdně
 - S.c. (pod kůži) podávané faktory

Vzdálená budoucnost

U hemofilie B genová manipulace

Současná praxe

- Hemofilik, který byl v dětství na profylaktické léčbě na ní zůstává
- Hemofilik s cílovým kloubem target joint vždy individuální domluva, často léčba on demand s dočasnou profylaxí dle aktuálního stavu
- Hemofilik po náhradě kloubu vždy se snažíme přejít na profylaktickou léčbu

Další vývoj

- Rekombinantní faktory s prodlouženým poločasem jistě usnadní profylaktickou léčbu
 - Budeme častěji doporučovat operace cílových kloubů s následnou profylaxí
 - I bez operací předpokládáme vyšší podíl hemofiliků na profylaktické léčbě
- Časový odhad za 2-3 roky

Další opatření

Životní styl

- Přiměřená pohybová aktivita
 - Příliš vysoké zatížení zvyšuje riziko krvácení
 - Dobrá fyzická kondice chrání klouby

Kvalitní rehabilitace

- Dojde-li ke krvácení, snižuje negativní důsledky pro hybnost kloubu
- Vyváženě utvářená svalovina chrání klouby

Další opatření

- Doplňkové léky
 - Napomáhají srážení krve, dočasně mírně zvyšují hladinu faktoru VIII, zmenšují otok – jen malý význam
 - Léky proti bolesti pozor na návyk
- Operační zákroky
 - Kloubní náhrady
 - Krvavá synovectomie
- Radiační synovectomie

Děkuji za pozornost