

第八讲：求解 $Ax = b$ ：可解性和解的结构

举例，同上一讲： 3×4 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 8 & 10 \end{bmatrix}, \text{ 求 } Ax = b \text{ 的特解:}$$

写出其增广矩阵 (augmented matrix) $\left[A \mid b \right]$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 & b_1 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & b_2 \\ 3 & 6 & 8 & 10 & b_3 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{消元}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 & b_1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 - b_1 \end{array} \right]$$

显然，有解的必要条件为 $b_3 - b_2 - b_1 = 0$ 。

讨论 b 满足什么条件才能让方程 $Ax = b$ 有解 (solvability condition on b)：当且仅当 b 属于 A 的列空间时。另一种描述：如果 A 的各行线性组合得到 0 行，则 b 端分量做同样的线性组合，结果也为 0 时，方程才有解。

解法：令所有自由变量取 0，则有 $\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 1 \\ 2x_3 = 3 \end{cases}$

，解得

$$\begin{cases} x_1 = -2 \\ x_3 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

，代入 $Ax = b$ 求得特解

$$x_p = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

令 $Ax = b$ 成立的所有解：

$$\begin{cases} Ax_p = b \\ Ax_n = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{两式相加}} A(x_p + x_n) = b$$

即 $Ax = b$ 的解集为其特解加上零空间，对本例有：

$$x_{\text{complete}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

对于 $m \times n$ 矩阵 A ，有矩阵 A 的秩 $r \leq \min(m, n)$

列满秩 $r = n$ 情况：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

， $\text{rank}(A) = 2$ ，要使 $Ax = b$, $b \neq 0$ 有非零解， b 必须取 A 中各列的线性组合，此时 A 的零空间中只有 0 向量。

行满秩 $r = m$ 情况:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & 5 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

, $\text{rank}(A) = 2$, $\forall b \in R^m$ 都有 $x \neq 0$ 的解, 因为此时 A 的列空间为 R^m , $b \in R^m$ 恒成立, 组成 A 的零空间的自由变量有 $n-r$ 个。

行列满秩情况: $r = m = n$, 如

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

, 则 A 最终可以化简为 $R = I$, 其零空间只包含 0 向量。

总结:

$r = m = n$	$r = n < m$	$r = m < n$	$r < m, r < n$
$R = I$	$R = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix}$	$R = [I \quad F]$	$R = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
1 solution	0 or 1 solution	∞ solution	0 or ∞ solution