

第一章線形代数

1) ベクトル

スカラー：普通の数のこと

ベクトル：「大きさ」と「向き」のセット。スカラーを $1 \times n$, または $n \times 1$ で並べたもの

2) 行列

行列：ベクトルを $n \times m$ で並べたもの。

3) 連立1次方程式と線形計算

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ 2x_1 + 5x_2 = 5 \end{cases} \quad \text{を行列で表すと、} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{となる}$$

4) 行列式

・行列式

逆行列を持つか持たないかを判別する式のこと

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 \\ \vec{v}_2 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{v}_1 \\ \vec{v}_2 \end{vmatrix} \quad \text{の面積を} \quad \text{と表し、これを行列式という}$$

・行列式の求め方

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

複雑な場合

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

5) 固有値・固有ベクトル

・固有値・固有ベクトルとは

行列 A とベクトル x の積が、スカラー λ とベクトル x との積と同じ値になるときの λ を固有値、 x を固有ベクトルという

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

・固有値分解とは

正方形の行列 A を 3 つの行列の積に変換すること

行列 A が、固有値 λ と固有ベクトル V をもったとしたとき、

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix} \quad V = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots \end{pmatrix}$$

$$AV = V\Lambda \quad \text{と関連付けられるので、これを变形すると、} \quad A = V\Lambda V^{-1} \quad \text{となる。}$$

固有値分解の利点は、行列に累乗の計算が容易になること。

6) 特異値・特異値ベクトル

正方形以外の行列 A を固有値分解すること

$$M\vec{v} = \sigma\vec{u}$$

$$M^T\vec{u} = \sigma\vec{v}$$

転置行列：行列の行と列を反転させた行列のこと

$$M^T \quad \text{と表記する}$$

特異値は、 $\sigma_1 > \sigma_2 > \dots > 0$ となる