

B

注: 平时成绩满分 20 分, 占总成绩的 20%, 本试卷满分 100 分, 占总成绩的 80%.

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x) = \frac{(1-x)\tan x}{|x|(x^2-1)}$, 则 (B).
 A. $x = \frac{\pi}{2}$ 是 $f(x)$ 的振荡间断点 B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点
 C. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点 D. $x = 1$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点
2. 设 $\sin x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int xf(x)dx =$ (B).
 A. $x\cos x + \sin x + C$ B. $x\sin x + \cos x + C$
 C. $x\cos x - \sin x + C$ D. $x\sin x - \cos x + C$
3. 下列反常积分中, 收敛的是 (A).
 A. $\int_0^{+\infty} e^{-3x} dx$ B. $\int_0^{+\infty} \cos x dx$
 C. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ D. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$
4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^{2025} + \sin^4 x) \cos x dx =$ (C).
 A. 0 B. $\frac{1}{5}$
 C. $\frac{2}{5}$ D. 1
5. 设 $f(x) = (1 + \sin^2 x)^{\tan x} - 1$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的 (A).
 A. 3 阶无穷小 B. 2 阶无穷小
 C. 等价无穷小 D. 同阶但非等价无穷小

二、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+b\sin^2 x} - a}{x^2}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a+b =$ 5 .
2. 设函数 $y = x^2(x+1)^3(x-1)$, 则 $dy|_{x=1} =$ 8dx .
3. 曲线 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$ 的拐点为 (1, 1) .
4. 设函数 $f(x) = (2x^2 + x + 3)\sin x$, 则 $f^{(6)}(0) =$ 6 .
5. 计算心形线 $\rho = 1 - \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 所围平面区域的面积 $\frac{3}{2}\pi$.

三. (10 分) 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1-\sin x}}{x^2 \ln(1+x)}, & x \in (-1, 0) \cup (0, 1] \\ b, & x = 0 \end{cases}$ 是连续函数, 求常数 b .

解: $b = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ (1 分) $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x) - (1-\sin x)}{x^2 \ln(1+x)(\sqrt{1-x} + \sqrt{1-\sin x})}$ (2分)

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1-x} + \sqrt{1-\sin x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ (2分) $= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2}$ (3分)

$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = -\frac{1}{12}$ (2 分)

四. (10 分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{3x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 确定, 求 $y(0), y'(0), y''(0)$.

解: 代入 $x=0$ 得 $y(0)=1$. (2 分)

方程两边分别关于 x 求导, 得 $e^{3x+y}(3+y') + \sin(xy)(y+xy') = 0$, (2 分)

将 $x=0, y(0)=1$ 代入得 $y'(0)=-3$. (2 分)

再分别关于 x 求导, 得 $e^{3x+y}(3+y')^2 + e^{3x+y} y'' + \cos(xy)(y+xy')^2 + \sin(xy)(2y'+xy'') = 0$, (2 分)

将 $x=0, y(0)=1, y'(0)=-3$ 代入得 $y''(0)=-e^{-1}$. (2 分)

五. (12 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = B$, B 为常数.

(1) 求 $g'(x)$.

(2) 讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解: (1) 由题设, 知 $f(0)=0, g(0)=0$, (2 分)

令 $u = xt$, 得

$$g(x) = \frac{\int_0^x f(u)du}{x}, x \neq 0. \quad (2 \text{ 分})$$

而

$$g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)du}{x^2}, x \neq 0. \quad (3 \text{ 分})$$

由导数的定义有

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{B}{2}. \quad (2 \text{ 分})$$

综上所述 $g'(x) = \begin{cases} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)du}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{B}{2}, & x = 0 \end{cases}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{x^2} = B - \frac{B}{2} = \frac{B}{2} = g'(0).$

从而得知 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续. (3 分)

六.(10分) 设 $f(u)$ 在 $-\infty < u < +\infty$ 内可导, 且 $f(0)=1$, 又 $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1 \\ \sqrt{x}, & x > 1 \end{cases}$,

求出 $f(u)$ 在 $-\infty < u < +\infty$ 的表达式.

解: 令 $\ln x = u$, 则 $x = e^u$, $f'(u) = \begin{cases} 1, & u \leq 0 \\ \frac{u}{e^2}, & u > 0 \end{cases}$ (3分)

两边同时取不定积分, 得

$$f(u) = \begin{cases} u + C_1, & u \leq 0 \\ \frac{u^2}{2e^2} + C_2, & u > 0 \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

而 $f(u)$ 可导, 一定连续, 所以, $\lim_{u \rightarrow 0^+} f(u) = \lim_{u \rightarrow 0^-} f(u) = f(0) = 1$, 从而 $C_1 = 2 + C_2 = 1$, (2分)

装

$$\text{故 } f(u) = \begin{cases} u + 1, & u \leq 0 \\ \frac{u^2}{2e^2} - 1, & u > 0 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

七.(10分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1 + \cos x}, & -1 < x < 0 \end{cases}$, 计算 $\int_1^3 f(x-2)dx$.

解 设 $x-2=t$, 则 $\int_1^3 f(x-2)dx = \int_{-1}^1 f(t)dt$ (2分) $= \int_{-1}^0 f(t)dt + \int_0^1 f(t)dt$ (2分)

订

$$= \int_{-1}^0 \frac{1}{1 + \cos t} dt + \int_0^1 t e^{-t^2} dt = \tan \frac{x}{2} \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{2} e^{-t^2} \Big|_0^1 \quad (2 \text{ 分} + 2 \text{ 分}) = \tan \frac{1}{2} - \frac{1}{2e} + \frac{1}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

八.(12分) 已知 $0 < k < 2$, 将直线 $y=kx$ 与曲线 $y=x^2$ 所围成平面图形面积记为 $S_1(k)$. 将直线 $y=kx$ 与曲线 $y=x^2$ 及直线 $x=2$ 所围成的曲边三角形面积记为 $S_2(k)$

(1) 求 k , 使 $S_1(k) + S_2(k)$ 取得最小值.

(2) 求在该最小值下, $S_1(k) + S_2(k)$ 所对应的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

解: (1) 直线 $y=kx$ 与曲线 $y=x^2$ 的交点 (k, k^2) (1分)

线

$$S_1(k) = \int_0^k (kx - x^2) dx = \left[\frac{1}{2} kx^2 - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^k = \frac{1}{6} k^3$$

$$S_2(k) = \int_k^2 (x^2 - kx) dx = \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} kx^2 \right]_k^2 = \frac{8}{3} - 2k + \frac{1}{6} k^3 \quad (4 \text{ 分})$$

令 $S(k) = S_1(k) + S_2(k) = \frac{8}{3} - 2k + \frac{1}{3} k^3$ 则 $S'(k) = -2 + k^2$, 解 $S'(k) = 0$ 得唯一驻点 $k = \sqrt{2}$, 即当 $k = \sqrt{2}$ 时, $S_1(k) + S_2(k)$ 取得最小值; (3分)

$$(2) V = \int_0^{\sqrt{2}} \pi(2x^2 - x^4) dx + \int_{\sqrt{2}}^2 \pi(x^4 - 2x^2) dx = \frac{16}{15}(\sqrt{2} + 1)\pi \quad (4 \text{ 分})$$

九. (6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续, 在 $(0,3)$ 内可导, 且满足 $f(0)+f(1)=2\int_2^3 f(x)dx$, 证明:
至少存在一点 $\xi \in (0,3)$, 使得 $f'(\xi)=0$.

证明: 因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上存在最大值 M 和最小值 m ,

于是 $2m \leq f(0)+f(1) \leq 2M$, $m \leq \frac{f(0)+f(1)}{2} \leq M$, 由介值定理知, 存在 $\xi_1 \in [0,1]$, 使得

$$f(\xi_1) = \frac{f(0)+f(1)}{2}. (2 \text{ 分})$$

再由积分中值定理, 存在 $\xi_2 \in [2,3]$, 使得 $f(\xi_2) = \int_2^3 f(x)dx = \frac{f(0)+f(1)}{2}$. (2 分)

$f(\xi_1) = f(\xi_2)$, 由 $f(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2] \subset [0,3]$ 上连续, 在 (ξ_1, ξ_2) 内可导,

由罗尔定理, 至少存在一点 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0,3)$, 使得 $f'(\xi)=0$. (2 分)